

I V L I I

GVASTAVINII
PATRICHII GENVENSIS,

ET MEDICINÆ QVAM

PRACTICAM APPELLANT, IN

PISANO GYMNASIO PRIMO

loco professoris, locorum de Medi-
cina selectorum Liber.



AD SERENISSIMVM COSMVM II.

Magnum Etruria Ducem IIIL.

NVNC PRIMVM IN LVCEM EMISSVS.



L V G D V N I,

Sumptibus Horatij Cardon.

M D C V I

CVM PRIVILEGIO REGIS.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1911

1911



A D
SERENISSIMVM
COSMVM II. MAGNVM
ETRVRIÆ DVCEM IV.




IVLIVS GVASTAVINIVS.



I meos in Aristotelis Problemata Commentarios, opus antea natum apud me, tibi dicaui, Serenissime COSME, annis abhinc septem, quo tempore istius Serenissima donius vix degustatis fauoribus, opera qua vobis in Pisano Gymnasio tradenda Medicina inseruio, initia auspicabar; iustius profecto hic meus de Medicina liber tibi debetur, orius apud te, id est, in ipso illo Pisano Gymnasio, dum in eiusdem Medicina professione sub gratia, & benignitatis vestra aura feliciter cursum teneo. At verò de meo libro me ita loqui aliquis existimet, quasi in eo dicendo gratiam tibi referre præ me feram, quod non ita est; sed siue do, siue accipio, eum tibi deberi id dico; si enim do, muneris exilitate facio, quod erga Deum solemus, ei ihura reddentes, cui, quod viuimus, & spiramus, totum debemus, si accipio, quod potius existimo, dum tu benigne excipis, ex illius benignitatis fonte me haurire par est, cuius summam vbertatem sum expertus. Futurus quidem erat liber auctior, & amplior, multa enim eiusdem materiae argumenta alia erant apud me, & sunt in schedis, operis veluti stamina, & fundamenta; sed morbi vi grauisima nuper
9 2 *oppressus,*

oppressum, quod tu haud ignoras, Serenissime Magne Dux, cuius summam erga me benignitatem eo tempore sum experius, texere, & perficere ea non potui. Quin & in iis quae eduntur nonnulla sunt, quae rudiora aliis, & magis impolita facile internoscantur; sed in scriptione medica id minus curatum est, in qua si cultura adsit, laudatur, si absit, non desideratur. Pertexentur vero, & emittentur etiam quae domi in schedis asseruari dixi, ubi Deo annuente, restitutis viribus labori haud impar ero. Ad officium enim nostrum pertinere existimo, qui in profitendis disciplinis, & artibus in Pisano Gymnasio operam praestamus, ut non solum dicendo, & docendo Professorum personam tueamur, sed scribendo, & inuulgando Gymnasij famam, & celebritatem, quantum unicuique licet augeamus. Quid enim tibi rependamus aliud? Tu profecto, Serenissime Magne Dux, cum amplissime Ditionis dominus, mille obnoxius curis, dum tot urbium, & oppidorum administrationem regis, expeditiones maritimas quotannis aduersus Turcas procuras, subditis iustitiam administras, pacem conseruas, sic tamen iis, quae ad Gymnasium pertinent vacas, ut praecipuum illud studium existimes, scientiarumque Professores non solum liberaliter alis, sed benigne, & humaniter excipis, honorificeque, & beneuolè assidue tractas, ut de rerum tuarum quaecunque illa sunt, splendore, & amplitudine non possit ullus, absque animi ingrati nota non esse vehementer sollicitus. Ego igitur, & hoc quaecunque in praesentia confero, & conferam postea quicquid laborare posse concesserit Deus, ut in sinum tuum reuertatur, quod ex sinu tuo prodixisse non inuitus confiteor. Genua, x. Cal. Sextiles.



I N D E X

CAPITVM QVÆ
IN HOC LOCORVM DE

MEDICINA SELECTORVM
LIBRO CONTINENTVR.

CAPVT PRIMVM.



DOLORIS definitio ex Galeno allata: eius causa proximaque sit: voluptas multiplex: dolor quale symptoma, & ad quem sensum pertineat.

I. Dolorem esse tactus actionem deprauatam, & quomodo. Argenterij argumenta proposita & diluta. Dolor à Galeno cur dictus *ἰσχυρὸς* symptoma: vocis huius paulò diuersa interpretatio allata: loca Galeni de dolore pugnancia, id est, esse & nō esse actionem læsam, conciliata. Argenterica doloris definitio refutata.

III. Doloris causam propriā, & proximam esse mutationem confectum, & violenter factam, voluptatis cōferti, Pugnancia hac de re Galeni loca conciliata. Vallesius reiectus.

IV. Solutionem continui & intemperiem esse vitunque doloris causam, neutram verò propriam & proximam. Auert oēs improbatos. Mercurialis refutatus. Solutionem per se absque intemperie, intemperiem necessariò cum solutione dolorem efficere. Galeni loca nonnulla diligenter expensa.

V. Dolorem gigni à continui solutione quæ fit, non ab illa quæ facta est.

Idem ab inæquali intemperie, non ab æquali: quæ æqualis, & quæ inæqualis, Hieremiz Thriueti, Fuchij, & Vallesij opinio. Ex Galeni locis res explicata, & definita. Eiusdem Galeni locus ex libro de inæquali intemperie accuratè perpensus, & aliter quàm à Linacro translatus.

. VI. Dolorem à calida, frigida, humida, & sicca intemperie creati: sed alio, & alio modo. Galeni ea de re dicta inuicem pugnancia proponuntur. Humidam intemperiem absque materia dari, aduersus Mercurialem. Galeni loca conciliantur.

VII. Ad vnum & eundem morbum contumaciter perduantem, diuersa, adeoque prioribus contraria remedia aliquādo adhibenda esse. Hippocratis, Celsi, & Auicennæ loca ea de re collata. Argenterius aduersus Galenum, & alios interpretes refutatus.

VIII. De capitis situ somni tempore in iis qui distillatione laborāt. Auicennæ locus expensus. Mercurialis notatus. Aristotelis opinio in problematis refutata.

IX. Cucurbitulas cum scarificatione, etiam incipiente morbo rite adhiberi aliquando. Auicennæ locus expensus.

Lus & Galeno cœliatus. Costrus notat. Alter idem, seu Galeni, seu Appollonij loci de cucurbitulis declaratus, de scarificatione plura.

X. Diffidentes, & varij antiquorum, ac principum in medicina virorum de mittendis, aut non mittendo sanguine opiniones, de modo, ac mensura eius, deque ætate, quibus mittatur, & morbi tempore, ac alia ea de re. Galeni loca aliquot de coxyla. Fuchsius reprehensus.

XI. De Angina nomine, & differtus, ac de etymo Celsus notatus. Locus in libro cui titulus est Introductio, aut Medicus, ab interprete perperam conuersa, emendatus.

XII. Inflammatio quomodo gignatur. Repellentium usus in angina, & qualibet inflammatione, quoque remporis et ætatis adhibenda. Varia Galeni loca adducta, & illustrata.

XIII. Anginam dari absque inflammatione. Galeni ea de re inter se contraria loca cum illius Particularis quedam Angina Aristeteli explicata.

XIV. In angina vtrum sanguis ostendatur vnde ad nimium defluat. Græcorum & Arabum ea de re opiniones. Hippocratis adiectus Cœlii defluat. Auicenna refutatus. Hoikerij sententia de mensura sanguinis in animi deliquio recepta. Galeni loca de eo explicata.

XV. De purgatione in angina. Hippocratis loca duo ex quarto de ratione victus in acutis declarata, alterius vera lectio demonstrata aduersus Meisarium.

XVI. De la yngionomia, seu guttulis sed in margina. Pauli locus expolitus, & declaratus. Vererum, & recentiorum ead. lectioque opinio. Aristeteli refutatus.

XVII. Sanguis spumulosus unde feratur. Quid ex necessitate à pulmone.

Qualis ab aliis partibus. Locus Hippocratis ex Coacis prænotionibus declaratus.

XVIII. De Rheumate, Catarrho, Influxione, & distillatione; Alcomarij lapsus. Duo Galeni loca ad catarrhum pertinentia male ex Græco versata, emendata. Argenterius notatus.

XIX. Indicationes quibus inflammatio, & quilibet ex fluxione morbus curatur. Duo ea de re Galeni loca accuratissime examinata, & declarata.

XX. Ceratum palumbinum & ex sinapi, vtrum in distillatione calida capiti apponendum sit. Galeni & Tralliani opinio. Loca duo Galeni cœliata. Amati Lusitani error ostensus. Cornarij lapsus in versione cuiusdam verbi apud Aërium. Auicennæ locus de eadem distillatione subtilissime expensus.

XXI. In eructo sputo ex acro, & falsa distillatione conuenire sanguinis nullifione ex Galeni opinione. Tralliani, & Pauli quæ ad eisdem videntur, illis quadam minus cœliata. Auicennæ ea de re inconstantia. Hippocratis, & Galeni loca ex sexto Epid. minorum non esse sagari.

XXII. In sputo eructo sanguinem modò ex superioribus, modò ex inferioribus partibus esse mittendum. Galeni, Pauli, Alexandri, Mesues, & Auicennæ ac recentiorum ea de re opiniones. Suppletis mensibus eadem via incellendum: ex proximo, atque etiam affecto loco evacuatione interim vti licere, cum reuulsione adhuc opus est. De reuulsione aliqua ex Galeno.

XXIII. De loco missionis sanguinis in pluitide, Auct. ut omnium, Græcorum, Arabum, & Latinorum sententia varia iuxta temporis successionem quo floruerunt, sigillatim explicata. Quid commune, & quid proprium quid simile,

simile, aut dissimile continerent, ostēsum. Positis quibusdā fundamentis de reuulsione, & deriuatione, propria sentētia affertur, & rationibus cōfirmatur.

X. IV. De causis paralyseos suspensū Galeni locus perpenſus & declaratus, ac Auicennę non dissentire ostēsus. Paralyseos causa à recentioribus quibusdam adducta, refutata.

XXV. Varię ex Galeno febris definitiones aut descriptiones: febris naturā non quantitate, sed qualitate constare. Tralliani de eadē re opinio. Ad Galeni definitiones adnotata quædam, cuiusdāque loci tentata correctio. Alexandri Aphrodisiensis & Auicennę febris definitio allata.

XXVI. Diluuntur argumenta aduersus febris calorem proposita, & febris definitio Alexandrę, seu Auicennicę explicatur.

XXVII. Febris diuisio in febrem morbum, & febrem symptoma consideratur: Galeni & Auicennę de ea opinioniones. Febris ex obstructione, vtrum febris accidēs dicendā an febris morbus sit. Capiuaccij opinio laudatur, & adstruitur. Febrem morbum, & febrem accidēs non distare natura.

XXVIII. Febris nomen aliquando morbum, & dispositionē febrilem, aliquādo eius symptoma significare. Hippocratis loca duo ea de re illustrata.

XXIX. Vtrum febres ex humoribus tantū putridis oriantur an verò sine putredine illis solis excalescēt Tralliani, Auerrois, Gentilis, Valeſci Herculanī & Vallesij opinio, posteriorem partem adstruentium: Galeni placitis eam non aduersari. Tralliani locus in Latīna versione correctus. Iouberti paradoxus febres nullas ex putrescentibus

humoribus fieri, cōntrariā.

XXX. Declaratū Galeni sententia de duplici febrium genere, quæ per febres oriuntur, & Argentij argumenta aduersus eum diluuntur.

XXXI. Febris diaria vnde dicatur alia vno tantū die, alia plus vno aliquando durare: quæ ex parua est obliuiscione, plurimos etiam aliquando durare, & secundam habere accessum, in eaque sanguinem mitti debere.

XXXII. Qui dicatur morbi particularēs, aut in partibus, seu iarticulis, & locales, ac appropriati, & quæ hoc nomine appellantur. Qui idem titulus. Titulus quarti libri Auicennę explicatus.

XXXIII. Galenicī loci vulgata lectio retinetur aduersus Fuchium, & Leonici translationem. Eiusdē loci sensus explicatus. Vallesij interpretatio reprobata, & Galeni loca defensa aduersus eundem.

XXXIV. Quibus in febribus, quāque ratione, & cōsilio mittendus sit sanguis.

XXXV. De tribus febrium generibus ex Galeno, deque acuto, & magno morbo.

XXXVI. De Paroxismo, & hora exhibendi cibi.

XXXVII. De abcessuum secundū reſtitudinem, & qui tales non sunt, vtilitate. Galeni locus ex secundo Epidemiorum malè ab interprete acceptus, emendatus.

XXXVIII. De febre ardēt, & synocha, quæ certam aliquam & determinatam febris speciem non significant. Galeni locus ex secundo de differentiis febrium illustratus. Quæ ratione febris ardens fiat: de vera, & notha ardente, quæque periculosior, & quæ minus.

FACULTAS HUIUS LIBRI IMPRIMENDI.

THOMAS DE MESCHATIN LA FAYE, Comes, Canonicus & Camerarius Ecclesiæ Lugdunensis, & Vicarius Generalis in Archiepiscopatu Lugdunensi: Opus quod inscribitur *Julij Gualtavinij locorum de Medicina selectorum Liber*, ut in lucem edatur, facultatem concedo, Lugduni Cal. Septemb. 1615.

MESCHATIN LA FAYE.

CONCESSIO.

LIBRUM hunc *Julij Gualtavinij locorum de Medicina selectorum*; Ego Iacobus Daucyne Regis Procurator typis mandari, tum demum indicem exponi consentio.

DAVENE.

TRactatus hic *Locorum de Medicina selectorum*, Julio Gualtavinio Authore, ut HORATIO CARDONE Bibliopola lucem videat perhittimus: simul ne quis citra factam ei ab ipso potestatem denuo excudat, interdicimus. Lugduni Cal. Septemb. 1615.

SEVE.

SVMMA PRIVILEGII A CHRISTIANISSIMO Galliarum Rege concessi.

LUDOVICI XIII. Galliarum & Navarræ Regis auctoritate sancitum est, atque patentibus Litteris cautum, ne quis in Regno suo, aliisque locis ditioni sue subiectis, intra proximos annos decem, à die impressionis primæ inchoandos, ac numerandos, excudat, vendat, excudendum, vendendumque quovis modo & ratione conetur tractatum, qui inscribitur, *Julij Gualtavinij locorum de Medicina selectorum Liber*, præter HORATIUM CARDON Bibliopolam Lugdunensem, aut illos, quibus ipsemet cōcesserit. Prohibitum insuper eadem auctoritate Regia omnibus suis subditis, eundem librum extra Regni sui limites imprimendum curare, vel quempiam, ubicumque fuerit, ad id agendum impellere, & instigare, sine cōsensu dicti HORATHII CARDON. Idque omne sub confiscatione librorum, aliisque pœnis originali Diplomate contra delinquentes expressis. Datum in Fonte-bellaqueo, die vigesima quarta Octobris, anno millesimo sexcētesimo decimoquarto.

De mandato Regis.

Signatum

BRVLART.



I V L I I

GVASTAVINII

PATRICII GENVENSIS, ET

MEDICINÆ, QVAM PRACTICAM

APPELLANT, IN PISANO GYMNASIO

primo loco Professoris, locorum de medicina selectorum Liber.

*Doloris definitio ex Galeno allata: eius causa proxima quæ sit:
voluptas multiplex: dolor quale symptoma, &
ad quem sensum pertineat.*

CAPVT PRIMVM.



COMPREHENDAM aliquot deinceps capitibus quæcunque ferme ad naturam doloris euoluendam pertinent: definitione enim illius posita singulas particulas examinabo, dubitationibusque & dissolutionibus earundem allatis, tota eius natura erit explicata. Eam igitur affectionem ex Galeni doctrina magnam partem à Platone delumpta ita definio: Dolor est tristis sensatio ob mutationem confertim, & violenter factam. Possit autem hæc perfecta existimari definitio, quæque doloris naturam absolutè exprimat: si tamen ulterius adhuc rem totam describere, & declarare velimus, hæc præterea addere licet, ratione solutionis continui, aut intemperiei, vt tota oratio ita habeat: Dolor est sensus tristis ob mutationem confertim, & violenter factam ex solutione continui, aut intemperie. Est igitur sensus, aut sensatio, id est, affectio, quæ sensibus incidit, & qua sensus & sensiles partes percipiunt aliquid: vnde quæ carent sensu, carent etiam dolore: est tristis, quo differt tum à sensatione alia, in qua propriè nec dolor, nec voluptas contingit,

L. Guast. Select. Medic.

A

tingit,

tingit, quam scilicet sensus simpliciter apprehendit obiectum, cum à sensatione cum voluptate, quæ est sensatio iucunda, & oblectans. Oritur autem illic tristitia ob mutationem confertim, & violenter factam, quippe in sensatione languidiori & magis remissa, quæque sensui fit, simplex est obiecti apprehensio, nulla autem voluptas, aut dolor sequitur. At cum quispiam confertim, & violenter à statu naturali ad eum, qui præter naturam est, compellitur, dolorem percipit, & cum à statu præter naturam ad naturalem ducitur, voluptatem. Hæc Platonis in Timæo & Galeni ab ipso haurientis est opinio & sententia, ab aliis etiã proposita, quæ tamen obiectionem patitur. Nam potioris non indigens, & qui ratione sitis in naturæ statu continetur, ex gustu tamen suavis vini vehementer delectatur, & Veneri deditus nullo etiam redundante semine, cuius excretionem, cum stimulat, desiderat natura, ex concubitu maximam percipit voluptatem, quod in aliis sensibus etiam animaduertere liceat. Existimamus voluptatem non esse vnum quiddam, & simplex, sed varios illius modos, qui sub vna quidem ratione generatim contineantur, particulatim non item. Primus igitur illius modus est, qui ad animum totus pertinet, ut quæ in contemplando posita est voluptas, tum quæ in agendo, & efficiendo, ut qui canendi, aut pingendi studio ducuntur, alia ad sensum pertinet, ut quæ ex Venere, & potu posuimus, quum sensus ex iucundo obiecto demulcentur. Postrema ad sensum etiã pertinens, quæ ex Galeno definita est, sensatio iucunda, quum à statu præter naturam ad naturalem confertim reditus sit, vt cum famelicus cibo se explet. Hæc non est plus minus sine sensus demulcimento; hoc tamen absque illa. Galenus reliquas omisit, hanc proposuit, quando cum esset opposita dolori, cuius naturam quætebat, ad rem propositam faciebat, quæ autem mulcimentum, aut delinitio sensus est, illa cum semper sit sociæ priori, sub hac continetur, præterquam quod in ea accessus quidam ad naturalem statum dici possit, quin sensus ex facultate, quam habet, ad actum eo mulcimento deducantur: iucunda enim obiecti appulsione excitantur sopiti spiritus, & ex illa commotione, & veluti contrectatione, qua ad actionem deducuntur sensus, gignitur voluptas: ex quo talis motus similis admodum videtur voluptati, quæ à Galeno est descripta. Igitur dolorem, quem definiuimus, est sensatio illa tristis, ex obiecto molesto & noxio de proprio statu confertim, & violenter naturam deturbante, quia natura vires exsuperat, nec illi commensuratum est. Talis autem definitio Cicetonianæ illi haud absimilis videatur, quæ scripta est secundo Tusculanarum questionum in hæc verba: *Dolor est motus asper in corpore, alienus à sensibus*: quod enim in corpore addit M. Cicero, molestiam illam, aut tristitiam separare voluit ab ea, quæ solius animi est, quàmque laborem propriè eo loco dici vult Cicero, nihil ad corpus attinens, cum dolor, etsi corporis esse intelligatur, ad animum etiam pertineat. Est enim profectò hic rei molestæ sensus cum cognitione, non enim sine hac sensorij ipsius alteratio dolorem efficiat, quod scribit Galenus libro

lib. a. de decretis Hippocrati & Platonis cap. 6. Huiusmodi autem cognitio non videtur pertinere ad ipsius sensationis organum (quam iuxta illam hanc non sensibus contentionibus agitata questio) quod solum patitur, & afficitur, & est corpus nervosum, sed ad internam facultatem, quæ cognoscat, & iudicare possit, siue illa sit sensus communis, siue phantasia: mentem appellat Hippocrates libro secundo Aphorismorum, Aphorismo sexto, cum scribit: *Quicumque dolentes aliqua parte corporis, omnino dolorem non sentiunt, is mens aegrotat*: eodem enim temporis momento quo corpus nervosum afficitur, dolorifico obiecto huic facultati impartito, sit dignotio eiusdem atque iudicium, nimirum apprehenditur tanquam iniucundum, & triste: si autem obiectum aliqua ratione facultati haud communicetur, non fiet dolor: unde & multi gravissimè vulnerati, dum adhuc cum hostibus certant, abstracti ardore pugnae & cogitatione aut mente aliò abrepti, vulnereum dolores haud sentiunt. Illi etiam qui delirant, quum eorum facultates interiores officio minimè fungantur, nec dolores sentiunt, nec sapores distinguunt, ita amara, & foetida, ac dulcia & odora ingerentes. Pertinet igitur dolor tum ad sensum, id est, ad organum, tum ad facultatem internam: & quoniam est sensio tristis, & cum noxa, est symptoma, ex genere actionum sensibilium laesum: laesa enim, & vitiosa est sensibilis actio; verum cum sensus quinque sint, ad quem ex illis pertinet dolor? Profectò, qui eam noxam, & molestiam patitur sensus, propriè est sensus tactus, ex Galeno libro de differentiis symptomatum, cap. 3. ubi tactum præter ceteros sensus, egregium in actione sua symptoma possidere dicit, nempe dolorem, licet idem dolor reliquis etiam sensibus accideret ab externis propriis sensibus, ut visui à colore, gustui à sapore, ut latè ostenditur lib. 1. de symptomatum causis cap. 6. licet aliis minus, prout tenuiore, aut crassiore substantia unusquisque ex sensibus constat, ut eodem loco ostendit Galenus: vnde minimè omnino afficitur visus, tum auditus, mox olfactus, quem sequitur gustus, & postremò omnium maximè tactus, qui acerrimus in homine est, & hic non solum ab externis sensibus, ut alij sensus, sed multò magis ab affectibus internis corporis pati solet. Hinc de re ita Galenus loco modò citato ex libro de differentiis symptomatum. *Cognitur ergo, & in oculis & lucis splendore doloris quaedam passio, & in auribus ex magno quopiam, & aspero strepitu, sic in gustatu quoque, & odoratu alie tales incidunt passiones tristes, à proprio scilicet sensu unoquoque sensu diuine affectio: maximi verò dolores tactus sensu coniungunt. Quippe qui ex aurium phlegmone aliòve affectu vehementer nos angunt, non proprii auditus dolores non sunt, sed tactus: est enim is sensus omnium sensoriorum communis, reliqui quatuor sui quisque solus; ad eundem modum in oculo non raro dolores immixti videntur, & gèdi scilicet in hic sensu contristato. Porro hoc loco queritur de aliis hisce sensibus præter tactum, utrum quatenus proprii per se, & à tactu se iuncti participant dolorem, an solummodo quatenus tactu participant: manifestum enim est, hosce sensus dupliciter pati dolores, & à propriis sensibus, ut*

oculorum à nimia luce, & auditum à graui sono, vt ex Galeni verbis modò proposuimus, atq; etiam quatenus tactus participes sunt, sicuti cùm idem oculus percutitur, & cùm auris inflammatur, quod etiam eodè loco proponit Galenus. Atqui sicuti certum est, visum, & auditum sub hoc secundo casu pati, tanquã tactu illis communicato, tactus enim per omnes sensus est diffusus, ita quaeritur, cùm patiuntur à propriis sensibilibus, vtrum tanquam tactus participes patiantur, an quatenus proprii visus, & auditus sensus. Ex Galeno res non paret liquidò; nam cùm dicat, sensum tactus egregium propriè obtinere in facultate sua symptoma, qui est dolor, videtur existimare ad solum sensum tactus pertinere dolorè. Si enim proprium illi est symptoma, non est alijs commune; sed cùm dicat alios etiam sensus pati dolorem ab externis sensibilibus, propriis, alijs etiam dolorem communicare videtur; alijs hoc, alijs illo modo existimant sem habere, pariè sensus illos tum ratione propria, tum ratione communi, sed hoc discrimine interposito, quòd ratione communi, & quatenus tactu participes, maiores, & acerbiores dolores patiuntur, huncque esse Galeni sensum loci recitati ex primo de symptomatum causis capite sexto, vbi in sensum tactus omnem dolorem videtur reuocare, scilicet dolorem magnũ, ita enim interpretantur, cùm moderatus possit alijs etiam sensibus quatenus tales incidere; sed veriùs puto dici; quemlibet dolorem pertinere ad sensum tactus; & qui dolores ex propriis sensibilibus quatuor illos sensus molestant, ad illos non pertinere, nisi quatenus sensus tactus sunt participes. Nam nimius lucis splendor, quod est proprium oculorum, aut visus sensibile, non lædit oculos aut visum, nisi quia euadem nimium segregat, & vnitatem dissoluit, sicuti etiam eodem loco scribitur à Galeno, hæc res autem pertinet ad sensum tactus, qui in oculis est diffusus. Eandem sententia manifestissimè habetur apud eundem Galenum quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, vbi ex Platonis mente dicebat, omnes saporum sensus media alteratione, & ex hoc media solutione continui, dolorem asferre, acida quia incidunt, salia quia abstergunt, amara quia corrodunt, & acerbata quia constringunt. Propriè igitur, & per se dolor pertinet ad sensum tactus, ad reliquos autem sensus, quatenus tactu participant; ita dolor est symptoma pertinens ad actiones sensiles, & propriè ad sensum tactus, cuius est actio vitata. At quomodo dolor dicitur symptoma, qui à Galeno libro 2. methodi cap. 2. dictus fuit morbus? ibi enim cùm de nominum diuersitate ageret, quæ morbis imposuerunt ipsorum primi auctores, aliòsque ex illis diceret à læsa particula nomen fuisse sortitas, inter hos numerat Cephalalgiam, hoc est, capitis dolorem. Tercio etiam de locis affectis cap. 9. ita appellat cephalæam, scribens: *De ea quoque, quæ Cephalæa dicitur, nemo dubitat quin cerebri morbus sit.* Sed Galenus hisce locis, minùs propriè, at iuxta vulgarem hominum loquendi consuetudinem eam vocem vsurpauit, ita enim sæpè numero loqui, & quæ symptomata sunt, morbos appellare soleamus, vt dolorem colicum, &

nepteticum, & alios affectus, qui vulgò morbi dicuntur. Haud ignoro Aponentem differentia LXXIII. varia ratione dolorem accipi posse scripsisse, & sicuti propriè symptoma esse vult, quum in motu, & alteratione consistat, non in dispositione, aut habitu, sub quo locatur morbus, ita quum aliores aliquando radices agat idem dolor, permaneatque diutius, immutatumque sit subiectum, induere morbi habitum voluisse. Dicit igitur materialiter sumptum dolorem posse morbum appellari, formaliter non posse, vulgò autem hac altera ratione sumi, ideo sub symptomate collocari. Vberimè hunc locum tractat ea differentia Aponensis, nobis autem non sunt plura hic afferenda.

Dolorem esse tactus actionem depravatam, & quomodo. Argentery argumenta proposita & diluta. Dolor à Galeno cur dictus & argueri symptoma: vocis huius paulò diuersa interpretatio allata: loca Galeni de dolore pugnantiā, id est, esse & non esse actionem lesam, conciliata. Argentery doloris definitio refutata.

CAPVT II.

A T Q V I si est symptoma actionum sensilium, hoc est, tactus vitiat, quo vitiatæ actionis genere comprehenditur? Illud enim ex Galeno iam scitum est, actionem, aut operationem tripliciter vitari, seu lædi, cum perit, cum imminuitur, & cum deprauatur: non perit in dolore sensus tactus, non enim tactu priuantur qui dolent, non imminuitur, vt parum, & obtusè sentiant, quod accidit in stupore; quare relinquitur, vt deprauetur; erit ergo actio sensus tactus deprauata. At quomodo dicitur actio, cum sit potius passio? est enim sensus tristis, & molesta, sensus autem fit cum mouetur, & patitur aliquid, ex Aristotelis libro secundo de anima. Respondeo, dolorem dici actionem eo modo, quo cæterorum sensuum actiones, cum sit actio tactus, sed, vt diximus, corrupta, & quæ perperam fit: magis tamen propriè est passio, sicuti eam appellat Aristoteles locis; adductis sed vnus, & idem motus, non absurdè actio, & passio dici potest ex Galeno, libro de differentiis symptomatum cap. 1. per hæc verba: *Passio est motus in materia qui fit ab agente, ipsa verò agentis motus actio est.* Magis tamen in patiēdo, quàm in agendo consistere sensum tactus, habemus apud eundem Galenum lib. 1. de symptomatum causis: dicuntur tamen actiones sensuum, quia sunt eorundem operationes, ipsiq; sensus muneribus suis funguntur, vt visio videt, & auditus audit, licet functio ipsa in passione sit posita; sed respicientibus sensus, qua ratione functiones obeunt, liceat illas appellare actiones, quod etiam facit sapius

tebatur Argentieri; argumentum) ac tamen convenire quod læsis aliis actionibus, offendimus cum Argentierica rationi satisfecimus, quæ prima fuit. Sequitur altera, quæ probare contendit dolorem non esse sensationem. Si dolor est scilicet lætio, haberet aliquod peculiare obiectum, et scilicetque alicuius sensus actio, ac doloris nullum est obiectum, nec alicuius sensus est actio, vel passio, quum in omni sensu & sensorio fiat. Respondeo, dolorem propriè pertinere ad sensum tactus, esseque illius actionem vitiatam, eo modo quo proximè docuimus; non habet tamen ita peculiare obiectum, quod nec est necesse, ut alij sensus, quorum obiecta ita sunt vni propria, ut aliis non cõvenient: tactus enim est diffusus per omnes alios sensus, vnde aliorum sensuum obiecta tactus etiam obiecta sunt. Talia igitur obiecta, cum minimè sunt commensurata, sed naturæ limites excedunt, tactus qui in ipsis est, malè afficitur, malaque, vitia, & extranea editur actio, qui est dolor; proprium tamen obiectum sensus tactus, est qualitas tactilis. Tertiam rationem adhuc proponit Argentierius: sentire est iudicare, ex Aristotele 2. Topicorum cap. 2. dolere autem non est iudicare, aliter enim dolor esset cognitio, igitur dolere non est sentire, nec dolor lætio. Ad maiorem propositionem dicimus, existimasse Galenum sensum per se non iudicare, quam rem superiori capite, ex sexto de decretis Hippocratis, & Platonis proposui, ac hanc doloris definitionem ex Galeno afferro! sed illo etiam concessio, negamus minorem propositionem, dolere enim est iudicare, qui enim dicit dolere, dicit apprehendere obiectum tanquam noxium, & insensum, quod non est aliud quàm iudicare, & hoc modo dolor dici potest cognitio, iam enim diximus non esse solam sensorij alterationem, idque vel vltro Argenterio concedimus, sed cum iudicio quodam, quod iudicium alij sensibus ipsis, alij facultati interiori tribunt. Afferti huc non incommode Gentilis etiam opinio, & distinctio fortasse possit, dolorem sensationem esse, dupliciter intelligi posse, vel enim dolorem esse sensationem ipsam formaliter, ut Gentilis loquitur, vel non esse formaliter ipsam sensationem, sed aliquid sensationem cõsequens. Priori igitur modo dolorem non esse sensationem, altero autem sensationem dici posse. Ita dolorem re ipsa non esse actionem læsam: quoniam autem scisatio læsa, & id quod ipsam cõsequitur sunt valde proxima. ideo fieri, ut dolor actio læsa dicatur, cum re ipsa sit aliquid cõsequens actione læsa. Alia etiam argumenta proponit ibidem Argentierius, quæ proximè commodiori loco afferentur, & dissolventur. Alia rursus de eadem re dubitatio est, ex his quæ à Galeno proponuntur exorta, quomodo dolor actio læsa, aut vitia dicatur, cum ab hoc auctore lib. ij. artis medicæ cap. LXXV. enumeretur dolor scorsim, & distinctus à læsionibus operationum, tanquam res alia ab ipsis. Ibi enim comprehendens corporum ægrotantium signa, quæ sensui non apparent, dicit illa sumi ex operationum læsionibus, aut his, quæ excernantur, aut doloribus, aut tremoribus, præter naturam: se-

parare

parare igitur videtur dolorem ab actione lesa, quod etiam facit lib. 1. de locis affectis cap. 9. Respondet Trusianus, qui in commentario ad eum Galeni locum libro artis medicæ dubitationem proponit, dolorem non esse propriè læsionem actionis tactus, quod ex eodem Galeno confirmat; inde enim factum, ut libro de differentiis symptomatum, propositis symptomatibus aliis, id est, triplici illa læsione actionis, quæ unicuique sensui accidit, tubiecerit quæ ad dolorem pertinent, tanquam alia ab illa triplici diuisione scribens hæc: *Tactus autem in sua functione præter reliquos sensus proprium, & insigne symptoma obtinet, nempe dolorem*, quia igitur aliquo modo est alius, fuisse à Galeno tectatis locis propositum seorsim à læsionibus operationum; esse autem aliam, nec propriè eandem læsionem, quæ à Galeno triplici illa diuisione proponitur, ex eo ostendit; nam, ut paulò antè nos etiam dicebamus, non est interitus sensus, quod est non sentire aliquid ex iis quæ oportet, neque est debilis sensus quod est non cernere, & bene comprehendere impressionem factam à re sensibili, neque est prauus sensus, quod est errare, & decipi circa obiectum, ut sentire aliquid, nullum cum sit sensibile, ut qui vident muscas volantes cum non sint, sicut contingit illis, quibus imminet suffusio, aut sentire bombos in auribus qui extrà nulli fiunt. Hæc attulit Trusianus, sed quomodo esset diuersus dolor, & quare diuersitas consisteret, apertius non manifestauit. Nos superius non quidem dolorem non esse propriè læsionem sensus tactus diximus, sed non esse eundem læsionis modum, quo cætera actionum vitia dicuntur symptomata, propterea dolorem ab his fuisse separatim positum. Argenterius hoc idem argumentum, quod Trusiani est, ut diximus, proponit loco antea adducto, & simul coniecturam à Trusiano itidem allatam, cur separatim, & post alia fuerit de dolore res proposita; reticuit tamen Trusiani nomen Argenterius, cum æquum fuisset, quæ sua non erant, auctoribus tribuere. Proponit autem hæc Argenterius, ut probet dolorem non esse actionem, quod existimasse eum vitum paulò antè diximus. Si enim non est actio, quæ perierit, aut imminuta sit, aut deprauata, iam sanè non est actio læta, nec actio dicenda; & verò, quòd ita ille existimaret, de solutione dubitationis nihil cogitauit, sed ex Aristotelis auctoritate denovo dolorem neque actionem, neque sensationem esse probare contendit. Ab hoc enim philosopho libro decimo Ethicorum esse scriptum, absurdum esse arbitrari dolorem, & voluptatem esse sensationem, aut actionem. Hinc aliam à Galenica doloris definitionem eodem loco affert Argenterius, iuxta Aristotelis opinionem ita definire professus: *Dolor est molestia, quæ oritur in ipsa sensatione, aut in animi functionibus, ex his quæ contrarium solunt*. Loca Aristotelis citat ex sexto Topicorum, & decimo Ethicorum. quinimo addit positam definitionem reperiit integram in libro sexto Ethicorum, ubi definit dolorem esse passionem animalis factam cum molestia à diuisione partium coherentium. Hic, plura ne dicam, omnia explodenda sunt. Definitionem illam doloris integram,

libro de motibus cap. quintus, cum adeo saltem est, ut in toto illo libro dolor non ullatenus sit mentio. Videlim fuisse hęc librariorum culpa, & pro Editorum, reponamus Topiconum: hanc enim puto significari librum. Sanè neque in eo proposita definitio habetur; sed hoc tantum, dolorem esse *distractionem* *quæ surgit iuxta Bras*, id est, *dolorem esse distractionem, aut separationem*, ut vertit antiquus interpres (distractionem fortasse melius dicam) *partium natura coniunctarum violentia excitatam*, quam definitionem mox reprehendit Aristoteles: non enim distractio illa partium est dolor, sed dolorem efficit, ut subicit Aristoteles. Sanè Alexander in commentatio ad eum locum, dolorem esse dicit perturbationem (ut vertit Rasarius) animalis propter distractionem partium, natura coniunctarum; sed quod perturbationem dicit Rasarius, illud non est molestia, Græcè enim *νόσος* legitur, id est, passio aut affectio, & affectionem esse dolorem disterte scribit Galenus, molestia autem ex Galeni doctrina idem cum dolore est, sicuti paulò post ostendemus, ut non sit in definitione accipienda. Nec verò decimo libro de motibus cap. quinto, negat Aristoteles dolorem esse actionem, aut sensationem, sed voluptatem solam nominat; dolori autem nulla mentio, sed quia contraria sunt, & sub eodem genere continentur, licuerit Argentorio Aristotelis sententiam illam dilatare. Atqui nec voluptatem negat esse sensum: sed sue cogitationem, siue sensum, vnum & idem esse cum voluptate, id verò negat; quippe docuerat autē, vnumquemque sensum atque etiam cogitationem habere suam voluptatem, atque ab ea augeri, amplificari, perfici, & absolui actiones, & operationes, cum, ut ipsemet Aristoteles eodem loco scribit, diligentius quidq; iudicent, accuratius persequantur, & administrent, qui cum voluptate operantur, & munere suo funguntur: esseque adeo iunctam, & confusam voluptatem actioni, aut muneris functioni (ita enim melius Græcorum *εμπλεκται* conuertunt) ab eaque adeo inseparabilem, ut à nonnullis fuerit dubitatum, utrum idem esset actio, seu muneris functio, & voluptas. Dicit autem Aristoteles, nec cogitationem, nec sensum (utrumque voluptatis genus comprehendens) idem esse cum voluptate; sed quid hæc aduersus illa faciunt, quæ de dolore Galenus, esse tristem sensationem? an non Aristotelica quæ proposui, fidem abundè faciunt, dolorem, quem definit Galenus, alium esse ab eo, qui voluptati, de qua Aristoteles, possit esse oppositus. Galenus agit de dolore, qui totus corporis est, corporis enim sensibus est molesto, & cruciante obiecto sensitiuo incidit; at voluptates, de quibus loquitur Aristoteles, pertinent ad virtutes, & vicia, quæ in moribus sunt, & ad voluntarias actiones, quas perfici à voluptate, contumpi à dolore ibidem ostendit. Pertinet sane altera ipsarum ad animum ex toto, quæ *συναίσθησις*, id est, *cognitio, aut ratiocinationem* spectat, altera ad animum quidem, sed cum societate corporis, ut qui canendi, aut salandi studio ducitur, voluptatis beneficio auget, & absoluit operationes, quod

ex Aristotele proponamus. Sunt autem modi tres idcirco volentes, quos superiori capite proposuimus, distincti ab illa, quam ait Galenus, cui oppositus est dolor, quem eo loco definit importune, sicut voluntarias actiones accessit huc Argenterius, & cum leuium actionibus naturalibus confundit. Iam verò quod definit dolorem molestiam, primum idem eodem definire mihi videtur, dolor enim, & molestia idem sunt ex Galeni sententia libro primo de symptomatum causis c. 6. his verbis: *Necque enim refert an molestum, an triste, an doloris, an laboriosum appetus: sicut nec si passionem ipsam molestiam dicas, an tristitiam, an dolorem, an dolentiam, an laborem;* cum verò quò dicit Argenterius *molestia que oritur in ipsa sensatione*, in aliud dicit quàm tristitia sensationem, quare & facile si quispiam velit, hoc modo possit etiam proponere omnia argumenta eludere, definitione Galenicam ita interpretando, dolor est tristis sensatio, id est, tristitia, aut molestia sensationis, aut in sensatione, aut ex sensatione, id verò non est aliud quam sensatio tristis, aut molestia; ita nisi de verbis contentio est. Quod porro addit Argenterius, *in animi functionibus*, id nò fuit necesse addere Galeno, qui dolorè tantum corporis, ut diximus, definit voluit, quam rem quum non conuaduerteret Argenterius, effecit, ut de Galeni opinione malè sentiret, malè profecto sentiens ipse. Ita igitur, ut puto, nihil eorum accipiendum apparet, quæcunque ab Argenterio proposita sunt: inde verò sanè patere etiam potuit, quomodo satisfaciendum sit argumento Trusiani, quò commodato accepto pugnare voluit Argenterius; libet tamen adhuc, quæ tota res dilucidior euadat, eiusdem Trusiani responsum mihi afferre. Igitur dolorem non esse actionem læsam, inde colligebat Trusianus, quòd nec omnino perisset, nec imminuta, nec deprauata esset, hinc seorsum positum à Galeno. Dicit igitur Trusianus dolorem non esse læsionem sensus, sed potius sensum rei lædentis, quia alterat, & corrumpit, ut loquitur Trusianus, harmoniam organi eius, ideo non comprehendit omnino dolorem sub læsione operationis, sed esse per se genus accidentium, & signorum, modumque signorum spectabilem, & distinctum. Puto autem nihil esse absurdi dicere, dolorem esse læsionem tactus, quomodo antea exposuimus, id est, esse tactum cum tristitia operantem, ac munere suo fungentem; & quid aliud est sensus rei lædentis, quòd esse dolorem vult Trusianus, quàm sensus tristis, quem esse dolorem dicimus? Porro autem quoniam videbat Trusianus, ita fieri quartum genus symptomatum, cum tamen ita tantum à Galeno constiterit, actionum læsarum, eorum quæ excernuntur, & retinentur, & quæ pertinent ad qualitates corporis immutatas, idcirco ne cogeretur quartum genus symptomatum inuenire, dicit, etsi per se, & simpliciter non sit læsio operationis, reduci tamen ad hoc genus, quoniam lædit, & immutat à cursu naturæ ipsum sensum; quam Trusiani sententiam accipit etiam Odeus in commentatio ad eum Galeni locum libri artis medicæ, & nos etiam accipimus. Quod autem Galenus locis illis, quæ fuere proposita, dolores separaret

separat à lætis actionibus, vnde inter actiones lætas non videantur nimirum illi, aliqua de ætate deunt, nimirum Galenus, ubi signa scribit sumenda esse ab actionibus lætis, loqui tantum de actionibus, quæ sunt propriæ parti, dolor enim esse actionem communem, ideo fuisse ab illis distinctum: de illis enim exempli gratia est actio propria cerebri, dolor non ita, est enim aliis etiam partibus communis, quæ sententia commodissimè etiam satisfacit dubitationi.

*Doloris causam propriam, & proximam esse mutationem confertim,
& violenter factam, voluptatis confertim. Pugnancia hac
de re Galeni loca conciliata. Vallesius reiectus.*

C A P V T I I I.

C O M P R E H E N S A sunt duobus superioribus capitibus, quæ pertinebant ad explicationem primæ partis definitionis doloris, qua dicebamus esse tristis sensationem, subsequitur alia pars, quæ proximam eiusdem tristici sensationis causam continet, quam paucis quidem attingimus antea, alia verò ad eandem deinceps proponenda sunt. Igitur mutatio confertim, & violenter facta causa propria, & proxima est tristici sensationis, aut doloris. Hanc proposuit Plato in Timæo, ex quo hausit Galenus, sicuti ipsemet testatur, sed ante Platonem ab antiquiore Hippocrate in libro de locis in homine fuerat scripta his verbis, *his quibus natura alteratur, & corrumpitur dolores sunt*, voce scilicet *corrumpitur*, celeritatem simul & magnitudinem mutationis indicante, ut docet Galenus cum illam sententiam explicat. Ad cuius declarationem dico, quod antea etiam me proposuisse existimo, sensationem simplicem aut languidam (simplicem appello, quæ est absque aut voluptate, aut dolore) fieri ex moderato, seu remisso aut languido obiecti appulsu: tali enim appulsu, nec voluptatem, nec dolorem propriè adesse dicere possimus: at si immoderatum sit obiectum, & confertim, & violenter irruat, ut à statu naturali dimoueat organum sensus, tunc gignetur dolor; si verò confertim rursus ad statum naturalem redeat idem organum, voluptas fit. Ita tres sunt varæ sensationis conditiones, formæ aut habitus, vna vehemens, & violenta, in qua dolor, altera confertim existens, sed non violenta, in qua voluptas; tertia languida, in qua nec dolor, nec voluptas. Mutationes autem hæc, confertim excitant in voluprare, corrupticem in dolore, habemus etiam apud Aristotelem 1. Rhetoricorum, & si animi voluptatem, ac dolorem in primis definit, licet enim aliquà dissidere appareant, multis tamen communicant. Quod verò Aristoteles VII. Ethicorum, & alibi, voluptatem noluit esse generationem, sed finem,

alia qua sitio est, illic enim voluptatem aliter accipit. Nam utrum d. foras
 tanquam motionem, & sensationem accipientes, dicitur eam fieri,
 cum aliquid à naturali statu ad præternaturalem vehementer, & cum
 vi mouetur, voluptatem ex reditu confertim factò ad naturalem sta-
 tum; sunt autem hac de re contraria Galeni loca. Nam cum primo de
 symptomatum causis cap. 6. id proponat quod diximus, tum gigni volu-
 ptatem cum ad statum naturalem quidpiam confertim reducitur, duo-
 decimo methodi medendi cap. 7. id negauit, scribens corpora non so-
 lum cum in habitu contra habitum contra naturam confertim aguntur,
 tristem mutationem sentire, sed etiam in ipsa ad statum suum natura-
 lem regressione, nisi illam paulatim accipiant cruciari, cuius rei exem-
 plum afferebat. Nam qui in vehementi frigore, vt per loca muata iter
 fecerunt, eos cum sese non sensim, sed confertim calfacere properant,
 dolore circa vnguium radice adeò vehementi affectos fuisse, vt ferre non
 possent, quod similiter scriptum habemus libro de inæquali intemperie,
 cap. 8. Apparet igitur ex confertim facta regressione ad statum naturalem
 percipi dolorem, minime voluptatem, quam ita percipi dicebat Galenus de
 sympt. causis, c. 6. Respondet Mercurialis, in exēplo proposito non fieri re-
 ditum ad statum naturalem, sed potius fieri transitum à statu præternatu-
 rali ad alium statum præternaturalem, id est, à nimia, & præternatu-
 rali frigidityte, ad nimiam & præternaturalem caliditatem, quare
 esse dolores acerbissimos, quia simul sunt duo excessus, & nimia
 calefactio, & nimia refrigeratio. Hæc sanè quæ ita scripta sunt, ac-
 cidentis illius causam aliquam reddunt, ac Galeni loca haud vindicant
 à contrarietate. Franc. Vallesius lib. 5. controuersiarum, dicit
 repentinam mutationem etiam versùs naturalem habitum, dolorem
 facere, quia cum sit repentina, facit conspicuè inæqualem intempe-
 riciem, quæ dolorem efficit; sin minus, ait Vallesius, quò velocior est,
 eò maiorem voluptatem conciliat. Idem confirmat ille auctor comun.
 ad librum Galeni de inæquali intemperie dicens: Si tota particula
 secundum se totam æqualiter rediret ad naturam, quò celerius id
 faceret, eò plus delectaretur: ergo dolet, qui alteratur inæqualiter.
 Hanc doctrinam non puto esse veram, & ne non singula quæ hic
 dicuntur falsa sint, vehementer dubito. Primum enim doloris funda-
 mentum non est inæqualitas intemperiei, quod videri supponere
 Vallesij ratio, sed est alteratio, scilicet superans intemperies, quæ
 continuum soluit, inæqualitas autem est causa sine qua non, quoniam
 ubi æqualis est intemperies, quorumque iam in totum mutato est
 facta, in iis non habet locum actio, & passio, simile enim à simili ni-
 hil patitur, iamque ea intemperies æqualis sit cuilibet ita affecto,
 veluti acquisititia quædam natura; ac nullum corpus à sui ipsius
 natura patitur. Deinde si repentina mutatio ex necessitate efficit
 inæqualem intemperiem, & hinc dolorem, iam nulla vnquam gi-
 gna

perpoterit voluptas, consistit enim & hæc repentina mutatio, ut ex
 Galieno, Aristotele, & Galeno præposuimus, cum præsertim in exemplo
 de quo agimus, mutatio sit ad naturalem statum. Addit Valletius, si non
 fiat inæqualis intensio, quò velocior est mutatio, eo maiorem concu-
 pti voluptatem, ac si tota particula secundum se totam equaliter redeat ad
 naturam, quò celerius id fiat, eo plus delectatur. Neque id veritati consonat;
 potest enim adeò celer, & velox esse mutatio, ut violentiam inferat,
 talis autem mutatio corrumpit, & dolorem facit, non voluptatem, ut ex
 locis adductis manifestè patuit. Postremo nõ video tolli contradictionem
 ex dictis Galeni, qui libro 1. de Symptomatum causis scribit eum quid-
 dam ad naturalem statum *confertum*, id est, confectum, aut assatum redit, de-
 lectionem induci, contra XII. Methodi scribit, corpora non solum
 cum in habitum contra naturam confertim aguntur, tristem mutatio-
 nem sentire, sed etiam in ipso ad naturalem suum statum reditu, nisi eum
 paulatim accipiant, cruciari; unde qui in vehementi frigore ner fecerant,
 cum sese non sensint, sed confectum calefacere properarent, dolore
 circa vnguium radices adeò vehementi affectos, ut ferre non possent: ita
 confectum reduci ad statum naturalem, illic facit voluptatem, hic facit
 dolorem. Dicit Valletius, hic facit dolorem, quia facit inæqualem inten-
 sionem, igitur (ait) facit dolorem, at negat simpliciter Galenus 1. de Sym-
 ptomaticis scribens facere voluptatem, non igitur sublata est eorum radi-
 catio. Dicendum igitur, quòd voluptatem allaturum est, illud *adferre*, aut
 confectum esse oportere, nam quòd sensum, & paulatim fit, ut scribit ex
 Platone Galenus, sensum later, continetur tamen illud *confertum* modera-
 tione quadam, sic ut non fiat etiam *strenue*, id est, cum vi, seu violenti,
 nam quòd tale est, iam facit dolorem. Ideo Galenus in locis, quos citau-
 mus, ubi de doloris generatione loquitur, utramque vocem usurpat, fieri
 dicens *adferre*, & *strenue*, confertim, & violenti: at voluptatem solum
adferre. Quia igitur perfrigeratas manus a denti igni proximas ad mouet,
 ille iam non confertim solum, sed violenti etiam mouetur, & hinc per-
 cipit dolorem. At ex Galeni verbis possit adhuc virgere difficultas. Dicit
 enim corpora etiam in ipso ad naturalem statum reditu, nisi eam paula-
 tim accipiant, cruciari; non igitur confertim, sed paulatim vult reditum
 fieri, si modò voluptas inde sequutura est. Dicimus hunc reditum etiam
 confertim fieri, sed quia comparari potest illud *confertum*, quod quasi in
 medio est positum, duobus quasi extremis, dici à Galeno XII. methodi,
 paulatim, si enim comparatur mutationi, quæ in dolore accidit, quæ non
 solum est confertim, sed eo plus, etiam violenta, dicitur paulatim facta
 hæc mutatio, si autem sensationi remissiori, quæ ex languidiori impulsione
 facta absque insigni aliquo motu & latenter apprehenditur obiectum,
 dicitur esse confertum. Igitur primo de symptomatum causis, ubi de
 voluptate gignenda, confertim scribit fieri oportere reditum, conferebat
 eum remissiori sensationi, quæ simpliciter & latenter apprehenditur obie-

Atum, at XII. methodi mutatur, quæ in dolore accidit, vult enim palatim illam fieri, id est, non violenter, vt in dolore, ne pro voluptate dolorem creet, licuti perfrigeratis contingit, dum se excalescere properant: id autem accidit ex eo, quod confertim quod fit, & paulatim quod fit, spatij latitudinem obtinet vtrunque, & potest velociori, & tardiori motu habitus acquiri, ac vtroque modo acquisitus dici confertim, pro ratione, aut conditione rei, quæ mouetur, quare gelatis manibus exiguis continetur ignis, vt confertim ad statum naturalem redeant, nullo autem igne si rediunt, aut minori, quàm conueniat, nullam perciperent voluptatem, quod non fieret scisus, nec tamen maiorem ferre possint, quia debilitatis viribus præ intemperie & dolore, maiorem non ferunt obiecti impulsione, ex qua sequeretur alia continui dissolutio, & inde alius dolor, & sic duo adessent dolores. Qui frigidas itidem, non tamen gelatas habet manus, confertim etiam admodum igne ad naturalem statum est reducendus, si modò voluptatem est percepturus, sed alia ignis mensura, frigorisque porportionem respondente, quam proportionem proponebat Aristoteles 1. sectione Problematum, X I. & XX XI. Problemate, perspicuè eam rationem adducens; cum quæreret, cur in caldarius igne, neque ἀδρῶν (vniuerso conuertit Gaza, confertim etiam liceat) neque per diminutionem oblato, sed per incrementa continua magis sudamus, ibi enim proportionem hanc, de qua loquimur, eius rei causam esse docebat; sed quæ est causa, cur vnguium radicibus maior, quàm aliis partibus dolor incidat? quia pars illa nerua admodum cum sit, maioris frigoris vim perpeffa, magis etiam fuit debilitata, magisque quàm alix ægrotat, vnde obiecti vim magis perferunt. Fieri autem eo quod status qui intra perfrigeratos vngues est, distendatur, & agitur, quod dicebat Vallicius, non est necesse, fortè enim à maximo ignis calore potius dissoluatur, seu discutiatur omnino, quàm distendatur, & agitur, quod moderatioris caloris opus sit, sed & cur potius in vnguium radicibus, quàm in aliis partibus itidem conclusis, dolor hic excitetur, non video causam. Cum igitur in singulis affectis partibus dolores sint acerbissimi, quia duo sunt, & vehementes ex contrariis causis orti, acerbiores tamen in vnguium radicibus, quia pars hæc maxime affecta, est maxime nouæ affectioni obnoxia.

Solutionem continui & intemperiem esse utrumque doloris causam, neutram verò propriam, & proximam. Auerores improbat.

Mercurialis refutatus. Solutionem per se absque intemperie, intemperiem necessario cum solutione dolorem efficere. Galeni loca nonnulla diligenter expensa.

C A P V T I V.

DOLORIS causam, & rationem propriam, atque proximam, ac veluti formam superiori capite comprehendimus, ostendimusque esse mutationem celeriter, & violentè excitatam, quæ erat altera de definitionis doloris particula. At quoniam mutatio hæc ab aliis dependet, seu causis, seu dispositionibus, seu modis, maioris & manifestioris doctrinæ gratia, diximus definitioni illa addi posse, ratione solutionis continui, aut in temperie: hæc enim duo sunt, quibus mutatio illa consistit. De his igitur, ut tota doloris natura evoluta pateat, sunt nunc quædam vberius explicanda. In primis igitur solutio continui, & intemperies doloris causæ ita existimantur, ac proponuntur à plurimis, tanquam proximæ causæ sint: quod verum non puto: & illi tamen dissident inter se, quòd alij utranque, alij unam tantum, & alij quidem hanc, alij illam doloris causam statuunt. Nos ea de re, quæ adnotata habemus proponemus: verum quoniam Galenum Medici auctorem ea de re sequi se proficentur, nosque inde sequimur, quædam ipsius loca ad id faciendū prius recitanda sunt, ut huius auctoris mentem liceat exquirere, tum alia proponenda. Igitur libro artis medicæ cap. LXXX. scribitur, *dolorem quæcumque obideris licet, aut continui solutionem, aut subitam alterationem ostendere. Tercio inde de compositione medicamentorum secundum loca, capituli dolores necesse est, primum communibus generibus causari, unde dolores efficiuntur subiectos esse, solum inhi videlicet: continuitatis, aut in temperie. Duodecimo methodi cap. VII. Necesse est, ut afflicti qui dolorem excusat, vel dimisso sit, vel alterati. Secundo acutorum primo: Dolor in sensibilibus sui corporibus, mutationem subitam in id, quod præter naturam, est suscipiendis. Mutatio autem hæc duplex, aliâ quidem, dum ipsa sum subito simulque secundum qualitatem alterantur, aliâ quoque, dum continuus soluitur. Sunt autem præter hæc alia etiam non pauca loca, quibus Galenus eandem rem proponit, ut videatur manifestè ex illius auctoris sententia constare, tum ab intemperie, tum à solutione continui dolorem excitari, atque ab utroque separatim, & absque alterius auxilio, id enim indicat particula, aut, quæ in ea re exprimenda Galenus utitur, separat enim, & disjungit alte-*

rium ab *intemperie*, ut ratumne aqua ab *vehementi* calore, & ab *intemperie* deatur; nec tamen a omnino rem se habere ex his eiusdem *causis* locis appareat: est enim cum causam totam in solutionem committit, sicut, nec ab *intemperie* dolorem excitari, nisi merito solutionis continui velis; locus est libro quarto de simpl. medicam. facultatibus cap. 1. ubi non pauci docet frigidum contrahendo substantiam condensando, & constringendo, ac ideo diuellendo continua, dolorem efficere, calidum autem fundendo, liquando & erodendo, atque per hunc modum similiter continuum soluendo. Eandem hac de re opinionem non solum affert Galenus commentario tertio in librum Hipp. de fract. rex. XXXIV. adducto etiam ex quarto libro de simplicium medicamentorum facultatibus loco, quem paulò antea proposuimus. habent autem verba si. *Indicant autem dolorem in de oriri, & quando continuum soluitur, ubi si. ut, ex: enditur, aut continetur, & quòd immoderatum incidat temperamentum. Aliqua solutionem cuius ad vltius spectare cuius manifestum est, sed immoderato temperamēto, ubi subita mutatio accidit, aliquà fieri continui solutione in opere de simpl. medicamentorum facultatibus de monstrauimus. Calorem quidem constat penetrare, & quasi excedere quod continuum est: frigus item, quod vehemens est, cum subito cogit, qua soluta sunt aliquam creare solutionem, in eodem opere ostensum est. Eandem rem scribit libro de inæquali intemperie cap. 6. adducto etiam Hippocratis loco. Sunt autem hæc verba: Immo tunc verò calor, ac frigus proximè accedunt, ut unitatē soluant: plus minus quidem calor dum segregat, ac incidiis subsistere continuitatem, summum verò frigus, tum stipando, tum introrsus parueri tradendo, quadam exprimit, quadam quassat. Sed & in libro XII. methodi medendi cap. 7. ea de re ita scribit: Illud verò inquirere, an ipsum quod vehemens ex exalfacit, aut refrigerat, diuisionem aliquam continui efficiat, longiori fortasse disputatione reger, & utique hoc ostensum à nobis est in Commentariis de simplicium medicamentorum facultatibus. Si igitur intemperies dolorem excitat, quòd operetur solutionem continui, eiusque solutionis beneficio; iam solam continui solutionem doloris causam proponere licebit, & aliam omittere, aut saltem non ex æquo: solutio enim continui proxima, intemperies, remota videtur causa; quippe intemperies solutionem operatur, hæc dolorem. Ad hæc dicimus. Primum quidem, nec intemperiem, nec solutionem continui esse doloris propriam causam, aut proximam, neutramque ex illis à Galeno causam proximam vnquam fuisse dictam, nec verò esse: Vna enim tantum vnus est causa propria, & proxima, hæc autem doloris, ut superiori capite pluribus comprehendimus, est mutatio à naturali statu confectum, & violentè exortata, quæ XII. Methodi dicitur crucians affectus. Hanc autem mutationem ipsam oriri, & effici duabus ex causis modò propofitis, solutione continui, & intemperie, non obscure scribit Galenus commentario I. in librum Hippocratis de ratione victus in acutis rex. primo. quem locum etiam antè recitauimus per hæc verba. *Discimus etiam, & in libris, quos de symptomatum causis, fecimus, quòd calor 172**

scribitur: fiat corporibus mutationem subitam in id, quod præter naturam est: sup-
 sapientibus: & quod duplex est hæc mutatio, aliis quidem dum ipsa, tum subito
 simulque secundum qualitatem alterantur, alias vero, dum continuas soluntur.
 Igitur illæ sunt causæ remotiores, mutatio autem confertim, & violenter
 incidens, causæ proxima; unde & Galenus licet alicubi illa appellet cau-
 sas; secundo de locis affectis cap. quinto appellat modos, aut rationes,
 doloris, Græcè *ἄφοροι*, Copus vertit species: sunt autem hæc Galei ver-
 ba: *Ceterum alibi me frequenter dixissemini, primas doloris species [ἄφοροι],*
duas esse, quum affatim inter peries alteratur, atque cum voluitur continui. Sunt
 igitur modi, rationes, aut differentie mutationis, ex qua fit dolor: mu-
 tatio enim partim ex solutione continui est. Verum si hæc fiant sensim,
 non autem confertim, ut si intemperies paulatim fiat, & continuum
 sensim diuidatur, nullus fiet dolor: hæc igitur causæ proxima est, illæ
 verò causæ remotæ; an ne verò ex æquo, seu æquali ratione, quod qua-
 rebamus? Proxima enim ob eam rem solū allata, ut quas dicit dolo-
 ris causas Galenus, quum solutionem continui, & intemperiem dicit,
 non existimus dici proximas, quod multi non observant, sed re-
 motiores intelligi. Quid verò de questione proposita scripserit Galenus,
 ex adductis locis licet intelligere; sed quoniam controuersa loca sunt,
 cum alibi ex æquo proponat, alibi aliter doceat, concilianda illa sunt,
 quod faciemus paulò post: Interim hæc de se explicanda quædam sunt,
 & in præmissis non est omittenda, aut Auerrois, aut Auicennæ opinio, quo-
 niam clarissimi & in philosophia, & in medicina fuerunt. Auicennæ
 igitur libro primo fen ij. doctrina ij. cap. XIX. utrasque, quas & Galenus
 doloris causas proponit, intemperiem, quam ipse malam complexio-
 nem, aut malitiam complexionis appellat, & continuum solutionem. In-
 quirat deinde in Galeni opinionem diligentius, & sicuti res est, nosque
 eam proposuimus, scribit, Galenum cum eius verificatur intentio, id est,
 ut ego interpretor, cum subtilius, & exactius rem exquirat (verifica-
 tionis enim nomen sapius ab Auerroë pro demonstratione sumitur)
 igitur cum subtilius rem Galenus examinat, ad hoc ea reducit (ipsa sunt
 Auicennæ verba) ut essentialis causa doloris, non sit nisi solutio conti-
 nuitatis, & non aliud: & quod calidum dolorem non facit, nisi pro-
 pterea quòd continuitatem soluit: & neque etiam frigidum dolorem ef-
 ficat, nisi propterea quòd continuitatis solutio ipsum comitatur: pro-
 pter multam nempe spissitudinem, & coadunationem ipsam, pro-
 cul dubio sequitur, ut partes ad locum aggregentur, ubi spissantur,
 & ut à loco separentur à quo trahuntur. Hanc autem opinionem refutat
 paulò post Auicenna, statuens intemperiem essentialiter esse causam
 doloris per hæc verba: *Certa autem dictio in hoc modo est, ut complexionis mu-
 tatio ponatur genus, ex quo dolor essentialiter provenit, licet cum eo quandoque con-
 tinuitatis separatio contingat, huius tamen declaratio verificata, in Medicina non
 continetur, sed in parte sapientie naturali.* Post hæc adducit quasdam rationes

Auicenna, quibus probare nititur, ab intemperie, cum ibi nulla subsit continui solutio, dolorem fieri: mihi autem superfluum videtur, illas aut adducere, aut refellere. Quippe & Genilis in Commentario ad eum locum illis satisfacit, commodèque Galeni opinionem nos tueri posse affirmat, etsi ipse, quia interpretaretur Auicennam, quod ipsèmet dicit, Auicennæ opinionem eo loco tueri maluit. Auerroes autem libro tertio; quem Colliger appellant cap. XXXI. improbauit & Galenum, & Auicennam. Quippe solutionem continui nullo pacto esse causam doloris, quod si tamen cōingat, id porro euenire ratione intemperiei, quia solutionem continui sequitur intemperies, illiq; iungitur, alioquin minime futurum dolorem. Hec porro sententia Galenicæ antea propositæ ex libro de simplicium medicamentorum facultatibus, ex diametro, vt loquuntur, est opposita. Ab intemperie enim vt à calore, seu frigore superiâte ideo gigni dolorem scribebat Galenus, quia ab iisdem fusa, colliquata, ac erosa, stipata, contracta, & coacta substantia, soluebatur continuitas, & ita intemperies beneficio solutionis continui excitabat dolorem: Auerroes autem ideo à solutione continui, quia ex ipsa gignitur intemperies, à qua dolor, & sic à solutionis continui beneficio intemperiei. Argumenta Auerrois sanè futilia, ab aliis refutata, & à nobis alibi, omitemus hâ præsentia, neque enim huc omnia congerimus, sed tantum seligimus. Inter recentiores Franciscus Vallesius libro V. controuersiarum, cum & intemperiem, & solutionem continui, vtrâque doloris causam statuat, non tamen ad continui solutionem, tanquam ad causam magis propinquam, intemperiem perpetuò esse reducendam vult, quod sentire Galenum, & dixit Auicennas, & nos superius ostendimus, & manifestius adhuc precedente oratione ostendimus. Dicit quidem dolorem semper esse cum solutione continui, non semper tamen ex solutione, alterantiâque non facere dolorem solutione, sed intemperie: solutionem igitur hoc casu non esse efficientem causam doloris, sed necessariò coniunctam, quæ etiam ille rationibus probare contendit. Hæc autem quod ad rem ipsam pertineat, fortasse non aduersantur Galenicis, sed subtilius rem distinguunt. Concedit enim Vallesius ab intemperie nunquam dolorem effici, quin iungatur continui solutio, non tamen in solutionem tanquam causam semper esse referendum, sed aliquando in intemperiem; Galenus autem ab intemperie fieri proponit operante continui solutionem, nec vnquam sine hac. Quid porro his interest? Sanè, vel hoc, vel illo modo dicere, continuique solutionem vel necessariò sequi ad intemperiem, vel ab intemperie effici, quid est aliud, quàm de vocibus litigare, cum doloris natura, nihilo melius hoc, vel illo modo declaratur? Aduersus intemperiem proponit Hieronymus Mercurialis argumentum, vt ostendat non posse illam esse doloris causam. Non est autè omittendū, quia licet peccet, eius dissolutio erit utilis. Est igitur eiuscemodi argumentum. Dolor fit subito, intemperies non fit subito, igitur dolor non fit

ab intemperie. Quò intendat hac argumentatione Mercurialis, non bene duplicitio; si enim ab intemperie non efficitur dolor, quin antea fiat continui solutio, bene habet, & ita Galenus sentit, uti declarauimus: at si nullo modo, labitur Mercurialis. Videtur autem ex argumentatione id colligi. Si enim ex intemperie non potest fieri dolor, quia illa non subito, hic subito fit, iam nec ex ea fiet subito solutio continui, quare neque ex hac subito dolor, unde nunquam à solutione continui, quæ fiat ab intemperie, erit dolor; quod etiam falsum esse, ex illis manifestissime liquet, quæ antea de Galeni sententia prolata sunt: sed Hieronymi argumentario manifestè peccat. Comprobat ille quidem utranque propositionem Galeni auctoritate, intemperiem enim non fieri subito ex secundo de symptomatum causis ca. 7. dolorem autem subito, ex primo de symptomatum causis ca. 6. Profectò, ut omitam alia, & concedam dolorem fieri subito, ex iis quæ habet Galenus loco adducto, licet ex toto non exprimitur, ubi scribit, Platonis etiam recitatis verbis passionem præter naturam, cum violenter, & confertim fit, dolorem afferre; sanè intemperiem, quæ dolorem facit, non posse fieri subito falsum est. Quod vel Galeni ipsius auctoritate facillè constet. Antea sanè adducimus hæc Galeni verba ex 2. de locis affectis capit. 5. *Ceterum alibi frequenter me dixisse memini primas doloris species esse, quum affatum temperies alteratur, & cum soluitur continuas.* Si ergo temperies affatum alteratur, fit illa subito. sed & hæc similiter ex commentario secundo in librum Hippocratis de ratione victus in acutis tex. primo adducta sunt. *Duplex est hæc mutatio præter naturam, alias quidem dum ipsa tum subito simulque secundum qualitatem alterantur, alias vero dum continuas soluiuntur.* Igitur semper subito, & simul alterantur secundum qualitatem, id verò non est aliud, quàm subito, & simul in illis gigni intemperiem, à qua dolor excitatur. Quid autem respondemus ad locum Galeni ex secundo de symptom. causis cap. 7. Non dici simpliciter, & hoc ipsum: intemperiem non fieri subito. Sed causas generationis apoplexiæ, & epilepsiæ inquirentem Galenum affirmare eas ex pituitosi succi multitudine in cerebri ventriculis collecta gigni, indeque fieri, ut subitanea sit earum, tam generatio, quàm discussio; quod accidere in corporum intemperie nullo modo potest Hoc igitur dicit Galenus, non posse morbum, qui intemperie consistet, subito fieri, & subito discuti. Igitur loquitur de intemperie, quæ est morbus, illa verò non subito, sed sensim, & tractu temporis in parte contrahitur. At intemperies ad quam sequitur dolor, est alteratio, non ex necessitate morbus. Si autem morbosa affectio aliqua sensim contrahatur, nullum profectò pariet dolorem ex se, nisi, quod sæpe contingit, iungatur alteratio alia, quæ dum confertim fit, dolorem parit; & verò Galenus, non intemperiem semper hanc causam, sed alterationem sæpius nominat. Verùm ex hoc sequi videtur, dolorem non semper esse symptoma morbi, si intemperies illa non est morbosa affectio: at dolor tactus symptoma pro-

ponitur à Galeno libro de differentiis sympr. cap. 3. cogit nos hæc ratio, ut omnino existimemus dolorem non fieri ab intemperie, nisi merito solutionis continui, qua de re proposita erat questio: ita autem dicimus: dolorem excitari ex solutione continui, quæ iungitur intemperiei fabricò factæ, minimè autem de necessitate, morbosa, morbus autem quem sequitur symptoma, eo casu est solutio continui. Igitur tum solutio continui, tum intemperies vtrique doloris causâ poniuntur quidem, sed proximior continui solutio, huius enim merito intemperies dolorem excitat. Quid igitur Galenus ex æquo vtrasque causas toties proponit? conciliatus modò si possumus loca; & verò lucem ostendit Galenus ipse suis verbis libro 12. methodi cap. 7. quem locum antea citavi; scribit enim. sic: *Ab his naturalibus notionibus, quæ omnibus nobis sunt communes, procedere melius: do ad id, quod considerandam proponitur conveniet. Porro naturalis notio nos docet vitium id corporis, ex quo sit doliturnum, aut continuitatis dissoniã oportere esse, aut alterationem aliquam.* Tum post nonnulla interiecta: *Illud. verò inquirere, an ipsum, quod vehementer excoctis, aut refrigerat diu sentiat, aliquam continui efficiat, longiori fortasse disputatione eget; & vique hoc ostensum à nobis est in commentariis de simplicium medicamentorum facultatibus: verum quid agenda, quæ vehementer, vel excoctum, vel refrigerant, dolorem inferunt, quæque, ad rem propositam munimè est necesse.* In his verbis observo Galenum in dignoscendis, & inquirendis dolorum causis duplici via fuisse progressum, quarum altera ex his procedit, quæ omnibus natura cognita sunt, sensuque ipso fermè promptè percipiuntur, dicunturque hæc naturales, & primæ notionēs: altera autem est, cùm cogitatione subtiliori, magisque exquisita ratiocinatione adhibita, res tandem innotescunt, nec nisi multo artificio coraprehendi possunt. Ac prima quidem ratione, doloris causæ apparent statim, æquali momento, ac viribus, tum solutio continui, tum intemperies: rem autem diligentius inuestigantibus, & variisque causæ vim, & momentum accuratius considerantibus, illud colligitur, intemperiem merito solutionis dolorem excitare, quam sententiam fuisse secutum Galenum constat ex loco recitato quarti libri de simplicium medicamentorum facultatibus, cùm alibi alia via incedentem, vtramque causam ex æquo proponere ipsum viderimus, & quoniam non promptè de intemperie res cuiuslibet apparebat, beneficio solutionis continui dolorem ab ea excitari, ideo XII. methodi, septimo, illud inquirere longiori disputatione egere affirmavit. Non est enim ita facile unicuique videre, ab excedenti intemperie, cùm illa dolorem creat, effici ante solutionem continui, quam illa sensui evidens non semper sit; unde libro. de inæquali intemperie cap. 6. quem locum antea citavi, non dicit excedentes intemperies unitatem soluere, sed proximè accedere, vt solvant, quippe exiguam efficiunt continui solutionem, quæque respectu illorum quæ secant, & frangunt, vix continui solutio dici mereatur. Et similiter commentario

3. in librum Hippocratis de fracturis, textu XXIV. scribit, immoderato temperamento, ubi subita mutatio accidit, aliquam fieri continui solutionem, aliquam nempe dicit, nimirum exiguam. Duplex autem continui solutio alia sensui euidens, alia minimè, sed ratione tantum contemplabilis proponitur à Galeno commentario 3. in librum Hippocratis de fracturis textu 34. quo posteriori modo ab intemperie solui continuum, scribit eodem loco Galenus. Igitur per se doloris causa, quæque absque alterius auxilio eum creare possit, solutio continui statuenda est. Potro huic sententiæ adhuc illa videntur aduersari Galeni verba ex libro de constitutione artis Medicæ cap. 9. quæ ita leguntur, *Pain ab his duobus prodit, ab alteratione per tota, & ex continui dissolutione, tanquam ad efficiendum dolorem utraque necessaria sint, nec una continui solutio satis esse possit.* Hæc verba quum exposuerimus, tum capiti finis erit. Dicitur igitur per alterationem per totum, non intelligi hoc loco propriè intemperiem ullam, sed aptitudinem solum ad patiendum, quæ omnino est necessaria, hæc verò tanquàm præcedens supponitur illi, qui causas doloris efficientes quærit: sola enim uero, simpliciterque solutio continui dolorem non efficit, non enim in lapide, aut ligno, sed fieri eam necesse est in corpore, quod pati possit, & alterari: denique in corpore, quod sensum habeat. Quinimo & ex eodem hoc loco, in vnam tantum continui solutionem reici à Galeno doloris causam, facile etiam colligamus, nam si subiecto habili, vnam tantum eam nominat causam, ab illisque duobus prodire dolorem scribit, intemperiem sanè reici apparet.

Dolorem gigni à continui solutione quæ fit, non ab illa, quæ facta est. Idem ab inequali intemperie, non ab equali: quæ equalis, & quæ inequalis, Hieremie Thrueri, Fuchsi, & Vallesij opinio. Ex Galeni locis res explicata, & definita Eiusdem Galeni locus ex libro de inequali intemperie accuratè perpensus, & aliter, quàm à Linacro translatus.

C A P U T V.

AB intemperie, & à solutione continui dolorem creati, non eadem tamen ratione, superiori capite ostendimus. Sed quoniam & intemperies, & continui solutio vario modo considerari potest, quædam ea de re magis distinctè à nobis adnotata proponere libet. Igitur continui solutio accipi potest, tum dum fit, tum postquam facta est. Fit continui solutio, dum pars secatur, vitur, pungitur, distenditur, facta est opere sectionis, visionis, punctioris, & distensionis absoluto Ab.

ea quæ fit continui solutione oritur dicitur, ab ea quæ facta est nequaquam. Testis Hippocrates libro de locis in homine per hæc verba. *Ij, quorum natura corrumpitur, dolore affliguntur, non quod natura mutata, aut corrupta sit*: Sed absoluta continui diuisione, natura mutata, & corrupta est: non igitur eo tempore possit amplius cruciari dolor. At quomodo inflato vulnere, tanque abstracto, & absente gladio continuatur adhuc in vulnere dolor? Duplicem ibi consideramus continui solutionem: primam ex gladio, quæ facit dolorem donec gladius secat, perfecta sectione cessat; alteram, quæ statim recedente gladio succedit, licet non sit adeo sensui conspicua ex humore ad vulnus locum influente, qui ex proximis particulis statim adueniens, vulneratam partem irritat, mordet, pungit, & distendit: subsequitur etiam sæpe tumor manifestus: durat autem tandiu is dolor, quandiu hæc altera solutio fit. Hæc de continui solutione. Intemperies similiter alia æqualis, alia inæqualis; ab inæquali fit dolor, non itidem ab æquali. Quæ potro intemperies inæqualis? Sanè etsi non pauca ea de re apud Galenum habemus tum alibi, tum præcipuè in libello huic tractationi dicato, De inæquali intemperie; eaque non adeo obscura, non tamen sine controuersia apud eius libri expositores res est. Hieremias enim Thriuerus putat Galenum existimasse, & docuisse inæqualem intemperiem esse diuersarum partium diuersam intemperiem, ratione cuius altera pars alteram afficit, id autem cum falsum esse putaret Hieremias, & inæqualitatem potius subsistere ratione diuersitatis qualitatum, quæ in se inuicem agerent, adeoque committi inæqualitatem per diuersam temperamentum eiusdem partis, ea de re Galenum reprehendit. Sed Leonhartus Fuchsius aduersus Thriuerum in vna etiam parte inæqualem intemperiem fieri, existimasse Galenum locis allatis, probare contendit, atque adeo in vna, & eadem parte diuersum esse temperamentum, eamque inæqualiter alteratam ex Galeni sententia, quæ erat Thriueri opinio. Subsequutus Franciscus Vallesius, inscitiz utrumque accusat, & inæqualis intemperiei rationem ab utroque ignoratam apertissimè dicit. Existimat autem Vallesius inæqualitatem intemperiei secundum partes subiecti corporis esse, quod tum ex Galeno probat, tum multis à se allatis ad totam rem declarandam: sed cum illa mihi quidem satis obscura videantur, atque adeo Galenicis minùs aperta, quod ipse Thriuerus, & Fuchsio obiicit, ideo Vallesiana ista omittentes, deque nostro penu, sed à Galeno hausta depromentes, totam rem declarare conabimur. Duo Galeni loca sunt eadem sibi, quibus inæqualis intemperiei natura declaratur. Alter scriptus est cap. i. libri de inæquali intemperie ad finem his verbis: *Quod autem huiusmodi intempries inæquales ab æqualibus eo distent, quod in omnibus intemperanter affecti corporis partibus æqualiter non insint, id clarè liquet*. Alter autem secundo cap. per hæc verba: *De inæquali intemperie nunc agendum, tum quæ eius natura sit, tum quot eius generande modi*. Ergo quod in omnibus particulis corporis, quod ita est affectum, con-

ea temperies non sit. prius dictum est, significat autem hisce verba ex primo cap. allata, at quoniam contrariorum eadem est disciplina, præstat illa etiam asserere, quæ de æquali intemperie proposuit cap. 3. Hic enim cum explicaret differentiam illam inæqualis intemperies, quæ in musculo sit ex inflammatione, modolque doceret, quibus siue bene, siue malè terminat inflammatio, & inæqualis intemperies, si quidem bene, terminari dicit, vel per discussionem, vel per concoctionem, quarum alterutra ad finem perducta per illas vias quas proponit, ad naturalem statum rediret musculus. Id verò dicimus non esse aliud, quàm temperiem æqualem, sed propriam parti, & salubrem, quam in præsentia non querimus: At si malè terminet inflammatio, victæque à fluxione particulæ fuerint, sit æqualis intemperies morbosa, quod per ea patet quæ subdit Galenus, scribens in tantam deuenire intemperiem partes, vt tum peccet earum actio, tum ipsæ temporis spatio corrumpantur; desinere autem tum priuim dolere, quum ei quod transmutat fuerint assimilata; non enim quum iam mutatum est temperamentum, sed dum mutatur, dolent particulæ, quemadmodum etiam admirandus dixit Hippocrates. *Hi quibus alteratur, & corrumpitur natura dolores sunt.* Ex his patet æqualem intemperiem esse, quum in parte intemperie affecta, vnica, consentiens, & sibi similis est intemperies: inæqualis, quum non vnica, sed dissentiens, & dissimilis inter se. Si autem non est vnica, nec sibi similis, necesse est partes rei dissimili, nec vnus naturæ, aut rationis subiectis, non æqualiter, sed inæqualiter affici, & variare temperie, quod de inæquali intemperie dicebat alenus; sed explicemus rem magis apertè. Dicimus inæqualem intemperiem non esse vnicam, quia ita laborans continet plures: licet, vt existimo, & vt progrediens ostendit oratio, non in quolibet inæqualis intemperies affectu, ex æquo & pari modo. Igitur non est vnica, quæ constat temperies, sed est mixta, seu composita, aut conflata ex duabus, idest, ex qualitate extranea, ac alterante, & ex temperamento partis proprio, & naturali. Hæc autem duo inter se pugnant, quippe contraria sunt, alterum secundum naturam, alterum præter naturam, alterumque alterum vincere, & superare contendit. Si pars vincit, redit ad propriam naturam, & propriam temperiem, & est temperies æqualis, sed sana qualis antè erat, si vincitur, sit itidem temperies æqualis, sed quæ melius dicatur intemperies, eaque morbosa, seu potius lethalis. Nimirum est æqualis & similis per totum, quoniam extranea qualitas, posita victoria aduersus partis temperiem, eaque de propria sede deturbata, effecta veluti naturalis domina ipsa est, in prioris locum succedens, & inde nullus dolor, vt in æquali, quæ naturalis est temperies: At medio tempore, dum pugna sit, inæqualis intemperies occupat ipsam partem, quæ mixta ex duobus illis aduersariis intemperies est. De hac pugna, & mixtione verba faciens Galenus capit. quinto ita scribebat: *Quod si longiori tempore hoc patiuntur partes, etiam vincuntur aliquando, præstis-*

que mutabuntur, ita ut non amplius calefiant, sed iam sint præter naturam calefacte. Terminus autem alterationis cuiusque particule, actionis eius est lesio, ad quem usque terminum latitudo, via est in id quod præter naturam est, velut mixta communis, ac media ex utrisque contrariis composita, eo scilicet quod est exquisitè secundum naturam, & eo quod iam est præter naturam: toto autem hoc tempore corpus incallescens, pro quantitate alterationis, proportionem etiam respondentem decerem obinet. Quod autem hoc loco dicit, Terminus autem alterationis cuiusque particule, actionis eius est lesio, illa respiciunt, quæ antea posuit scribens, partes à fluxione victas in tantam devenire intemperiem, ut pereat earum actio, tum ipsæ temporis spatio corruptantur: verè enim hoc per æqualem intemperiem contingit, ut & actiones pereant, & partes corruptantur, non tamen statim, ac facta est; unde colligere licet, æqualem etiam intemperiem ac factam, spatium quoddam, & latitudinis terminos obtinere: læsam quidem esse actionem statim dicere possumus, ut hic scribitur, atque etiam insigniter, non tamen prorsus corruptam; non enim viuerent, at viuunt hæctica febre detenti, quam æqualem intemperiem sapius inculcat Galenus. At quomodo potest hæc dici intemperies facta, & æqualis; non autem fiens, si quum dixerimus obtinere latitudinis spatium aliquod, adhuc progreditur mors, unde subinde fieri colligatur? Respondemus dici factam, & verè esse factam, quia natura nil ampliùs pugnat, immutatrici. n. qualitati omnino cessit, hæc tamè extranea, & immutatrix qualitas toto eo tempore, quo miserè vita trahitur, subinde magis partes adhuc contaminat: licet absq; pugna, unde cum sedare fiat, non percipitur à scissibus cruciatus aut dolor. Non video quomodo aliter dicere possimus, hæcticas sub quibus vita, quinimo à quibus aliquando restitutio sanitatis est, æquales esse intemperies, nisi hæc, saltem ultimas, velimus ab æquali intemperie excludere, quod quidem si cui libeat, per me quidem liceat. Possimus igitur ita describere inæqualem intemperiem; Inæqualis intemperies est mixtio qualitatis extraneæ, & temperamenti proprii inuicem pugnantium; æqualem autem morbosam sic: Æqualis intemperies est qualitas extranea, quæ assimilauit sibi naturalem subiecti temperiem. De hac autem extranea, & aduëctitia qualitate, quæ proprium partis temperamentum immutat, & sibi assimilat, non est silentio inuoluendum, eam vario genere distingui. Aliquando enim vnius speciei qualitas vna tantum est, aliquando vnius generis plures, aliquando etiam plures contrariis qualitatibus præditæ. Vnius speciei vna tantum qualitas est, ut solus calor, aut frigus affligens: plures eiusdem generis, ut plures calidæ sicut æstus, motus, & ira: contrariæ autem, ut cum aliquæ calidæ, aliquæ frigidæ sunt. est hæc doctrina ex Galeno libro de morborum causis cap. 6. potissimum quod ad postremam partem attinet. Sunt autem hæc Galeni verba: *Quod verò huius sermoni necessariò addendum, & definiendum est, dicamus; nempe, quod corpus sæpenumero ab omnibus causis eiusdem inter se speciei alteratur, sæpenumero etiam quod facultatibus inter se contrariæ sunt: & quod nonnunquam*

quam videntur illa, quæ sunt, vel numero plures, vel tempore diuturniores, vel robore et potentes. In eodem etiam bibeat qui ex quo leditur corpus: et si autem fieri non possit videatur, et eundemque corpus calidius una efficiatur, ac frigidius, humidiusque, ac siccum quæ impro naturæ habitu, sed ipsum tamen contingit, & in vitio nec aperies me iualis appetatur, de qua nobis separatim in alio volumine scriptum est, quam nun res ipsa postulabat. De hac eadem inæquali intemperie à causis contrariis exorta, agit etiam Galenus libro de inæquali intemperie, cap. 8. Quamquam autem loco recitato ex libro de morborum causis, solam inæqualem intemperiem videatur dicere hanc postremam, quum plures & contrariæ qualitates extraneæ propriam temperiem oppugnant, adhuc tamen quæ ab una aut pluribus inter se similibus fit, inæqualis etiam dicitur in libro de inæquali intemperie: quippe attenditur inæqualitas, & dissimilitudo, ac pugna inter qualitatem extraneam, & partis temperiem naturalem: iustius tamen inæqualis, & magis dicitur alia, quæ dissimilitudinem, & inæqualitatem maiorem obtrinet, quippe ibi non tantum dissimilitudo est temperamenti naturalis partis cum qualitate extranea partem occupante, eorundemque inæqualitas, sed & in qualitatibus ipsis extraneis: quibus adhuc accedunt earundem contrariarum qualitarum tensiones contrariæ quæ ibidem sunt, cum sensus contraria obiecta simul percipiant, ut calorem, & frigus, quod non ita in aliis contingit. Proinde subiicit Galenus *Notetur*, id est, decenter & merito, eam fuisse appellatam inæqualem: ideo diximus antea corpora inæquali intemperie affecta, non ex æquo esse affecta, quam rem magis aperiemus, proximius explanantes illud de quo contendere proposui Thriuerum, Fuchsum, & Vallesium; utrum vnius, & eiusdem partis, an diuersarum sit hæc inæqualis intemperies, seu utrum inæqualis intemperies committatur per diuersam diuersarum partium temperaturam, an eiusdem vnius enim, & eiusdem existimat Thriuerus, diuersitatem autem esse inter qualitates, eaque diuersitate temperiei inæqualitatem subsistere; & quod Galenus plurimum partium eam posuisset, lapsus dicit, & sæpius refutat: vnius etiam Fuchsius, qui & aduersus Thriuerum, vnius quoque eandem proposuisse Galenum vult: At plurimum Vallesius, ac ita existimasse Galenum: Thriuerum autem, & Fuchsum, sed aliter deceptos esse. Dicam & ipse inter hosce clarissimos viros opinionem meam, nec eorum dicta, aut rationes colligam, nisi si quid interim incurrerit, illud amouebo. Puto autem dici posse, & vnius partis diuerso temperamento, & diuersarum etiam consistere inæqualem intemperiem. Quinimo diuersarum non eodem modo, cum partium diuersitas non eodem modo semper sit, quæ admodum ostendemus. Porro autem quod vnius partis est, illud diuersitate qualitarum subsistit, quæ in se mutuo agunt, & hac diuersitate, ut puto, inæqualis intemperiei natura maxime consistit. Hæc autem mixtio illa est quam proposuimus in definitione (ex definitione enim dubitationis dissolutio nobis est petenda, quam utilitatem præbent bonæ defini-

tionem) quis autem neget talem mixtionem qualitarum in vna parte non
 pars vna quælibet minima habeat propriam temperiem quæ opposita
 possit? Et verò non dissentit Galenus, qui libro de morborum causis,
 capite sexto, subiectum huius intemperiei vnum ponit scribens: *Es-
 se verò nullo modo fieri posse videatur, ut vnum idemque corpus, calidum vnà
 efficiatur, ac frigidum, humidumque, ac siccum, plusquam natura sit op-
 portunum; tamen & hoc ipsum vsu contingit, & merito inæqualis intempe-
 ries appellatur.* De libro de inæquali intemperie capite octauo tum exterius
 ab eo qui sub sole æstiuo frigida perfundatur, simul & calorem, & frig-
 us percipi dicit, hoc est, quælibet perfusi corporis parte, vt existimo,
 cur enim magis hac quàm illa? Tum eodem loco, in febribus hepialis
 vniuersum corpus anibo sentire, quippe minimis portiunculis aspersum
 esse tum calidum, tum frigidum, neque licere vllam eius sensibilem
 partem desumere, in qua non alterutrum insit. Dixit autem hoc loco
 sensibilem partem, idest, quæ sub sensum cadat; non ita libro de ma-
 morum causis, sed vnum idemque corpus. Verùm ex hoc loco alterum
 illum exponendum puto; alioquin enim vt vna, & eadem penitus parte
 subsistat, & sentiat calidum, & frigidum, quæ sunt contraria, non
 puto fieri posse ita melius dici existimo quàm quod ait Fuchsius, posse
 subsistere simul, quia contraria sint tenuissimis gradibus. At vero per il-
 lum modum iam dicat aliquis, ea pars sensibilis alias partes habet ac-
 æ quarum dicitur temperies inæqualis, ita non vnus. Duo respondet.
 Primum, partem sensibilem minimam non posse amplius à Medico di-
 uidi, qui artifex est sensibilibus adhzrens, ideo inæqualem intempe-
 riciem vnius partis ab eo dici, quæ ita est vnus, vt iudicio finis amplius
 non possit diuidi. Alterum dico inæqualem intemperiem, de qua Ga-
 lenus hoc loco verba facit, idest, quæ constat ex calore & frigore si-
 mul perceptis, non esse vnâ solam intemperiem inæqualem, sed duas,
 aliam à calore, aliam à frigore, sicuti ipsemet expressè dicit ad finem
 capitis octauo libro de inæquali intemperie. Id autem si non valet omni-
 no, ad astruendam ex Galeni opinione inæqualem intemperiem ratione
 temperamenti vnius partis, valet ad eos & firmandos, qui tali interpre-
 tatione inæqualem intemperiem omnem, & simpliciter ab vna parte
 reueiebant: vna verò tantum inæqualis intemperies, quæ est mixtio,
 & actio qualitarum, quam diximus, vna duntaxat parte subsistere com-
 modè potest. Quomodo autem ratione vnius partis inæqualem intempe-
 riciem ascripsit Galeno Fuchsius aduersus Thiuverum in commentario
 libelli de inæquali intemperie, capite primo, absurdum puto: conside-
 rasse nimirum Galenum inæqualem intemperiem ratione vnius partis,
 quia eandem in vna quælibet parte fieri dicit, vbi timore aliquo præter
 naturam laborat. Si cum (inquit Fuchsius) inæquali intemperie pars
 vna tantum afficitur, necesse est vt in vna & eadem etiam parte diuer-
 sum sit temperamentum, eaque inæqualiter sit alterata. Verùm hoc nu-
 hil est.

1281. Consideremus Galeni intemperiem inaequalem in vna parte, possit, in membro, nec in vna parte, quæ tamen plures & varias habet particulas, ratione quarum dici possit intemperies inæqualis, sicuti eam ibidem considerat Galenus, ut apparet ex capite incum in inflammatione partis eam considerat. Igitur considerari potest subsistere inæqualem intemperiem ratione vnius partis tantum, sicuti ostendimus: potest etiam diuersarum, quinimo hoc modo ferè, semper à medico consideratur, quia ob vniuersorum partium coniunctionem nunquam vna pars intemperie afficitur, quin aliam quæ coheret, afficiat, licet non illico eodem gradu, sed hæc intemperiei inæqualis ratio non excludit priorem, quæ semper est necessaria: vnde in partibus ita affectis non vna, sed duæ considerantur inæquales intemperies. Vniuersarum porro partium ratione considerari inæqualem intemperiem à Galeno, ex eiusdem Galeni dictione toto libro de inæquali intemperie comprobare facile possumus. Nam cum diuersas inæqualis intemperiei differentias, per varia morborum genera toto libro percurrat, diuersarum partium intemperiem semper proponit, quod iam ostendo. Primo etenim capite illius libri fieri dicit, vel in vniuerso corpore, ut in anasarca, & febribus tum hepialis, tum aliis omnibus, præterquam hæcticis; vel in parte aliqua, ut cum vel œdemate, vel flegmone, vel gangrena, vel erysipelate, vel cancro laborat. Idem in elephante, phagedena, & herpete. De anasarca rem non explicat: sed cum hæc sit intemperies extranea, frigida & humida per vniuersum corpus, & singulas illius partes diffusa, naturæ cuiuslibet partis intemperiei aduersa, quam & expugnare contendit, variè tamen & inæqualiter ab ea singulæ partes afficiuntur, carnosæ à solidis, aliæque ab aliis vario modo. De febribus rem declarat nam ca. 4. in febribus quæ ex phlegmone originem habent, incallescere quidem aliquando sanguinem vniuersum dicit, quicumque calorem illum præter naturam, qui ex humore putrescente est obortus, concepit, non tamen, aut arteriarum, venarumve tunicas, aut aliud vllum circumiacetium corporum prorsus iam temperamentum suum mutasse, sed adhuc mutari, & alterari incallescens. Quod autem de febribus, quarum phlegmon est origo cap. 5. dicitur, idem tum de diarriis, tum de putridis absque phlegmone intelligi, apparet ex illis, quæ ca. subsequenti sexto proponuntur, inæqualem enim intemperiem in iis etiam adesse manifestè scribit, eodem autem modo adesse necesse est ac in aliis. Igitur ratione temperamenti partium diuersarum scilicet sanguinis, & partium solidarum. Idem porro contingit in intemperie, quam in qualibet parte considerat ratione phlegmones, aut aliorum morborum, quos proposuit: sed antequam de illa loquar, libet in febribus obseruare non vnam, sed plures inæquales intemperies, quam rem memini me antea proposuisse. Cum enim in earum qualibet admisceatur qualitas externa nativo temperamento, ex qua vna est inæqualis intemperies in qualibet febrientis corporis parte subsistens, adest itidem

non verò non exprimitur; non esse autem eundem in omnibus puto me
ante ostendisse. Per hæc apertè patet, inæqualem intemperiem, quæ
in toto corpore est, ratione diversæ temperamenti in diversis partibus
considerati; facile verò est idem quoque ex Galeno ostendere de inæ-
quali intemperie, quam in parte esse proponit; cap. enim tertio id pa-
tet, quum ut doceat quomodo in parte fiat inæqualis intemperies, do-
cet quomodo fiat ibidem inflammatio, nimirum variè ætatis substan-
tiis partis, quum sanguis quidem ferueat, idest, excofactus sit, ille verò
secum excofaciat, primum quidem, ac maxime arteriarum, ac vena-
rum tunicas, mox verò omnia, quæ extra illas sunt, ut eo capite ter-
tio scribit Galenus; ut hîc idem contingere appareat, quod de toto cor-
pore diximus. Patet verò id non minùs ex capite quarto, ubi docet
Galenus quomodo ex inflammatione, quæ est in vna parte, ad alias
transferatur affectio; ex variis enim causis accidere dicit, ut vel faciliùs,
vel difficiliùs, celeriùs, aut tardiùs, partes aliæ inflammationem con-
cipiant: difficile enim, si sanguis particulæ inflammatæ sit mitis, & qui
in aliis partibus mediocriter temperatus, promptius si illè feruet, & qui
in aliis partibus biliosus est: facillimè si ambo concurrunt: sanguinem
qui in arteriis est primum calefieri, tum qui venis dicit ibidem, quia ar-
teriosus, & calidior est, & magis spirituosus; non est necesse singula
commemorare: satis esse possunt, quibus orationem concludit hæc:
*quæ res necesse est multisimè fieri alterationes, siue alterum alicuius collum, siue
idem sibi.* Quod verò de inflammatione dictum est, idem de aliis affectio-
nibus dicatur, quas esse cum inæquali intemperie proposuit, quippe eo-
dem modo fiunt, vel ipso Galeno teste capite postremo illius libelli, ita
enim scribit: *Simili genere qui particula alicuius cum tumore morbi sunt, his quo-
que omnes: perinde ac phlegmone cum intemperamento inæquali consistunt, cancer,
erisipelas, carbunculus, herpes, œdema, phagedena, gangrena; & paulò post: Quod
ad propositam disputationem pertinet, hoc tantum dixisse abunde est, quod quilibet
que est fluxus, eadè ratione quemque prædictorum affectionum creat, quæ prius ex ca-
lida, & sanguinea phlegmonem gigni monstrauimus.* Sicut igitur in phlegmone
variè, & inæqualiter immutantur substantiæ, siue ad totum corpus, siue
ad partem, seu partes attinentes, ita etiam in aliis hisce affectionibus
immutantur. Quoniam verò inæqualis eadem intemperies sit aliquan-
do, nulla vel calida vel frigida substantia in particulam aliquam influen-
te: sed ipsa corporis temperie in qualitate mutata, ut scribit Galenus
capit. 7. quod scriptum est de inæqualitate, ac dissimilitudine, seu ra-
tione totius corporis, seu partis, scire licet, idem in hæc etiam locum
habere, cum extranea qualitas, quæ immitatur, ratione substantiæ, quæ
immutatur, immutat, illæ verò variam habent naturam, ac temperiem:
alia enim calidior, alia frigidior, ex quo sicuti de phlegmone cum muta-
tione dictum est, variè, & inæqualiter immutari necesse est. Verum dicat
aliquis ab eiusmodi inæqualitate non creari dolorem, cum etiam patet,

quæ secundum naturam se habent, ita sunt afflicta, ut non inueniatur
 ratio, quam os, nec tamen se inuicem laedant. Respondet eo, quod in
 parte sexto, esse quidem varia temperie affectas nosse, et rationem hanc sin-
 gulas, aliasq; aliis calidiores, & frigidiores: sed in hac intemperie altera
 & mediocritatē quādam, minimē verò excessum, fieri in inæquali in
 sa intemperie, unde corū, qui bene habent potius tēperies, quā intēperies
 dicatur, quum verò qualitates modum excedunt, tunc gignunt inæqua-
 lem intemperiem. Ostendit hanc rem Galenus exemplo aeris nos am-
 bientis, qui non prius offendit, quā ad immodicū calorem frigivē sit
 immutatus, cuius alioqui, quæ in medio sunt differētiis, tamen immen-
 sas, ac manifestum excessum inter se habentes, citra noxam sentimus. Ha-
 ænus, quæ dicta sunt de inæquali, & diversa temperie diuersarum par-
 tium, pertinent omnia, vel ad totum corpus, quod ex dissimilantibus par-
 tibus constat, vel ad dissimilares partes, quæ ex variis similibus substan-
 tiis, & partibus conflatae sunt. Quid autem similes, dicat aliquis? dis-
 par hoc temperamentum ratione diuersarum partium de eis ostendit. At
 verò ostendit Galenus cap. vltimo libelli de inæquali intemperie per
 verba apertissimè: *Sed non minus etiam similium, ac simplicium primumque*
in his corporum singula, sic à fluxione affecta ad inæqualem intemperiem deueniunt
ea ipsa, cum exterius quidem, vel excaesata, vel refrigerata, vel exsiccata, et
humectata pro fluxionis ratione sint, ad profundum usque tamen nondum va-
similiter sunt affecta: quod si tota per tota mutata alterataque sint, si nunc quidem
libera à dolore libera, in difficiliore tamen sic constituta sunt. Ita ut in
extremis verbis significat æqualem intemperiem inæquali succedentem.
 Cū igitur hætenus inæqualem intemperiem ex Galeni sententiā, il-
 liusque adeo testimoniis, vario & dispari temperamento diuersarum par-
 tium constare ostenderimus, siue consideretur in vniuerso corpore, siue
 in partibus, aut dissimilantibus, aut similibus, rem totam habuisse
 existimari merito possimus. Veruntamen auctarij gratia, rationi cuiusdam
 satisfacere libet, quam aduersus hanc sententiam proponit Thriuerus
 initio statim commentarij ad Galeni librum de inæquali intemperie. E-
 rit enim Thriuerus *Ab ignis aestu forsitan corpus dolebit, tamen si omne corporis*
partes aequaliter, hoc est, secundum proportionem incalscant. Igitur non vi-
detur hinc propriè nasci dolor, quod proxima pars suis inæqualitate alteram
afficiat: sed quia naturale patitur ab innaturale, modicum ab immodico,
adeo ut si fieri possit, quod una omnis in homine esset partium natura, for-
tè modicè calida, &, ut nunc dicimus, aut temperata: tamen, quod foris incidit
calidum aut frigidum, dolorem moueret, atque inæqualem intemperiem faceret. Ad
 hæc breuiter respondemus, fieri nō posse, ut omnes corporis partes æqua-
 liter, aut secundum proportionem incalscant: obstat nimirum, & singu-
 larum temperies, quæ varia est, & occurfus aliarum causarum, quas in-
 teæ ex Galeno proposuimus, ut nec ipsæ similes partes, in quibus id vi-
 deretur maximè habere locum, per hunc modum affici possint, si illic
 ratione

inæquale partium, quæ in superficie sunt, & illarum, quæ in profundo ab-
dunt, inæqualiter enim eas affici vult Galenus. Igitur modicum quidem
patitur ab immodico, vt ait Thriuerus, sed ab immodico inæqualiter
afficiente: cum enim æquale est huiusmodi immodicum, iam est intem-
peries facta, neque amplius afficiens, aut dolorem creans. quod autem
excogitare vult Thriuerus, æqualiter ab ignis æstu omnes corporis partes
excal fieri, aut vnam esse in homine omnium partium naturam, de ea re
non est, vt in præsentia disquiramus, neque de ea quicquam curauit Ga-
lenus, qui de inæquali intemperie commentatus est, secundum eam
quam homines possident naturam, & quam sensus ostendit, quem medi-
ci semper sequuntur; & verò inæqualem intemperiem, quam ex innatu-
rali mixtam proponit Thriuerus, accepimus etiam nos, & ex Galeno
comprobauimus, illamque ex necessitate semper subesse existimamus;
neque absque illa intemperiei inæqualitatem dari posse. Quæ tamen alia
ratione eueniunt intemperies, & ex dissimilitudine partium apertissime
constant, accipiendæ etiam nobis à Galeno sunt: dolor autem cum ab
ipsis pendeat, à nulla sanè nisi per continui solutionem pender, vti su-
periori capite ostendimus.

*Dolorem à calida, frigida, humida, & sicca intemperie creari, sed
alio, & alio modo. Galeni ea de re dicta inuicem pugnantis
proponuntur. Humidam intemperiem absque mate-
ria dari, aduersus Mercurialem. Galeni
loca conciliantur.*

C A P V T V I.

Ad intemperie inæquali fieri dolorem, & qua ratione fieret ostē-
dimus: quoniam autem quadruplex est inæqualis intemperies,
calida, frigida, humida, & sicca, deinceps ostendendum vtrum
à qualibet, aut à qua dolor excitetur. Non incommodè autem res deter-
minari posse videatur, illis in memoriam reuocatis, quæ superiori capite
sunt comprehensa, ab inæquali intemperie dolorem excitari media con-
tinui solutione: ex hoc enim fiat, vt quæ intemperies continui solutio-
nem operantur, aut ad quas continui solutio sequitur, illæ dolorem
gignant, aliæ non itidem, & quæ maiorem solutionem, maiorem dolorē:
vide videndum sit de hoc, sed quoniam rem totam de Galeni sententiā
explicare nitimur, sicuti alias omnes; is verò auctor, sententiā suā
de ea re non eodem modo semper proposuisse visus est, idcirco Galeni
loca sunt afferenda, tum posita rei determinatione, eadem loca conci-
lianda. Igitur sicuti à frigidityte, & caliditate, seu à calida, & frigida
intem

intemperie, satis constanter affuisse videtur Galenis dolorem excitari, & hunc euidenter; ita de humida, & sicca, non materiam explicuisse: libro etenim duodecimo methodi medendi cap. 7. scribit, euidenter eorum, quæ corporibus nostris propinquant, hæc sola esse dolorifica, quæ vehementer vel exalfaciunt, vel refrigerant, & quæ substantiæ continuitatem diuidunt, humum vel contundunt, vel incidunt, vel distendunt. Libro etiam primo de symptomatum causis, cap. 6. ait in tactu magnas accidere transmutationes à naturali habitu ob violentum calidi, & frigidi occursum; præterea ab his quæ contundere, secare, extendere, aut erodere possunt; humidum autem & siccum, si absint calefactio, & refrigeratio citi a violentiam corpori occurrere; inde autem sequitur, non gigni dolorem, qui violenta passio est. At Commentario secundo in librum Hippocratis de ratione victus in acutus textu primo, aliter videtur sentire, scribens dolorem fieri cum corpora subito alterantur, alterari autem subito ab efficientibus qualitatibus, cum calfiunt, refrigerantur, siccantur, & humectantur; & libro artis medicæ cap. LXXX. similiter scribens, dolorem quemcunque obsederit locum, aut continuitatis solutionem, aut subitam alterationem ostendere; alterari autem substantiam caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate. Cum enim dolor fit, cum substantia subito alteratur, subito autem alteratur à caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate, ab illis etiam dolor fieri. Hisce duobus locis videtur ferè in doloris generatione pares fecisse quatuor illas qualitates, cum duobus antea recitatis, humiditati, ac siccitati dolorem negauerit. Medio quodam modo duobus aliis videtur non posuisse. Libro enim de inæquali intemperie capite quarto scribit, alterari atque corrumpi cuiusque naturam, cum vel calfit, vel refrigeratur, vel siccat, vel humectatur temperamento inæquali, possit enim quidem exalfaciendo, & refrigerando, quum efficacissimæ qualitates hæ sint, tum verò exsiccando, vel humectando; & libro secundo localium capite primo, siccitatem facere dolorem, sed moderatum, cum calor, & frigus efficiant vehementissimos, ab humiditate verò nullum effici. Auicennas hunc locum ea de re manifestissime sequutus videtur, cum libro primo seu secunda, doctrina secunda, capite decimo nono, scriptum reliquit, calidum, & frigidum essentialiter, siccum accidentaliter humidum autem nullo modo dolorem excitare; de qua Auicennæ opinione pauca quadam ad finem capitis dicemus. Nobis porro conandum in primis est, vt adducta Galeni loca conciliemus, quod faciemus, vbi de tota re constitutum erit, duabus antea adhibitis distinctionibus. Altera est, in temperiem quamlibet accipi, & intelligi posse solam, & per se, idest, absque vllò materię affluxu, nec non etiam cum illa. Altera est, cum de inæquali intemperie quærimus, quæ ex illis dolore creet, intelligi posse, vel per se, & quatenus intemperies solam consideratur, idest, absque eo, quòd continui solutio manifestè appareat,

erat, vel manifestè hac apparente. His ita positis dicimus, ab intemperie, tum calida, tum frigida absque vlla extrinsecus affluente materia, dolorem fieri, cumque magnum nulla apparente continui solutione, à siccitate eodem modo, idest, nulla apparente continui solutione moderatum, quæ est asperitas quædam genita ob humoris penuriam, qui particulis omnes æquabat, quæ asperitas in volis manuum aliquando absque calore villo percipitur. Ab humiditate autem sine materia extrinsecus affluente nullum produci dolorem, quoniam humiditas ob vniū imbecillitatem immutari non potest confertim naturā; huc enim res est reducenda, & ex hoc totius quaestionis solutio pendet, si vera sunt illa, quæ superius libris capitibus sunt comprehensa. At si qualitates accipiuntur cum materiae affluxu, dicimus non solum à calida, & frigida, sed etiā ab humida dolorē excitari, & magnum, ab ea enim confertim de suo statu natura depellitur siccitas continui solutione, eaque manifestè, cum distenditur pars, ut contingit in hydropice, & aliis morbis. sicca autem intemperies à materiae affluxu potius lenitur, quàm exacerbat, nisi tamen materia peccet qualitate, quo casu ad alia refertur dolor. At eadem siccitas absque materia, cum solutione continui manifesta magnos etiam parit dolores, ut per convulsiones ex siccitate, & scissuras partium ex siccitate oritur, & si utroque attingit in vltionibus; hæc tamen siccitas, vel à caliditate, vel à frigore oritur, sed refertur ad siccitatem, quia proximior, & manifestior in effectu apparet. Sic Galenus XII. methodi ad finem, ex vehementi siccitate tendi, ac cruciari corpora cum proponat, convulsiones has ad febres, aut inflammationes, aut erosiones nervosorum corporum, quæ à caliditate maxima sunt, vel ab urgenti frigore oriri etiam testatur. Quoniam autem humidæ intemperiei absque materia, mentionem hic fecimus, à qua nullum excitari dolorem diximus, antequam ad alia conuertamur, euellendas nobis scrupulus est, qui forte alicuius mentem posset male habere. quomodo enim est humida intemperies absque humore, aut materia profecto si humida est, humorem in se continet? Hac ratione adductus Hieronymus Mercurialis talem intemperiem dari negavit, quam nos declarabimus, & Galeni auctoritate comprobabimus, haud obstante Aristotelis auctoritate ex libro secundo de anima tex. XIII. quam Mercurialis adducit, humidum semper esse cum corpore, aut non sine corpore, ut potius loquitur Aristoteles. Non est, ut puto, difficile videre, quod considerarunt, & viderunt antiquiores, qui huiusmodi intemperiem proposuerunt, quomodo sine humore dicitur, conceditur enim intemperiem humidam esse, & contineri in corpore; quinimo corpus, quod humida intemperie absque materia laborare dicitur, esse humidum; sed humidam intemperiem absque materia, & absque humore tunc intelligimus, cum ipsamet corporis substantia intrinsecus maderet, nulla extrinsecus affluente materia, cum enim talis fluit, tunc dicitur intemperies cum materia.

Dixit Galeno eiusmodi intemperiem fuisse propositam, quod dicitur licet ex libro de differentiis morborum, cap. 5. ubi de numero morborum simplicium loquitur, qui consistunt in intemperie, modò cum materia, modò absque illa: scribis autem de intemperie sicca, & humida in hunc modum: *Diximus de calidis, & frigidis affluibus, qui omnes substantia affluentia vacanti. Eadem ratione, & humida, & succa consistenti aggritudines tota alterascentie corporum natura, nullam extrinsecus materiam in sese recipiunt.* Ex his patet manifestè, corpus aliquando posse egrotare intemperie humida sine affluentia humoris, qui extrinsecus adueniat, & in aliquam partem recipiatur. Exemplum autem talis morbi, aut intemperiei proponit ibidem Galenus per hæc: *Quedam membra actò mucosa, & relaxata visu actui sentiuntur, ut si aliquam ex ipsa sem manibus tractandam accipias, protinus effluat, atque infusa aqua excidat digitum.* Affert etiam exemplum de ossibus, quæ mucida sunt, quæ vultu labiis humida intemperie, illinc profectò abuisse humorem quis dicit: nec tamen intemperies humida absque materia, ad illam relata, ad quæ materiam extrinsecus fuit. Hanc doctrinam puto adhuc confirmari potest illis quæ habet idem Galenus libro primo simplicium, cap. 8. ubi dicitur per calidæ facultate agit, quam vult exinanire quidem humores in vasis contractis, ac ita exsiccare, quod ego perinde accipio, ac tolli, e mueriam, quæ fluxit; ipsa autem vasorum corpora ab ea magis contracta, quod ego accipio, inducere eodem intemperiem humidam absque materia humida præsentia, sed & eandem manifestè sufficit proponit Accernas prima pars tractatuum tractatu secundo, & exemplum vultu dicitur de ossibus, materia humidum absque superfluitate materię & tunc dicitur in ossibus corporis, quæ laxa, seu mollis videtur, cum materia autem humida vel repletio ventris in laetitia, quæ humida, & in hoc, & in humida sine materia nunquam potest esse talis, ut contrahi possit, quæ nec ea nunquam dolorem excitat. Latent autem vultu extrinsecus materia extrinsecus aduenit, quæ partem distendat, & extrinsecus distendat solutione manifesta: dicitur, manifesta, in hærentes dicitur in superioribus capitulis comprehensæ, intemperiem omnem dolorem facit & media solutione continui, hanc tamen non semper innotescere. Cum igitur ob hoc, & in intemperiem doloris causa præsentia, quæ in frigida, & calida in equali intemperie solatio non potest, in humida, & succa appareat uti proposuimus, dolorem in intemperie humida non notari ab illis dicitur, quæ præsentia ad extrinsecus solutionem, quæ manifesta, referuntur doloris causa. Itaque ita fuisse intemperiem, quam puto esse veram, intemperiem, & innotescere Galeni loca. Primitum itaque XII. methodi caput septimum cum ageret de intemperantibus absque materia extrinsecus, quæ corporibus nostris propriis sunt, eundem intemperiem, & dolores, quæ vehementer vel exaltant, vel resolu-

sicuti etiam quæ sunt, hæc continentur, & continentur continendo,
 incidendo, & disteridendo, sub quibus comprehendere vultur humidi-
 tatem, & siccitatem, quæ cum eisdem dolorem pariant, hæc ratio-
 ne patiunt; Eadem est sententia in libro primo de symptomatum causis,
 capit. 6. in tactu magis a cadent transmutationes à naturali habitu ob
 violentum calidi & frigidi occursum, præterea ab his, quæ contunde-
 re, scire, extendere, & erodere possunt, humidum autem, & siccum,
 si ab sint cunctio, & refrigeratio, curam sententiam corpori occurrere,
 quod est non efficere dolorem; si autem humidum, vel siccum addatur vel
 caliditas, vel frigiditas, in caliditatem, vel frigiditatem referetur dolori;
 aut immoderatis existentibus qualitatibus manifesta fiet solutio conti-
 nuui, nam ex siccio calido fit vltio, sicuti etiam ex siccio frigido, vt in
 Boreali constitutione, ex quo dixit Virgilius in Georgicis, *penetrabile fri-
 gus adurit*. In vltione autem manifesta est solutio continuui. Humidum
 calidum incommodatum, & ipsum vrit, bullasque excitat, sicuti aqua
 feruens, sed humidum frigidum quale gelu, vehementer adstringendo
 solute etiam manifestio continuui; quare nisi cum caliditate, & frigi-
 ditate, siccum, & humidum haud efficiunt dolores magnos, hosque
 earum qualitatem beneficio, modò absque solutione continuui manife-
 sti, & modò cum illa. Ad altera duo loca, priorem ex secundo de ratione
 victus in acutis, dolorem fieri, cum corpora subito alterantur, alterari autè
 subito ab efficientibus qualitatibus, cum collidunt, refrigerantur, siccantur, &
 humentantur, posteriorè ex arte medica, dolorem quemcumque obsederit
 locum, aut continuui solutionem, aut subitam alterationem ostendere,
 alterari autem substantiam caliditate, frigiditate, siccitate, & humiditate
 Respondet Valleriola, ex his nos haudquaquam cogi asserere iuxta Gale-
 ni doctrinam, ab humiditate, & siccitate creari dolorem; non enim ex-
 preste id affirmare Galenum: sed eum dixerit, ab his quæ alterant, dolo-
 rem signi exempla eorum quæ alterant asserentem docere, esse hæc
 calida frigida, humida, & sicca, atque non esse necessarium ea loquen-
 di ratione, omnia hæc dolorem creare, sed omnia alterare; alterant igitur
 omnia, sed dolorem faciunt sola frigida, & calida. Adiuuat respon-
 sionem Valleriola, illa quippe adduci pro exemplis, in exemplis autem
 non omnino requiri veritatem. Hoc sanè postremum non faciliè admit-
 tatur, quamquam enim adducantur pro exemplis, adducuntur tamen,
 vt de illis qualitatibus, quod pertinet ad rationem doloris, habeamus
 doctrinam. Eorum autem verborum proposita interpretatio, seu ratio
 illa loquendi ita accepta, potest quidem habere locum in sententia scri-
 pta libro artis medicæ, vbi tantum dicitur, humida, & sicca alterare,
 non adiecta particula *ad dolo-*, id est, statim aut conferim; sed non
 potest accommodari ad locum secundi de ratione victus in acutis, in quo
 scribitur, dolorem fieri, cum corpora subito alterantur, alterari autem
 subito ab efficientibus qualitatibus, quum ab ipsis corpora calsiunt, re-

frigerantur, siccantur, & humectantur si cum alterantur cōspōa subito ad humiditatem, & siccitatem, ab his etiam dolorem patientur. Igitur ad hunc locum necesse potius est dicere cum Fuchsius, sumi hic qualitates non solas, & nudas, sed cum materie affluxu, qua irruente, & continuo soluente dolores sunt; videatur tamen scrupulum facere, quod eadem sententia dicat, dolorem fieri etiam ab his quæ continuitatem corrumpunt, ut in hac videantur à qualitatibus illis separari, nec humiditatem & siccitatem hoc loco sub eorum censum reduci posse, quæ continuū corrumpunt. Responderem, continuū solutionem verè esse separatum genus, & tanquam separatū sumi, quia ad eam, ratione propria nulla requiritur humoris affluxio, unde, ut apparet, abique illa fit, quod tamen ab ea fit focus qualitatibus siccitate, aut humiditate, iam hæc ad continuū solutionem euidentem reduci; ita seorsim posse numerari, quæ seorsim aliquando est, posse etiam siccitatem, & humiditatem cum locis qualitatibus numeratas, ad illam reduci. Reliqua sunt duo loca postremo proposita, alter ex libro de inæquali intemperie, alter ex secundo de compositione medicamentorum, secundum locos. Igitur scribit libro de inæquali intemperie, alterari & corrumpi cuiusque naturam, cum vel calefit, vel refrigeratur, vel siccatur, vel humectatur in temperamento inæquali, potissimum quidem excalescendo, & refrigerando, quam efficacissimæ qualitates hæc sunt; tum vero exsiccando, vel humectando. Hunc locum ita exponit Fuchsius, tanquam testimonium, quod vocat Galenus *alterari, & corrumpi*, accipiendi sunt, non *subiri*, & *mutari* de singulis qualitatibus quæ sequuntur, sed alter de alteris in eodem modum, ut primus, quod est, *alterari*, accommodetur siccitati, & humiditati, alteri verò, id est, *corrumpi*, caliditati, & frigiditati. Hæc enim Natura alteratur, & corrumpitur a calido, frigido, humido, & secundo, hoc est, corrumpitur a calido, & frigido, alteratur tantum ab humido, & secundo, non tamen ab his postremis corrumpitur, ex quo sequitur ab illis non gigni dolorem. ennuvero violenta est hæc expressio, cum mentem suam Galenus satis explicet, & sensus suus recipiatur, dicere, *potissimum quidem*, ut non facile appareat, verè terminis illis singulis quæ sequuntur accommodatis, sed non par ratione. An ad hunc locum dicunt, sentire Galenum a siccitate, & humiditate fieri dolorem, si illæ iungatur caliditas aut frigiditas, sicuti scripsit libro de symptomatum causis. Nos autem dicimus, intelligendas esse hoc loco qualitates illas alterantes, & corrumpentes cum materie affluxu; iam verò in accepta singula dolores edunt, maxime quidem, & euidenter, caliditas, & frigiditas inæquales, quia maximam ex se agendi vim obtinent, tum etiam siccitas, & humiditas, siccitas ex se obscure, cum materia autem, facta simul conuulsi solutione, euidenter, sicuti etiam contingit ab intemperie humida cum materia, ut diximus libro autem secundo de compositione medicamentorum secundum partes, qui postremis omnium

locus adductus est scribit Galenus, siccitatem facere dolorem, sed moderatum, id est, obscurum, a solo enim calore, & frigore evidenter, ut diximus; ab humiditate autem nullum, quippe sumit hic qualitates, seu intemperantias abique materia. Ita determinationi propositæ consona sunt omnia Galeni loca, nec inuicem pugnant. Quid autem de Auenennæ opinione, calidum & frigidum essentialiter, siccum accidentaliter, humidum autem nullo modo dolorem facere? an his quæ ex Galeno propositus versus consona: ex Galeno sane desumpta videntur, nec tamen illis eadem, sanè calidum, & frigidum essentialiter dicuntur dolorem facere, quia per se, & nulla continui solutione, ut ipse existimauit, cum existant: siccum autem accidentaliter quomodo? quia ob suæ constitutionis fortitudinem, ut ipse, aut eius interpretes loquuntur, continuum dissoluit. At verò cur id humiditati negatur, cum & ipsa partem repleudo tensionem efficiat? an siccitati conceditur, quia per se abique ullo materię auxilio id efficit, humiditas non efficit.

Ad unum, & eundem morbum contumaciter perdurantem, diuersa adeoque prioribus contraria remedia aliquando adhibenda esse. Hippocratis, Celsi, & Auenennæ loca ea de re collata. Argenterius aduersus Galenum, & alios interpretes refutatus.

CAPVT VII.

RÆCEPTVM in faciendâ medicina non ita prætereundum, verum studiose, ac diligenter attendendum proponit Hippocrates ij. Aphorismorum LII. vbi quædam ad morbum tollendum omnia secundum rationem expendere, & præcepit, quamquam secundum rationem minimè respondere videatur effectus, ad alia tamen haud transeundum, manente eo, quod à principio visum est. Quippe etsi sensui non sit per initia conspicua utilitas, ob affectionis contumaciam, quæ statim minui molliue non potest, esse tamen aliquam inuit, quæ tractu temporis se prodât, sicuti exemplo guttæ assiduo illius excauantis subiectam petram ostendit Galenus in commentatio. Hic veterem obiectionem renouat Argenterius. qui enim fieri potest, ut omnibus secundum rationem peractis, non sequatur effectus secundum rationem? Facilis est responsio ex declaratione proposita: sequitur effectus, sed non apparet per initia. At Hippocratis verba sunt: *Si non secundum rationem euenerit*: hæc ita intelligenda: si non statim appareat sensui utilitas. Arguit Argenterius, cognito morbo, sicuti ratio inuenit, quod confert, ita tempus certum non etiam definit, quod sit definiri non posse, & quod si exactè definirer, ratio non esset; sub latitudine tamen quadam ex morbi notitia

E 3 illud.

Idem conuenit. quare possunt dubitari, quæ accommodata, & satis ille existimet, non deperietur in temporibus. enim per inuentionem expectat, quod, ita diutius potest, non esse, nec per rationem fieri existimat, si non sit tum subter quædam effectus. Hoc argumentum coruētus, soluit aliter nodum Argenterius, nonnumquam quod ait Hippocrates, non oblitiscere secundum rationem, peti de accipiendum, ac si sciat, iuxta desiderium, ac voluntatem nostram: quippe si ex tunc cuncta sint perperita, & administrata, nec succedat, quæ in volumus effectum, non esse tamen cur pro illis in ægroti gratiam qui præ delictis febrium nimia properat, alia substituimus: expectandum enim quod dicitur, & dictat etiam ratio, spatium temporis accommodatum: sed non est necesse Hippocraticæ vocis significationem peruertere, ô Argenterii, cum notatione consueta locus Hippocratis optime se habeat iuxta propositam interpretationem: non enim in ratione temporis decipere dicimus, sed eò quod certam, & exactam cognitionem illius non habeat, (quam si haberi existimasset Hippocrates, non erat ut iurarent illam proponeret) possitque tum maturius, tum sciuis respondere euentus de remedium mutatione eum non cogitasse. Quod autem latitudine quadam præfiniri tempus ait Argenterius, quia meticuloſa erat illud spatium, ideo minus peritum, & fortasse dubi autem tunc cum confirmare voluit Hippocrates, quod & Galenus in commentariis cognouit, qui non exigua scientiæ munus esse scripsit, cum non negaret ex iis quæ rectè uisâ sunt, manifestè adhuc ueritas sequi, ad illam non transire, cum enim coniecturis nitatur morbi cognitio, in qua curationis dependet, & curationis effectus, medicus qui cunctis magis ualet, ille peritior artifex est: Artificialis enim coniectura, est in quodammodo inter exactam cognitionem, & omnifariam ignorantiam, ut scribit Galenus primo de locis affectus, capite primo, quoniam & ad ueritatem proximè accedere scribit ille idem primo de crasibus. Quam autem difficile sit hanc artificiosam coniecturam assequi, locus Galenus indicat, qui scriptus est commentario secundo in librum Hippocratis de ratione uictus in acutus tex. trigésimo. Quinque per hæc uerba: *Artificiosè autem conicere, uiri esse, qui uirè omnium, que in arte sunt digne it, memoria mandaueris, atque diligentia omni adhibita, se in peribibus si exterru, paucisque tales existere; & cuiuslibet etiam artificiosè conicere, saluare. liquando, proponit libro tertio Aphorismorum omnium, & ceteris. A. uisum. Porro utem cum affectionis cognitio reddat actem coniecturalem, ut suprà proposuimus, & ex Galeno patet. j. de compositione medicamentorum per locum hæc uerbis: *Artis curanda coniectura in affectuum dignoscione m. me con. qui ubi inuenti fuerint, curationem m. conie. iualuer, sed s. e. e. ind. an. id potissimum cont. ut ratione m. di, aut mens. seu gradus affectionis: ad speciem uero, seu qualitatem affectionis dignoscendam, dantur aliquando quædam signa patho-**

proponit à Græcis dicta, quæ ipsam vel certo modo esse valent. At
modos, seu mensuram haud potest innoscere, nisi res esset à natura, &
proprio habitu exploratus nobis sit, ut quantum *Altera* ipsam crederet
affectio cognoscamus: id autem comprehendere haud potest, nisi priua-
tim cuiusque natura, & habitus exactè à nobis teneatur, quæ *Idem* quæ
à Græcis dicitur, curamus enim non hominibus in eorum communi, sed hunc,
& illum singularem: hanc autem rem ita distulimus existimat Galenus,
ut de ea ita scripserit cap. lxxv. libro, tertio de methodo medendi:
*Ergo si cuiusque priuatum naturam explorare ad vniuersam artem, utique quantum
fuisse. Ergo si priuam mentem conipio, talem me esse putarem, sed quantum illi
non potest, certe, ut quod homini licet, quoniam priuam naturam, ut quod me
exhibere decreui, tum alios, ut idem faciant, adhibere.* Si igitur prædicta, ad
quem visque se intendat affectio, incertus est, incerta etiam est adhiben-
dorum anxiosiorum, mensura, quæ illi æquitate respondere debet, quæ
anxiosiorum incertitudine in artificiorum coniunctura indiget, præponit
Galenus loco antea recitato secundo de ratione victus in acutis, cap.
xxxvi. Quin etiam in libro de ratione curandi per sanguinis incho-
nam, cap. 12. nihil æquè artem medicam in agendo coniecturalem esse
tradit, ac cuiusque remedij quantitatem; ob hæc autem incertum
etiam tempus esse necesse est, ac vero in hac incertitudine, bene medici-
nans est, semper potius medicamentum citra subsistere, quam ultra
protrahere, ut quod debet, tuto erit; sic autem coniectura apparet effe-
ctus quippe affectionis modo, aut gradu, siue illa inter omnes sola sit,
siue et in materie abundantia, minime cognita, tempus etiam incer-
tum est, ac longius, quam medicus aliquando existimaret, licet iuxta
rationem, & indicationem ille procedat: quod habemus apud eundem
Galenum secundo de compositione medicamentorum per loca carere
primo per hæc verba: *Et quæ datur, quàm ægræ aliqua ratione medi-
ca cedat, in quibus rationabili ex iuxta indicationem remedii ratione, etiam
nihil scire in principio appareat. Atque hoc est quod in Aphorismo dictum est,
in quo ait, omnia secundum rationem facientis, ubi Galenus totam recitat
Aphorismum.* Hæc igitur ad antiquam, sed à Argenterio reuocantem,
ab antiquis breuiter, sed à nobis paulò vberius refutatam obiectum in-
dicta sunt. Cæterum cum hac Hippocratis sententia, confectam Celsi
locum ex libro tertio, capite primo, ubi remedium mutandam præ-
ponit his verbis. *Alterum illud ignorare non oportet, quod non omnibus ægris
eadem auxilia conueniant, ex quo incertis, et alia, atque alia sunt, quæ auctores
quasi sola indicauerint, prout etiam cesserant, oportet itaque ubi aliquid non re-
spondet, non tantum putare auctorem, quantum ægrum, & experiri aliud atque aliud.*
Vtrūque existimandum aduersari Celsum Hippocrati? Etiam verò, ut
alter magis ad rationem & causam, alter verò ad experientiam, & effe-
ctus spectasse videretur, quæ non semper consonare appareant, ita non de
eadem omnino re vtrunque auctorem loqui, sed de alia, & alia, patere
potest.

potest. De vno, & eodem agno, & a continenter agno, & affecto, loquitur Hippocrates, in quo non vult immutanda esse remedia, de eodem morbo, idest eadem morbi specie, sed in variis agnis loquitur Celsus, pro quo cum varia natura vult illa esse immutanda; quæ enim alicui codæ in morbo fieri proficua, alicui non itidem sint, & ideo scribit, non omnibus eadem conuenire auxilia: sunt igitur quæ proponuntur alia, atque alia, non verò repugnantia. Ex eo tamen ad eundem agrum labitur Celsus; & quoniam idem morbus in variis agnis variis auxiliis curatus est, quæ à variis medicis perscripta sunt, prout cuique cesserunt; fieri autem potest, ut ægri naturæ quæ tractamus, ex omnibus quæ proposita sunt, magis aliud quàm aliud conueniat, ideo si aliquid non respondet, ad aliud transeundum dicit Celsus. Hæc autem sicut Hippocrates sententiæ aduersari videntur, qui licet non respondeat effectus, vult nos in eodem auxilio manere, vbi maneat quod à principio indicauit, ita quadamtenus conciliari posse existimem, de quæ ea recte tota, ex illis quæ sequuntur, non malè decerni. Primum, medicamentorum mutationem posse esse duplicem, vel facultatis, vel materiæ, quippe eadem facultas, siue prima, ut calefaciendi, seu secunda, ut adstringendi, relaxandi, & similia, potest esse in varia materia, etiam eadem intentione, seu gradu. Cum igitur alterutra ratione esse possit, Hippocrates de mutatione facultatis præceptum posuit, Celsus de mutatione materiæ locutus est. Non licet igitur ex Hippocrate recedere à calefacientibus si illi morbus requirit, licet ex Celso recedere ab abstinthio, alio calefaciente substituto, si abstinthij vtilitas non appareat, isthæc autem inter se minimè pugnant. Verùm sicuti hæc ad duo rectata loca videntur accommodari posse, ita alia sunt apud Celsum, quæ manifestius eius auctoris sensum exprimunt, & facultatis eorum mutationem ad contrarium, liquido comprehendunt; hæc etiam ad finem præmij primi libri ita leguntur, *Quin etiam morborum in iisdem hominibus alia, atque alia proprietates sunt, & quæ secundis aliquando frustra curatus est, contrariis saepe restituitur.* Non igitur alia tantummodo hic auxilia dicit, sed contraria, quod in materiæ mutatione non possit locum habere. Repetit illud idem lib. 6. cap. 6. per hæc verba: *Hæc enim [balneum & vinum] ut in recentibus malis aliena sunt, quæ concitare ea possunt, & accendere, sic in veteribus, quæ nullis alijs auxilijs cesserunt, admodum efficacia esse consueverunt: videlicet hic quoque, ut alibi, cum secunda vana fuerint, contrariis adiuvantibus.* Dicimus ad hæc, duplex esse morborum genus, alijs enim manifestis constant qualitatibus, qui sæpius eueniunt, alijs occultiores habet naturam, & abditam proprietatem quandam, qui & rariùs incidunt. De illis præcepit Hippocrates veluti frequentioribus, ac de his loquitur Celsus, quod ex eiusdem autoris verbis appareat ex fine potæmij recitatis morborum in eisdem hominibus alia, atque alia proprietates sunt, ad morbos igitur proprietates quasdam in ægris habentes, contrariis auxilijs uti

usum innouat Celsus, non ad alios de quibus loquitur Hippocrates, Et
 verò sicuti ad morbos manifestis qualitatibus lædentes, manifestis qua-
 litatibus iuuantia auxilia præscribenda; ita ad eos, qui occulta quædam
 natura lædunt, occulta etiam totaque natura iuuantia auxilia valent: hæc
 autem, etsi ratione aliqua comprehendantur, quam in morborum cura-
 tione potissimum spectat Hippocrates, non ita tamen illi subdita sunt,
 vti quæ manifestè iuuant, sed infirmior est ratio, quàm vt eorum vsus
 sic calleat, vt aliquo non respondere, aliud experiri non debeat medicus,
 quod proponit Celsus, licet fortasse etiam ex manifesta aliqua qualitate,
 quæ simul cum abdita medicamento inhæreat, morbo, qui cum occulta
 natura manifestam etiam habeat qualitatem aliquam lædentem, videatur
 aduersari Est autem tanti momenti hæc obseruatio, adeoque utilis, vt in
 illis etiam, quæ à manifestis qualitatibus iuuat medicamentis, sit maximè
 attendenda, & pluries etiam ita vsucesserit. Quippe inter corpora, & me-
 dicamenta proportionibus, & consensus quidam occulti sunt, qui nō com-
 prehenduntur, nisi cum experientia, vt scribit Auicenna lib. 4. Vnde quod
 iuuare posse medicamentū ex aliqua manifesta qualitate existimatur, lædet
 occulta aliqua eidē hærente; quare illud mutasse vile sit: sed & ob assue-
 tudinem medicamenti, quod ex repetito sæpius vsu fit adeo naturæ fa-
 miliare; vt medicamenti vim non ampliùs obtineat, mutatio eorundem
 est aliquando necessaria: quam duplicem mutationis causam, ab Aui-
 cenna fere etiam propositam habemus libro primo, vbi duo hæc Hip-
 pocratis, & Celsi loca coniunxisse videtur ita scibens, vti admodum
 barbarè vertunt. *Præter hoc quoque tibi caue, ne à reſtitutione recedas, licet
 videris quod ipsorum tardetur iuuamentum, neque in errore moreris, & si videris,
 quod eius non appareat impedimentum; & cum hoc secundum vnā medicatio-
 nem, non cum vna tibi standum est medicina, immo in vna medicatione medi-
 cinas permuta, quoniam ab ipso, quod consuetum est non sit passio, & unicuique
 quidem corpori, immo omni membro, immo omni corpori, & vni membro in vna
 hora, & non in altera, inest proprietas ab vna medicina pati, & non ab altera.*
 Fuit igitur Auicennæ etiam medicamentorum mutatio recepta, etsi an
 materix, an facultatis, an in contrarium, an alio morbo expressum non
 fuerit: expressum tamen fuit eidentissimè à Celso illis verbis, quæ nos
 suprà recitauimus. Nec verò aliam rationem adducit Celsus, præter-
 quam experimentorum. Quippe fallacem admodum cum existimaret
 hic auctor medicinæ rationem, experientiz semper plurimum tribuisse
 visus est: medicinam enim coniecturalem artem esse, coniecturæ autem
 rationem talem esse dixit, vt cum sæpius aliquando responderit, inter-
 dum tamen fallat nos, vti scribit libro secundo capite sexto. Nec ab eo
 improbari ex toto video curationem propositam libro tertio capite no-
 no, qua ex antiquis temporibus reuocata, vterentur ea tempestate qui-
 dam, traditos sibi ægros, qui sub cautiore medicis trahebantur, in-
 terdum contrariis remediis sanantes; & quamvis temerariam appellet

eam medicinam, quod non suo tempore, sed præcipiti quodam periculo usurpara, sicuti faciebat Petto, plures interficiat, id tamen subiicit, cum omnibus eadem conuenire non possint, fieri ut quos ratio non restituit, temeritas adiuuer. Nos verò non temerarium, sed rationalem medicum ex Hippocrate informamus: nec tamen arbitramur à ratione alienum esse medicum, qui diligenrer omnia putet se expendisse, & ex artis præscripto adhibuisse, non respondere euentu, ad contraria transire. Potuit enim falli ab initio ratio. Et quis est, qui certò scire se arbitretur secundum rationem omnia agere? sanè Galenus terrio de compositione medicamentorum secundum loca, ubi de sonitu in auribus sermonem facit, cum eius symptomatis duplicem affectionem esse causam statuat, flatuosum spiritum, & exquisitam sensus audiendi subtilitatem; ex vtra harum fiat sonitus in principio cognitionem haberi non posse dicit: sed tempore opus esse, & post vsum pharmacorù, quæ ex artificiali coniectura sunt adhibita, id contringere. His enim prout cedit morbus, ita de coniectura artificiali, vtrum recta, an minus iudicium sit, & de affectione ipsa certò iudicari potest; ex quo etiam signorum ille fons defluxit à iuuantibus, & lædentibus, quæ sæpius ad morbi cognitionem acquirendam in medium adducit Galenus. Igitur in primis auxiliis nihil profectum est, & coniectura falsa fuit, ad contraria descendit, quomodo processit ipse Galenus loco recitato; cum enim incidisset in quendam auris sonitu laborantē, qui dissecantibus, & attenuatoriis, & diffusoriis pharmacis vltus, apophlegmatismis etiam, ac totius capitis prouisione, cum nihil profecisset, opinatus est Galenus non flatuosum spiritum, sed exquisitam audiendi subtilitatem sonitus causam esse: quare ad contraria auxilia progressus, & ex sensum stupefacientibus aliquid admiscens, quale est mandragoræ, & papaueris succus, eo symptomate ægrum liberauit. Ab eadem doctrina non dissentit seprina Epidemiorum antiquissimus auctor, hic enim eius libri textu secundo, cum morbi Polycratus historiam describeret eum decimoquinto die dolores ventris iuxta splenem, & sinistram lateris mollitudinem passum esse dicit, auxilia autem memorans scribit calidorum appositionem minis profuisse, quàm frigidorum, ut eidem morbo modò calida, & modò frigida adhibita fuisse remedia satis constet. Idem sentire videtur Auerroës libro quarto Collectæ. cap. xlv. hic enim cum signorum quæ morbos indicant, infirmitatē proposuisset de auxiliis eorundem scribit; si illorum vsu lueri aliquid ægro accidit, in eis insistendum, fuisse enim veram coniecturam, si autem nihil proficitur, dimittenda esse illa auxilia, & ad alia transiendum.

*De capitis situ somni tempore in iis, qui distillatione laborant.
 Auicennae locus expensus. Mercurialis notatus. Ari-
 stotelis opinio in problematis refutata.*

CAPVT VIII.



V V M de curatione catarrhi, seu distillationis ageret Auicenna libro tertio fen. quinta, tract. primo, capite vltimo inter ea quae de somno præcepit, illud in primis fuit, ut qui catarrhis sunt obnoxij capite dormiant minimè eleuato, sed potius demisso, declinque puluinari. Hæc Auicenna, aut ipsius potius interpretes ita protulerunt. *Es oportet secundum omnem dispositionem, ut assuet demissionem capitis, & teneat declinè puluinar, vel capitale.* Ita sanè prius contrario omnino sensu legebantur per hunc modum: *& oportet secundum omnem dispositionem, ut regatur cum eleuatione capitis, & eleuetur puluinar.* Sed Bellunenſis, qui pleraque huiusce auctoris loca optimè emendauit, hunc etiam ita restituit sicuti proposuimus. Matthæus Gradius in commentario ad nonum librum Rhafis ad Almanforem, capite de catarrho, hunc locum recitans, videtur non ex toro habuisse corruptum, nec omnino integrum, ita enim legit: *Es oportet secundum omnem dispositionem, ut regatur cum inclinatione capitis, & eleuetur puluinar.* Præstat autem totam Gradij orationis seriem subtexere, quæ ita habet: *Est etiam alia cautela habenda circa somnum in catarrho, ut scilicet puluinar sit notabiliter eleuatum; sed nota hoc, ne fiat error & deceptio (in quam etiam incidunt scribentes) quòd licet puluinar, & caput debeat esse eleuatum, non tamen sinari debet cum capite rectè eleuato, quia talis situs eleuationis capitis preparat ad catarrhum, & effluuè, & ad ascensum, quia habilius ascendunt vapores, & habilius descendunt materia per colatorium in pelles, & neruos. Ideo hunc errorem Auicenna remouet dicens: & oportet secundum omnem dispositionem, ut regatur cum inclinatione capitis, id est, inclinetur, & eleuetur puluinar, & non resupinatio fiat in somno, quasi innuat, quòd caput non sit ereclum, sed aliquatenus inclinatum propter causas dictas.* Hæc Gradius. Videtur autem ita etiam legisse Gentilis, nec dissimilem ea de re habuisse opinionem. Iacobus quoque de partibus manifestè sicuti Gradius legit; sed quod dicitur ab Auicenna *cum inclinatione capitis*, exponit caput ad anteriores partes vergere debere, ut materia diuertatur ad nates, puluinar autem in somno eleuari debere, sic ut ager capite, & spatulis satis eleuatis ad puluinar dormiat. Hieronymus Accorombonus, Eugubius in libello de catarrho, iam ante annos ferme octuaginta edito, probat & ipse lectionem, quam deinde restituit Bellunenſis, & antiquam illam à iuuenture se habuisse semper suspen-

Etiam dicit, demissumque caput, & humile cervical in distillatione laborantibus approbavit; ac ignoscendum antiquioribus dixit, qui propter textus depravationem, pleraque absurdè circa eam rem proposuerant. Cùm sit autem illustrissimus hic Auicennæ locus, & minime obscura illis, qui medicorum commentarios cum studio legunt, quæ de figura illa humili, & inclinata Gradius, & Gentilis, & Accorombonus ediderunt, miratus sum Hieronymum Mercurialem, libro secundo variarum lectionum capite decimoquinto, eam de inclinato illo accubitu opinionem, tanquam novam, & à se inuentam proposuisse: scribit enim sic: *Item verò me somnus admonet, ut communem omnium ferè errorem detegam, qui si altiore capite dormiant, à distillationibus minus tentatum iri sperant. Quem autem dicis, ô Mercurialis, communem errorem? an medicorum, an laborantium? si medicorum; falsa enim verò dicere te, ex illustrissimo Auicennæ loco, & aliis quos citaui textibus, videre licet; si laborantium qui medicinam ignorant, indigna enim verò docti medici aduersus idiotas obiectio est. Non igitur commune hoc medicorum erratum est, sed nonnullorum tantummodo fuit opinio, qui rudi illa ætate corrupto Auicennæ codice vsi, sensum illum videre non potuerunt; nec tamen difficultate caret ista de inclinato accubitu opinio. Quippe habemus apud Orisium libro sexto Collectaneorum capite primo ex Anryllo hæc verba: *Figura autem decubitus eorum quibus caput laborat, in sublimi versat, præterquam in phreneticis, quoniam in eis humilem, atque inclinatum decubitus volumus, quia decubitus in sublimi elatus, quoddammodo eos periturbat.* Si igitur illis qui distillatione vexantur, laborat caput, quidni erecti dormiant? laborare autem perspicuum est, quippe ibi colligitur, & concretescit distillationis materia ob vitium loci inbecillitatem, quæ primo alioquin capite, aut rota, aut magna ex parte concoqueretur, & in alimentum cederet, aut discuteretur; sed consideremus rationes. At Gradius præparare ad catarrhum, & effectiue, & ad descensum, ut ipse loquitur, quia habilius ascendunt vapores, & habilius descendunt materię per colatorium in pectus, & retnos. Expendamus utrumque, de ascensu tantum; rem proponit Aristoteles decimo Problematum, cuius loci auctoritate eam sententiam confirmat Mercurialis. At si difficilius ascendunt vapores demisso capite, quàm erecto, cur non eundem accubitu in ophthalmia, & dolore à bile, & alijs morbis, qui ex inferioribus elato humore, aut vapore constant, approbamus? Consideremus autem Aristotelis rationem, nullam enim alij asserunt. Scribit igitur ille decimo Problematum, ideo brutis animantibus non fieri distillationes, sicuti hominibus, quoniam brutis calor, & humores, qui calorem sequuntur, in atmos se efferunt, vnde per refractionem discuti, ac discissi, partim quidem cervicem, & caput, partim autem spinam, & lumbos, nimirum non vnam tantum partem, sed duas, anteriorem, & posteriorem petunt, cùm hæc omnia sint in eadem recta.*

linea,

linca, non ita in homine, in quo cùm sit recta figuræ, calor non disiectus, nec disperitæ, nec partim ad anteriora, & ad caput, partim ad posteriora, & ad spinam, atque lumbos fertur, sed totus, ac vniuersus ad caput, quem similiter sequentes humores, distillationem efficiunt. Multo plus igitur humoris in homine quàm in brutis ferri ad caput, ea ratione contendit Aristoteles, quam rem similiter de somno, si capite erecto, aut demisso capiat, dicendam scribebat Mercurialis. Eam enim uero Aristotelis rationem sicuti assecutus sum, memini me explicuisse in commentariis ad illum librum superioribus annis editis, cuius tamen vim, & efficaciam ad id notandum, quod sumpsit, non plenè assequi me fateor. Valeret forsàn, si calori, & humoribus, seu vaporibus, ad caput via non pateret per venas, & arterias, sed cùm per vasa ascendant, ut hæc procedunt, ita calor, & humores; nec ea re discrimen vllum homini & bruto est: ita enim vasa procedunt in brutis, ac in homine, & æquè arrosos petunt in homine, ac in brutis: Vtrisque enim ab hepate, ut sentiunt medici, aut corde, ut sensit Aristoteles, porrecta, eodè tramite ad caput ducuntur; vnde qui per ipsa fertur calor, & humores, absque vlla offensione caput petunt, nec aliquò impingunt, vnde per refractionem dissecti discindantur, & partim huc, partim illuc progrediantur: recta enim est, & eodè modo se habet in vtrisque via, & æquè per lineam rectam à corde, seu hepate ad caput in homine sit transitus, ac in brutis. Quinimò si humores attendimus, qui sequuntur calorem, cùm illi suapte natura graues sint, difficilius erecta figura, quàm demissa caput petunt; ad illa enim quæ sunt sublimia, difficilius perueniunt graui, quàm ad ea quæ humilia, vnde & Orbasius ad finem eiusdem primi capitis dicebat, decubitus à pedibus altiore, replere caput, & instrumenta sensu uiui. De ascensu ita sentiendum. Quòd autem pertinet ad descensum, vera est Auicennæ, & medicorum opinio: quamquam in ascensu omne fere momentum; quippe ex inferioribus fere origo; si tamen in capite iam sit materia; aut ibi genita, aut aliunde illata, erecta decubitus figura, facilius descendit materia, quæ grauis est, sicuti humor parieti hærens promptius labitur, quàm in solo effusus, quod plenum est. Hoc autem casu, vel consideratur caput ex quo distillatio est, vel partes inferiores ad quas, si caput, quoniam depletur onere, & noxia materia, non erit inutilis eiusmodi figura: ob eandem rationem, ut puto, Orbasius capite laborantibus saluatorem esse scripsit figuram decubitus, quæ in sublime vergat; & Conciliator differentia cxxij, capite eleuato dormiendum esse, ut quæ superflua sunt ad viliores partes decumbant: si autem attendatur partes inferiores, illis incommoda est sublimis dormiendi figura, quæ per hunc modum recipiunt, & implentur. Eo igitur casu considerandū vtrum magis urgeat, & iuxta illud, vel hanc, vel illam decubitus figuram eligere: si ad id difficultas respirandi, quod sæpe in distillatione cōtingit, caput uel lecto sublime habendum est, quod præcepit Celsus lib. 4. cap. 4.

Cucurbitulas cum scarificatione, etiam incipiente morbo ritè adhiberi aliquando. Auicenna locus expensus, & Galeno conciliatus.

Costæus notatus. Alter itidem, seu Galeni, seu Apollonij locus de cucurbitulis declaratus, de scarificatione plura.

CAPVT IX.



QUÆREBAM utrùm in angina, aut alia inflammatione, corpore existente pleno, si aliquid venam secare prohibeat, statim inter initia liceat scarificatis cucurbitulis uti. Id subibat ex illis quæ ex Galeno descripta leguntur apud Oribasium libro 7. Collectaneorum ad Iulianum, capite decimo quinto. *Cucurbitula emacuat prius corporibus visles, sed in repleto, hu non videntur.* Eadem autem ratione in inflammatione cerebri, & membranarum, aut alicuius alius partis, eisdem non videntur initia morborum, sed quum non amplius aliquid infuit, & prænacuato vniuerso corpore, opus est vel mouere, vel amittere, vel ad exteriora reuellere, quod continetur circa particulam laborantem. Igitur pleno corpore, quod per initia in inflammationem esse consuevit, non esse adhibendas cucurbitulas appareat. At concedere eas videtur Auicenna libro tertio, sen. nona, tractatu primo, cap. 10. vbi de anginæ curatione scribens, proponit initio morbi phlebotomiam, & purgationem & reuellentia auxilia, saltem cum ventosis (vt ipse loquitur, aut eius potius interpretes) positis super loca longinqua opposita. Nodum soluere nititur Costæus scribens in adnotationibus, consuli ab Auicenna cucurbitas vbi vires nõ constant, nec venæ sectio conuenit, hanc enim antea vsurpandâ, si liceat: tum ad cucurbitas deueniendum; at si non liceat venæ sectionem vsurpare, cucurbitis nihilominus vtendum, quod & faciat Galenus xiiij. methodi cap. 5. vbi vlceri coniuncta inflammatione, ob dolorem. vel venam tundit, si vires constant, vel membra scarificat, quæ læsa non sunt, si vires sint imbecilles. Inanem operam fumit Costæus, nec seu Galeni, seu Oribasij de cucurbitulis locum intelligit. Non enim Galeno aduersatur Auicenna: cum enim cucurbitas non esse admouendas corpore pleno scribit Galenus, seu ex eo Oribasius, quod etiam ex Antyllo scribit; de iis intelligit cucurbitulis, quæ euacuationis causâ admouetur ipsi parti affectæ, vt ex verbis facillè colligitur: scribitur enim, tum esse cucurbitas admouendas cum vsus postulauerit, vt aliquid eorum quæ in parte phlegmone laborante continetur, moueamus, eruamusque, & ad exteriora extrahamus; At Auicenna apponit reuulsionis causâ partibus longinquis & oppositis, quod non licet, etiam non euacuato

Quato antea corpore; ipsimet verò parti affectæ seu inflammatæ non li-
cet: ex dolore enim scarificationis citaretur fluxio, & plus esset quod at-
traheretur, quàm quod euacuaretur, incretsetetque morbus, quod di-
fertè scripsit Galenus xij. methodi cap. 19. ex quo fortasse loco illa Ori-
basij desumpta sunt, ita autem habent Latine: *Perim videntur cucurbita*
in ipsa parte, qua phlegmone afficitur inter initia non est, sed posteaquam totum
corpus euacuauerit, & opus sit eorum, quæ in inflammata parte continentur, ali-
quid moueri, & erui, aut ad exteriora retrahi. Et eodem capite paulò
pòst: *Et cucurbita in occipite defixa efficax est remedium ad oculorum fluxiones;*
sed oportet antea euacuatum esse totum corpus, phlebotomia enim ipsò existente, in
quacunque parte capitis cucurbitam defixeris, totum ipsum implebit. Abundè
etiam libro artis medicinalis capite quinto, & nonagesimo, eundem
locum tractat. Ibi enim docens morbos ex inflammatione, seu repletionē
partis alicuius, esse curandos merito euacuationis eiusdem partis, id tamē
fieri nō posse probat, nec per retrocessionem humoris, nec per euacuati-
onem partis. siue fiat euacuatio per resolutentia, siue per scarificantia, aut
adurentia, nisi totius corporis præcedat euacuatio: ex calore enim si resol-
uentibus viniatur: atque ex dolore si scarificatione, plus est quod attrahi-
tur. Puro insuper a uicennam, cum iurio anginae cucurbitas proponit, in-
tellexisse anginam leuē, in qua nō existimat omnino necessariam phle-
botomiā, & ideo dicit utrumque phlebotomia, & purgatione, & aliis reuel-
lentibus, saltem cum ventosis; quippe existimat has posse aliquando solas
sufficere, sicuti cum est leuis affectio. De leui autem affectione eum agere
apparere ex illis quæ paulò pòst subdit, ubi affectionem nominans, de qua
scribebat, & quam curabat, non simpliciter dicit anginam, aut synan-
tiam, ut eius interpretes loquuntur, sed vnam aut synantiam, ita scribens.
Cum incipit passio vna aut synantia. Est autem vna angina quædam leuis,
seu potius anginosus affectus, factus à pituitosa distillatione, non pro-
prie angina. At in vera, propria, & grauiori angina nunquam omitti
debet phlebotomia ab initio, nec sufficiunt cucurbitulae. Et idem Aui-
cenna capite subsequenti xj. cum de angina loqueretur, quæ fit ab hu-
more calido, & grauis angina esse solet, ita scribit: *In calida quidem opor-*
ret, ut incipiatur cum phlebotomia. quibus verbis necessitatem auxilij ostendit,
cucurbitas autem tanquam minùs efficaces haud nominat. At si
vires non ferant venæ sectionem dicat quispiam, quid molendum? Pu-
to esse desperatam salutem: ubi enim acutissimus est morbus, nec æqua-
libus auxilium vni licet, nulla relinquitur spes; quare non est, ut dicamus,
ubi vires non constant illis esse utendum, si quidem morbus utget acu-
tissimus, & æqualem statim medicinam exposcit: leuioribus enim uti
licet, cum morbus dat inducias, & natura ipsa paulatim suppetias ferre
potest. Quid autem? an omittendus cucurbitularum vsus viribus im-
becillibus, in pueris, senibus, & grauidis acuto morbo laborantibus,
quibus non licet venam tundere? Non id dico, sed cum æquale non sit
auxilium,

auxilium, non esse suum morbi, nec illi sciendum, nec tamen omittendum. Pueri autem ac senes acutissimis morbis corripri non solent, vt iuuenes, vnde sufficient cucurbitulæ; quod si corripiantur, lethales esse solent, quod de grauidis expressit Hippocrates. Conueniunt igitur cucurbitulæ initio morbi in angina leuiori, sicuti etiam in aliarum partium leuioribus inflammationibus, non sanè inflammatis partibus appositæ, quod nunquam fieri debet inchoante morbo, sed longinquis, & oppositis ad reuellendum à parte affecta, & simul euacuandum totum corpus, quæ euacuatio ex cucurbitulis sufficiat, quum partes principes, in leui affectione, aut nulla, aut exigua copia onerata, magnopere laborent. Nam ad euacuandum totum in acutissimis morbis, vt in grauissima angina, pleuritide, phrenitide, & similibus, ad internam brachij confugiendum est, quod facere Autorem libri quarti de ratione victus in acutis, scribit Galenus eo commentario particula xxiv. quia, & velocissimè, & plurimum euacuat totum corpus ex iis partibus, quæ principes sunt. At si earum partium plenitudo non vergeat, nec morbus sit adeo præceps, sufficere cucurbitulas colligi licet ex loco, qui ex xiiij. methodi medendi capite §. adductus est. Quippe scarificationis beneficio euacuatur etiam totum corpus, atque reuellitur à parte affecta, cum oppositis locis adhibetur. Ita verò totum corpus euacuari, expressè dixit aliquando Galenus, sicuti libro 13. methodi cap. §. per hæc verba Latine: *At si vel plethoricum corpus sit, vel cacochimum, curatio per ea quæ sic calent, fluxionem ad membra citat. At qui nec alia vlla vi datur: cogimur ergo alias sanguinem mittere, idque aut vena incisa, aut membris iis, quæ læsa non sunt scarificatis.* Atque etiam secundo Aphorismorum xvij. per hæc: *Euacuatio omnium humorum equaliter, quæ quidem exquisitissima est, fit per venæ sectionem: proxima autem huic est quæ per malleorum scarificationem, vbi nos facere consuevimus, & quæ per exercitia, vel frictions, vel balnea, & præter ea ex accidenti per inediam.* Exprimitur etiam quarto de tuenda valetudine, vbi malleolos scapello incidere tantundem valere scribit, ac venam incidere. Non exprimitur aliquando, verum submissione sanguinis comprehenditur, vt obseruare licet libro xiiij. methodi cap. 6. vbi plethoram euacuantes materias proponens, scribit esse sanguinis missionem, frequentia balnea, exercitationes, frictions, digerentia medicamenta, & præter hæc omnia inediam. Eadem verò res manifestissimè etiam proponitur ab Oribasio ex Apollonio libro septimo Collectaneorum ad Iulianum cap. 19. vbi comparans crurum scarificationem venæ sectioni, modò hanc, modò illam eligendam dicit per hæc verba: *Ego in maximis periculosisque affectionibus (venæ sectionem) non omitto, in quibus abundè, assatimq; sanguinem effundere oportet, nam in vehementibus affectionibus, euacuationes assatim faciendæ sunt: plethoram vero mediocrem, quæ aliquid mali sit futura, & iam conuersionem in morbum statum attingat, tibia scarificationibus vexata, quæq; sine molestia, & quæ tam voluerimus sanguinis extrusionem*

et transfusionem reddiderat, cura valedam tibi corpus re molis commotionem, &c.
 Si igitur scarificatione totum corpus mediocri plethora euacuatur, & fluentes humores reuoluntur, eius occasio aliquando esse potest initio morbi, sicuti aliàs venæ sectio est necessaria. Verum aliquis existimet labi me, & scarificationem cum scarificatis cucurbitulis confundere quæ aliud & aliud sint; quæ igitur ex Galeno, & Oribasio allata sunt de scarificatione, cum vera sint, non posse tamen ad scarificatas cucurbitulas transferri, neque si scarificatione initio morbi liceat uti, scarificatis liceat uti cucurbitulis. Ita autem sensisse recentiores quosdam video, qui cum magnopere laborent ad ostendendum, scarificationem antiquorum; & scarificatas cucurbitulas non fuisse vnum & idem apud antiquos, quod vel vitro concedo, non tamen bene colligunt, licere uti initio morbi scarificatione, non licere cucurbitulis scarificatis, si enim licet illa, licet etiam his. Ac si scarificatione plethora mediocri soluitur, soluitur etiam cucurbitulis scarificatis. Verum sanè illud esse existimo quod scribunt, scarificatione vsos antiquos absque cucurbitularum appositione, distinxisseque alterum ab altero, quod apparere ex Galeno video quinto in sextum Epidemiorum textu primo, vbi seruit illa duo, & seorsim proponit. Enumerat enim medicorum ministros, herbarios, vnguentarios, coquos, cataplasmata adhibentes, humorem conspergentes, eliserem suffundentes, scarificantes, venam secantes, & cucurbitulas affigentes. Et verò apponebant antiqui cucurbitulas absque scarificatione, & scarificabant cum cucurbitulis, erantque varia variis occasionibus vsurpata remedia: cucurbitulis enim utebantur, cum vi attrahere illis consilium erat, est enim efficax admodum ad trahendum auxilium cucurbitula, ut habetur apud Galenum libro xij. methodi: scarificatione autem utebantur, vel ad reuellendum ab aliqua parte, quo tempore apponere cucurbitulas solebant, & utile admodum est, vel ad euacuandam oppletam partem ex ipso affecto loco, qua occasione affectas partes scarificabant, vel ad euacuandum totum, quum plethora erat mediocri, & venæ sectionem non putabant necessariam; quinimo damnosam, tunc enim scarificationem sustinebant, hæc autem erat absque cucurbitulis, & semper in tibus, quippe locis ignobilibus, ex quibus euacuatus sanguis minimum viribus officeret, ut ex Oribasio habemus, Apollonij doctrinam recitante septimo libro Collectaneorum ad Iulianum capit. xi. x. æque utebantur potissimum præseruationis gratia, & ad præcauendum à morbis: quum enim eodem anno venam sæpius incidere accommodarum non videretur, quum multus spiritus animalis vnà cum multo sanguine effunderetur, ideo, non adeò vigente te, fuit scarificatio illa instituta, ut ex eodem Oribasij loco constat. Non tamen ea re vlllo pacto differebant scarificatio, & cucurbitulæ scarificate, quodd scarificare corpore non purgato licuisset, aut liceat, cucurbitulis uti non licuisset, aut non liceat, hoc enim falsum est præceptum, nec id, aut Galenus, aut alij ex anti-

quis dixerint: licet recentiores illi quos significavi, Galeni, seu Oribasij verbis supinè acceptis, id affirmarint. Cum enim scribit Oribasius, seu Galenus, cucurbitulas purgatis prius corporibus esse adhibendas, intelligit quum illæ adhibentur particulis inflammatis, aut aliter oppletis, ad eum finem, vt particulas exhauriamus, & quod ibi præter naturam inculcatum est, inde eruamus, quæ res, vel ex ipsiis, seu Galeni, seu Oribasij verbis patet libro septimo ad Iulianum cap. quinto decimo, quo loco scribit vtendum esse cucurbitula, quum opus est vel mouere, vel amoliri quod continetur in parte inflammata. Id autem & superius aduersum Costæum proposui: eo autem tempore, nec scarificatione absque cucurbitulis vti liceat, quod habemus apud Galenum libro artis medicinalis capite lxxxv. quem locum etiam antea adduxi; & manifestissimis verbis apud Aëtium ex Galeno libro tertio capite primo, & vigesimo. ibi de scarificatione agens, eiusque vsus proponens, ad finem capitis ita scribit: *sanguinis inculcationes quæ factæ sunt, post vniuersalem resolutionem eo non est euacuationem solvere per localem scarificationem.* Est autem, tum cucurbitulæ, tum scarificationis eadem ratio, quippe vtræque efficiunt dolorem, ex dolore autem citatur fluxio ad partem, cuius euacuationem querimus. At cum præseruationis gratia sanas tibias scarificamus, licet dolor creetur, nihil periculi est, cum in parte nihil mali sit; scarificatis autem partibus affectis propositum imminet periculum. Quinimo, nec venam secare in affecto loco liceat, etsi exiguis inde, aut nullus secuturus sit dolor, nisi antea totum corpus fuerit euacuatum, quia ad affectam partem sanguis eo modo trahitur, qui inde reuellendus est. Id autem habemus apud eundem Aëtium libro tertio capite xx. ita scribentem: *Illud, porro nosse expedit, quod non solum loculi venæ sectione detrimentum est, nequam vniuersum corpus euacuetur per afflata pariet sanguinem detrahens, sed etiam cucurbitula.* Magis tamen periculosam ibidem dicit esse cucurbitam, quam venæ sectionem, quippe pro ratione materię quæ affertur ex venæ sectione, etiam sanguinis excretio fit cum cucurbita, tum impetu affixionis violenter materiam attrahens, tum multum locum occupans, & tamen neque vasis sensibilem fissuram faciens, attrahat quidem memorabilem materiam, non euacuet autem pro ratione attractæ. Si igitur nec locali venæ sectione vti licet, hoc est, non licet in parte affecta secare venam, multò minùs liceat vti scarificationibus. Quod autem dicunt recentiores iidem, scarificatione insignem extrahi sanguinis copiam, cucurbitulis scarificatis exiguam, ideo scarificationem substitui venæ sectioni, non autem cucurbitulas scarificatas, non est ad rem, & falsum est. Comparant enim scarificationem in tibiis, qua utebantur antiqui cucurbitulis scarificatis in dorso, quibus nos passim vtimur. At qui scarificationem dicit, non eam in tibiis dicit, nam scarificabant antiqui etiam alias partes, quod patet ex Oribasio libro septimo Collectaneorum ad Iulianum capite xviij. in quo docet

docet cruribus, & abdomini adhibendas incisiones per rectitudinem, eodémque modo in thorace, dorso, & ceruice: at in capite pro situ capillorum, in fronte obliquas. Necesse igitur erat comparate scarificationem dorsi cucurbitulis scarificatis in eadem parte, sicuti scarificationem tibiæ cucurbitulis in eadem parte scarificatis. Quæ ab antiquis substituitur scarificatio venæ sectioni, est quam in tibiis moliebantur. Hæc autem etiam adhibitis cucurbitulis possit substitui, si modò illæ adsint conditiones; quas pro scarificatione tibiæ ipsi obseruabant: Cruribus enim potissimum fiebant incisiones, & scarificationes ad plenitudinem mediocrem soluendam, & præcauendum à morbis, in illis præsertim qui tenuem sanguinem acerare solent, ut in mulieribus albidis, ut habet Galenus libro de curandi ratione per sanguinis missionem, capite xj. Per scarificationem enim tenuior sanguis faciliè profluit, non ita crassus, atque ea ratione commodè præcauebant à morbis. Quippe locus ille, ut proposui antea ex Oribasio, qui Apollonij verba recitat, ignobilis cum sit, ad eam rem maximè erat aptus, quod & video referri ab Aërio ex Galeno libro tertio capite xxj. Id verò citra totius corporis euacuationem licebat, nullo ibidem existente morbo: sed & liceat quoque ad eandem rem scarificare dorsum eisdem conditionibus; quamquam verè crura tanquam ignobilia, sint magis ei rei accommodata. Easdem autem partes, aut alias, ubi sint affectæ, & morbo vexatæ, initio morbi, & totius corporis nõ præcedente euacuatione, scarificare non liceat. Est etiam falsum cucurbitularum vsu, quæ dorso affigantur, & incidantur, minorè extrahi sanguinis copiam, quàm scarificatis cruribus, cum in dorso venæ sint amplæ, si modò paulò altius affixis cucurbitis velimus infligere plagas. Et experientia ipsa docet, ex dorso magnam euacuari sanguinis copiam; quippe in patria mea Genua quotannis per sacros suppliciorum Christi Domini dies, ferrteis aculeis sparto appensis multis dorsum verberantibus, ea sit sanguinis effusio nonnullis, ex qua incidunt in animi deliquium, manifestòque apparet, quibus non accidit animi deliquium, libras tamen plusquam duas sanguinis, quas per scarificationem tibiæ sibi detraxisse scribit Oribasius, ex dorso effundi. Igitur quamquam idem non essent omnino scarificatio, & cucurbitulæ scarificatæ, quoniam tamen illis conueniat, quod à me superius est positum, si scarificatione uti licet initio morbi, quod licet aliquando, scarificatis etiam licet uti cucurbitulis, siue tibiis, siue dorso apposis.

*Disidentes, & variae antiquorum, ac principum in medicina viro-
rum de mittendo, aut non mittendo sanguine opiniones, de mo-
do, aut mensura eius, deque aetate, quibus mittatur, &
morbi tempore, ac alia ea de re. Galeni loca
aliquot de cotyla. Fuchsius
reprehensus.*

CAPVT X.



MIRARI subit aliquando in medicina auctorum discrepan-
tes non modò, sed omnino etiam contrarias sententias nec
de his solum loquor, quæ ad contemplationem magis per-
tinent, & philosophica potius sunt, verum de ipsis medicinæ
intrinsecis, & auxiliis, quæ suos cum producerent effectus insignes,
& conspicuos, opinionibus veritatem re ipsa declarare possunt videbatur.
Hanc rem in vno ex præcipuis medicinæ auxiliis, quæ est venæ sectio,
in præsentia considero: de ea enim maximè repugnantes, atque adeo op-
positas sententias clarorum virorum animaduertere licet, siue ipsum
simpliciter auxilium, venæque sectionem consideremus, siue hominis
conditiones, ex quo sanguis emittitur. In primis, venæ sectionem an-
tiquissimum fuisse auxilium satis constat, ut pene cum ipsa medici-
na exortum esse videatur. Podalirius enim Æsculapij filius Syriam De-
metrii Carie regis filiam, quæ excelsio quodam recti decidens lustrigio,
concussio corpore periculose se habebat, incisa ex viroque brachio venâ,
sanguineque inde emisso sanauit, quod præsidium vidisse a patre eo in
casu usurparum, ab eoque didicisse credibile est. Tum ex eodem Æscu-
lapij prolapsa vetustissimus auctor Hippocrates, in omni generis mor-
bis mittendum sanguinem scripsit, modò iuuat sit, quod illud auxilij
genus timorent, quam Hippocratis doctrinam secuti sunt, & Diocles
Carystius, qui ob artis excellentiam iunior Hippocrates fuit cognomi-
natus, & Praxagoras eadem qua Hippocrates Co patria natus, & Philati-
nus, & Herophilus, & alij veteres. Circiter tamen eadem tempora na-
tus Chrysippus Cnidæ celeberrimus & philosophus, & medicus, illud
auxilium minus abiecit, nec eo vii vnquam voluit, cuius vestigijs
adherens Erasistratus Iulæ eius discipulus, & Aristotelis ex filia nepos,
nullo in morbo vnam esse secundam existimauit, à quo deinde orti Era-
sistratus, per multa sæcula Romæ medicum facientes, ea in totum ab-
stulerunt: inter quos fuit Ssrato summa necessitudine Erasistrato iun-
ctus, & Aristogenes, & Medius. Pòst autem multis sæculis exactis, cum
Romani aduenisset Galenus, & prægas Erasistratorum curationes ad-
uertere:

perteret, quibus multi de medio tolluntur, ut puella Chienfis, & Crito, & alij quos Galenus memorat, cepit eorum infirmitiam redarguere, & Chryssippi, ac Erasistrati dogma refellere, unde factum est ut Erasistrati sententiam inutarent, & sanguinem mitterent; id verò ex Erasistrati decretis facere assueverant, venæ namque sectionem ab Erasistrato non fuisse omittam, licet vetustiores Erasistrati ita affirmarent: sed refellit hoc Galenus, multique verbis probat, ab Erasistrato nunquam venæ sectionis factam esse mentionem, neque ab illo tale auxilij genus unquam usurpatum. Hæc de re simpliciter. De corporibus à quibus tollendus est sanguis, non minor varietas, & pugna: eam vi communi comprehendit Cornelius Cellus libri secundi capite nono per hæc verba: *Sanguinem in ipsa vena missi novum non est: sed nullum pene morbum esse, in quo non mittatur, novum est. Item missi iuvenibus, & feminis vitium non gerentibus, vetus est: in pueris vero idem experiri, & in senilibus, & in gravidis quoque mulieribus vetus non est: si quidem antiqui primam ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilij genus indicabant, persusæ autemque sibi mulierem gravidam, que ita curasset, abortum esse factum. Nos autem quadam capita exactius pertractemus. Pueris mitti sanguinem vetus non esse testatur Cornelius, quod est dicere, veteres medicos pueris non misisse, recentiores misisse, & vera proponit Celsus. Hippocrates cum quiveterum princeps, libro quarto de ratione victus, in morbis acutis, textu decimo nono, nisi floreat, ac vigeat ætas, à sanguinis inmissione abstinere, cuius sententia adhuc fuisse, qui sublecuti sunt, Dioecles, Praxagoras, Philorinum, Herophilum, & alios credibile est. Chryssippus enim & Erasistratus, nulla ætate nulloque morbo, ut vidimus, venam secabant. At recentiores, Celsique ætati proximiores, qui successerunt, istud auxilium in pueris usurpare, etiam ex eorum monumentis, quæ nulla extant, haud cognoscere liceat, affirmanti Celso facile credimus. At post Celsi ætatem, qui sunt clarissimus Galenus, nullo pacto pueris ante annum decimumquartum mitti sanguinem voluit, quod scriptum reliquit libro undecimo methodi medendi, capite quarto decimo, & libro de curandi ratione per sanguinis inmissionem, capite tertio decimo, & libro etiam, licet annorum numerum non ubique definiat, a qua sententia non recesserunt postatores Græci, ut Oribasius, qui libro septimo Collectionum ad Iulianum capite quarto, & in synopsis ad Eustachium filium, pueris usque ad annum quartum decimum non esse secandam venam proposuit, eandem afferens quæ Galenus, quod facile per halitum pueri digeratur. Longo tamen post tempore, ex Arabibus illustis medicus Avenhoar, ante annum quartum decimum ad eum mitti sanguinem posse censuit, ut filio suo tertium annum agenti venam secaverit, cuius auxilij beneficium à morte evasit puer, sicuti idem Avenhoar scribit libro Theisr, & Avenroës libro 7. qui inscribitur Colliget, c. 3. Ex eadem tamen Arabum familia Princeps Avicenna libro primo Canonis, sen quarta, doctrina quinta, capite*

vitino, de phlebotomia interipto, Galenicæ sententiæ adherens, canendum esse scribit à missione sanguinis in ætate quæ est minor quam decimanis, licet exiguam detractionem in adolescentibus concedat, quod & facit Galenus in libro de curandi ratione per sanguinis missionem, ex quo loco omnia hæc ab Auicenna desumpta fuere. Nostri etiam temporibus haud rarò pueris sex aut septem annos natis, felici successu in brachio vena tusa, sanguinem ad quinque, aut sex uncias pro morbi, ac temperamenti ratione fuisse missum scimus, & nos feliciter misimus non senel. Eadem fermè quæ de pueris, de gravidis etiam mulieribus sententiarum varietas considerari potest. Nam cum ea quæ ex Celso proposuimus, veteres abstinuisse in gravidis à venæ sectione ostendunt, quod confirmatur Hippocratis testimonio Aphorismorum libro quinto, aphorismo trigésimo primo scribentis, mulierem vterum gerentem sanguine è vena misso abortire, recentiores tamen, & Celsi temporibus proximiores medicos, gravidis sanguinem detraxisse eadem ostendunt; quod & passim nostris temporibus facimus absque vllò abortionis periculo, nisi vi morbi intereat fœtus, à quo magis illi innanger periculum, quam à sanguinis moderata missione. Est verò etiam, cum citra morbum vllum gravidis mittere sanguinem aliquando necessitas postulat, gestationis ipsius causa, quippe nisi mittatur abortiunt, copia sanguinis fœtum suffocante, qua copia exinanita, retinetur fœtus, & maturè emittitur. Quod ad quantitatem etiam sanguinis pertinet, obseruanda est nostrorum, & antiquorum temporum varietas. Hippocrates enim libro secundo de ratione victus in morbis acutis, textu decimo; in pleuritide sanguinem mittit vsque ad coloris mutationem, quippe est id argumentum ex inflammata particula eum fuisse eductum, distat enim hic colore ab eo, qui in aliis corporis partibus continetur: si enim aliunde pituitosus, ex inflammatione rubicundior, si autem ex alius partibus rubicundior, ex inflammata ob adustionem liuidus, & nigrescens prodibit. Similiter quarto eorundem librorum de ratione victus in morbis acutis, textu septuagesimo nono, siue Hippocrates, siue quisquis auctor ille est, in pleuritide sanguinem mittit vsque ad animi deliquium: at nostris temporibus in pleuritide quis vnquam coloris expectat mutationem, aut expectare audet? aut in eadem quis vnquam ad animi vsque deliquium, euacuationis ratione adueniens, sanguinem mittit? At hoc idem animi deliquium in sanguinis missione, nonnullos medicos pro termino posuisse non in pleuritide solùm, sed communiter in detractione sanguinis habemus apud Galenum in libro de venæ sectione aduersus Erasistratæos capite quarto, sicuti alios coloris mutationem, & alios alio modo. Galenus autem licet eam sententiam non approbet, vt apparet libro de curandi ratione per sanguinis missionem capite vndecimo, posse tamen vsque ad animi deliquium mitti quibusdam in casibus, docet Aphorismo tertio, & vicésimo libri primi Aphorismorum

ristimorum, & exemplis propositis ad eum terminum fuisse à Galeno missum, apparet libro nono methodi medendi, capite quarto, dum adolescentium duorum synocha febre laborantium historiam recenseret, quod & scribit eodem libro de curandi ratione per sanguinis missionem, capite duodecimo. Ibidem sanguinis mensuram, quam aliquando vena secta fluere permiserit, definitè exprimens, magis adhuc quod proponimus confirmat. Scribit enim se aliquando detraxisse cotylas sex: sunt autem sex cotylæ, vnciæ mensurales quinquaginta, & quatuor; quippe cotyla, Attica scilicet, quam intelligere puto Galenum (alia autè quæ & Italica adhuc maior) continet vncias mensurales nouem, quod habemus apud Galenum libro primo de compositione medicamentorum secundum genera per hæc verba; *Ex multis medicamentis olim conscriptis priusquam res Romana in tantam potentiam uenirent, conieci, quam illi nominans cotylam, parem esse uncis nouem libra Romanis nunc consueta.* Libro etiam sexto eiusdem operis, non solum cotylam continere vncias nouem mensurales dicit, sed cotylas sex vncias quatuor & quinquaginta, per hæc verba: *Consentaneum igitur est Andromachum nouem vnciarum mensuralium oleum riciuinum censere esse iniciendum, ut sex cotyla fiant vncia mensurales quatuor, & quinquaginta, quod idem est cum libra mensuralibus Romana quatuor, & dimidia.* Porro autem vnciæ mensurales ita dicebantur; quia per cornua lineis intersecta mensurabantur, & discernebantur, ut scribit Galenus libro 6. eiusdem operis. Non erant autem eadem cum ponderalibus. Hæ enim appendebantur; mensuralesque in omni materia eadem: ponderales non item: sed variz pro rei cotyla admensæ grauitate, aut leuitate, unde olei cotyla, sicuti ex Galeni experimento apparet, pendebat vncias septem cum dimidia, sexto enim libro de compositione medicamentorum per genera, hæc habet: *Ego sanè olim libram Rome nuncupatam, quam per intersecta cornua metuntur, appendi aliquando, cupiens scire quantum ponderis haberet, inueni verò duodecim vncias mensurales decem ponderalibus aequales.* Si igitur duodecim mensurales olei vnciæ sunt decem ponderales, sex quibuslibet vnciis mensuralibus olei una dempta, ponderales erunt, atque ita cotyla olei, quæ admetiendo vncias septem cum dimidia: alia autem ratio in vino, alia in melle, & alia in sanguine erit. Errat igitur Fuchsius, qui simpliciter cotylam vncias ponderales septem cum dimidia continere dicit; ad enim de oleo tantum ex Galeno asserendum est. Quod si cotyla sanguinis, quæ mensura est, pondus exactè scire vellemus, quod fecit Galenus, nos facere necesse esset, ut mensuram illam appenderemus: id tamen constare potest, sex cotylas mensurales magnam esse quantitatem, & quam nostris temporibus nemo audeat detrahere, quod tamen si facerent aliquando medici, enimuero morbi nonnulli, qui interim dum vnciolas demimus, maximè inualescunt, debellarentur protinus, nec redderetur incurabiles. Sanguinis libra, quæ semel raro excedimus, exigua admodum

timet illud reddit, sed integrum, & robustum, si ex sanguinis copia morbus sit, aut saltem cum morbo, cum fouens sit abundantia.

De Angina nomine, & differentiis, ac de etymo. Celsus notatus. Locus in libro cui titulus Introductio, aut Medicus, ab interprete perperam conuersus, emendatus.

C A P V T X I.



ANGINA, quæ & anguina aliquando dicta est, Latina vox est: indicat Celsus, qui eo de morbo verba faciens libri quarti capite quarto, ita scribit: *Nostri anginam vocant.* Habet tamen originem Græcam, ut existimo, sicuti verbum vnde est deductum morbo nomen; Angina enim ab angō, id est, suffoco, & strangulo, aut spiritus viam præcludo, angō autem Latinorum ab ἄγω Græcorum. Apud Græcos dicitur σπαστική, aut πνέστική eodem etymo, nimirum ab ἀγός, quæ vox laqueum significat, & est ab eodem verbo ἄγω. Id habemus apud Trallianum libri quarti capite primo, atque etiam apud Calium Aurelium, qui aliud tamen etymon proponit, nimirum ἀπὸ τοῦ συνιέναι, id est, à continendo, seu cohibendo, quia spiritum cohibendo respirationem neget. Est autem Angina apud Latinos commune, & genericum nomen, quamlibet suffocationis speciem, in qua tamen afficiantur fauces, denotans, quale apud antiquissimos Græcos σπαστική & πνέστική, quæ etiam dicta sunt σπαστική, de omni suffocationis genere, in qua afficiantur fauces prolata, ut habemus expressè apud Trallianum libri quarti capite primo scribentem: *Omniem inflammationis speciem circa iugulum, siue interiùs, siue exterioris suffocationem inducat, apud antiquiores medicos, et plurimum fuisse appellatam Synanchem; posteriores autem quadrariam diuisisse.* Cautè autem accipiat quod ait, fuisse dictam Synanchem; nimirum haud negat fuisse etiam dictam Cynanchem, sed Synanchem genericum, & commune nomen esse. Vniuersè autem de quocunque suffocationis genere, quod dictum est, habemus apud Galenum tertio Prognosticorum, textu decimo octauo, vbi cum tres proposuisset Hippocrates anginae differentias (πνέστικας nominauerat) maioris, & minoris ratione inter se differentes; primam, & alteram, in quibus vehemens est strangulatio, ac dolor, nec inflammatio, aut sacer ignis extrà apparet, πνέστικας per se, nonnulli dici volebant: Postremam autem in qua fauces, & ceruix, aut ceruix & pectus ruborem traherent, minùsque esset perniciofa, σπαστικας per se. Despicit autem eam de literis illis recentiorum Medicorum contentiorem Galenus in commentario, tanquam ad nullam rem utilem: quin & Hippocra-

codices antiquos adesse testatur, in quibus non *συνάγχη* per *κ*, sed *συνάγχα* per *σ*, locus ille scriptus esset, tanquam utraque voce eadem differentia noceat, & utro modo appellares, nihil interesset. Quod & habemus libro quarto de ratione victus in acutis, textu trigesimo, per hæc verba; *sive Synanchon ducere vulueris, sive Cynanchon, vel alterum quidem horum Synanchem, alterum virò Cynanchem, sive utrunque Synanchem vocaueris, duas Synanches scieris esse rationes, ad curationes enim nihil nominibus indigemus; & ad finem eiusdem textus: Sermo hic, & Synancharum species, & easas, & affectos locos, & curationes docuit; neque si vel Synanchem, vel Cynanchem, vel Synanchon, vel Cynanchon appellares, fuis sollicitus. Igitur Synanche, aut Cynanche apud Hippocratem, & antiquissimos Græcos genericum nomen est, quale apud Latinos angina, & cuilibet speciei accommodari potest; sed cum Latini specierum nominibus caruerint, Græci recentiores nomina adinuenerunt, quibus sigillatim particulares differentie atque species notarentur, quare & Cellus post ea verba, quæ paulò antè recitavi, nostri *Anginam vocant*, hæc subdit: *apud Græcos nomen prout species est, recentiores nimirum Hippocrates auctores, intelligit, qui alia specierum nomina adinuenerant, quæ & proponit scribens, aliam fuisse appellatam συνάγχα, aliam ὑπὸ συνάγχα, & aliam παρασυνάγχα, quarum etiam vnamquamquam terminis suis circumscribit, & propriis signis distinguit. Malè autem Cellus, secutus recentiores Græcos quos dixi, commune nomen, quale apud Latinos angina videtur, Græcis auferre voluit per *γ*, apud Græcos nomen, prout species est, nec verò vllum ipse proponit: dari autem genericum & commune nomen apud Græcos, ex Hippocrate, cuius doctrinam magnam partem Latinis literis tradebat, poterat faciliè sicuti Galenus didicisse. Cum caueant igitur Latini specierum nominibus, ut diximus, apud Græcos recentiores illa in vlu sunt, nec tamen eadem ex toto apud omnes. Nam præter ea quæ ex Celso paulò antè produxi, alia etiam habentur. Tradit enim Galenus libro quarto de locis affectis capite, quatuor inuentis nominibus, *synâche, & cynâche, parasyndâche, & paracyndâche, illi consueuisse medicos nonnullos significare quatuor affectus, quos etiam proponit scribens: Quæ igitur sunt quatuor affectiones? Primum quidem, & primum ipsorum genus, ubi fauces inflammantur, fauces autem voco internam oris partem, ubi simul conueniunt, & gula, & gutturis partes extremæ: aliam quæ neque fauces, neque reliqua oris partes, neque etiam externarum partium inflammatione videtur, laborans tamen suffocationis periculum in gutture sentit. Tertium, ubi extrinsece in circa fauces inflammatio apparet. Quartum, ubi gutturis partes non externæ, sed internæ similiter affectæ sunt. Illam potro nominum diligentiam reprehendit eodem loco Galenus, constituta enim angina natura quòd affectus esset ceruicis, quoquo modo spirationem reddens detrahebat, ex Hippocratis doctrina, qui eundem morbum etiam appellauerat Cynanchem, subdit hæc verba: *Nondum scimus medicis hanc quidem****

quidem per α , nominata Cynanchem, illum verò per σ , Synanchem; tantum abest, ut vel parafynanché, vel paracynanché aliquam appellarent; quæ per σ circa nomina etiosius cõpère esse homines, in hoc verum ipsarum negligẽtia capiti. Hæc tamẽ quatuor nominum differentias, quotquot postea succelsẽre medicinarũ auctores paulo minùs sequuti sunt, variatis tamen aliqua ex parte anginiæ speciebus, quibus ea nomina apponerent. Trallianus enim postquam synanchem anni inflammationis speciem circa gulam apud antiquiores medicos fuisse appellatam scripsit, quadrifariam recentioris diuissile proponit, inflammatis enim musculis interioribus laryngis Cynanchem, exterioribus, paracynanché, interioribus, pharyngis, aut faucium synanché exterioribus autẽ parafynanchem, quã diuissi, onẽ habemus similiter apud Paulum Æginetã libro tertio capit. vigesimo septimo. At hæc non est illi omnino eadem, quam ex Galeno modò proposuimus; quam rem cum possit ex se quilibet, paululùm modò aduertens, facillẽ comprehendere, pluribus non persequar. Aëtius libro octauo capite quadragesimo septimo, ipsa affert Galeni verba, sed & illud addit, anginam ex luxatione alicuius vertebræ in collo ad anteriorem regionem, propriẽ à veteribus fuisse appellatam Cynanchem. Cælius Aetelianus, qui methodicam medicinam Latinis licetis vtrumque conscripsit, sed Græco fonte ductam, tum aliis, tum iisdem Græcis nominibus ad eas differentias ostendendas vsus est, quæ tamẽ aliter accommodauit, secutus doctrinam Valentis Physici. Fuit & hic medicinarũ auctor Latinus Vectius nomine, & Scribonij qualis, atque sicuti ille L. Apulei discipulus (si modò ille est, ut puto) sed qui, ut necesse erat apud Græcos medicinam apprehendenti, eorum vocibus vteretur; Cælius igitur cum antè proposuisset, hanc affectionem non solùm Cynanchem à canibus dici, sed etiã Lynanchem à lupis, quòd frequenter hæc animalia afficeret, & quòd luporum similes voces, aut ululatus in synanchica passione constituti, cum præfocari cõperint, emittunt, tum ex Valente libro tertio curationum, ita de anginæ speciebus rem proponit. Dicit enim eam quæ sine manifesto tumore est, absque nomine fuisse relictam (hæc tamen nomine seu Synanches, seu Cynanches ab Hippocrate fuerat proposita iuxta Galeni sententiam, aut Cynanches iuxta alios.) Tum quæ est cum manifesto tumore, & visibili indicio, in quinque species aut differentias diuidit: si enim est in vtraque parte interiorum partium, id est, intra oris spatium, ut antea loquutus fuerat, Cynanchem vocandam ex accidentibus, quæ inuehit, ab illis non dissimilibus quæ eueniunt canibus ob res faucibus inhærentes suffocatis: si verò in altera parte tantum eiusdem interioris spatij, aut dextra nimirum, aut sinistra, paracynanchem; si autem in exterioribus, & vtraque parte, tum dextera, tum sinistra tumor sit constitutus, synanchem à subus, quod horum animalium colla his sæpiissime inflationibus afficiantur, vnde enim Græci fues appellant; si autem interiùs, atque exteriùs, & in vtraque parte, nimirum

tum dextra, & sinistra, fuerit tumor, tunc proprio non ine synanchem esse nuncupandam: quod si in altera parte tantum, nimirum aut dextra, aut sinistra, sed simul extrinsecus, & intrinsecus, parasyanchem. Hæc Cælius ex Valente illo Physico. Ferè timeo importunus haberi, résque ipsas despectum habere existimari posse, quod superius ex Galeo obii- ciebam; qui circa harum vocum ad curationem minime necessarium minutam explicationem adeò sim curiosus; sed quando non curatio- nem, sed librorum intelligentiam spectem hoc loco, haud importunum studium existimetur, si adhuc ex Aretæo quædam proponam, qui cy- nanche, & synanche non ita vt alij vsus esse videatur, nec tem de hisce duobus nominibus sine offensione aliqua explicuissè. Isignitur libro pri- mo capite septimo, quum initio statim proponeret synanchem tanquam genus, quam esse diceret spiritus oppressionem, duas eius constituit species, alteram vitio spiritus solius in se ipso causam habentis, alteram ex inflammatione; hanc posteriorem tum synanchem, quomodo appel- lauerat genus, tum etiam alio nomine cynanchem appellari scribit, & reddit nomenclaturæ huius rationem; vel quia talis passio occupet & apprehendat canes, vel quia etiam per sanitatem ea animalia lingua exerant, quod faciunt qui hoc morbo afficiuntur: tum verò de altera specie agens, quæ sit vitio spiritus, eam similiter appellari dicit *συνάγχη*, synanchem, quæ generis fuerit appellatio, nominisque rationem reddere eam, quæ intus vergat, atque intus suffocet, vt videatur particula *συν*, ea compositione interiores, & magis abditas partes respicere, iuxta os, & pulmonem sitas, has enim in hoc genere maxime laborare tractat, indeque morbi esse initium; hanc verò appellari posse Cynanchem, & ita hanc Aretæi doctrinam non appareat. Igitur synanche est nomen commune generis, tum proprium huic, & illi speciei, quæ tumore quæ est vitio spiritus, proprium alterum habet, nimirum Cynanchem. Ita accipit hæc duo nomina Aretæus loco proposito; at libro quinto, vbi earundem passionum curationem tractat, cum easdem duas species synanches nomine comprehendisset, cynanchem nullam appellat, nec eius nominis amplius meminit. Finem faciara huiusce disquisitionis de illis vocibus, si vnum adhuc adnotauero ad verba, quæ de eodem morbo in libro, cui titulus est Introductio, aut Medicus, cap. xiiij. Latine leguntur in hunc modum, *Angina est circa cervicem inflammatio. eius circa vnam Græci συνάγχην appellant, quæ in interiori ipsius parte orta spiritibus trans- greditur: alteram σιναγχήν: hac in exteriori partem incumbit, cõpæ τινος strangulatur, cuiusque periculosa est.* Malè autem fecisse interpretem ex istis, qui vtriusque angine genus constituerit cynanches, & synanches, quæ non est. Latina enim ea vox est, nec apud Græcos vlla est superior, quæ duobus huic tanquàm genus dicatur, nec eam tem exprimumus auctoris verba Græca, quæ ita sonant. *συνάγχη δὲ καὶ σιναγχή φλεγμοναὶ ἐστὶν πρὸς τὸν λάρυγγα. ἢ μὲν πρὸς τὸν ἄνω αὐτῷ ἐξίτην πρὸς τὸν στήθος, ἢ καὶ σιναγχή, ἢ δὲ σιναγχή τις τῇ ἐντρίχῃ.*

ἡ δὲ πολλὰ πύσσει, διὰ τὸ ὅτι οἱ πύσσει, καὶ ὅτι οἱ πύσσει. Hæc autem verbum verbo ita ferè reddas: *Cynanche autem & synanche, inflammationes sunt circa ceruicem, aliter quidem circa partes ipsius internæ acutè suffocans, cynanche: synanche autem ad exteriores magis vergens, & ob id minus suffocans, & minus periculosa est.*

Inflammatio quomodo gignatur. Repellentium usus in angina, & qualibet inflammatione, quoque tempore repellentia adhibenda. Varia Galeni loca adducta, & illustrata.

CAPVT XII.



N anginae curatione repellentibus auxilium viendum esse satis constat, tum ex iis quæ de inflammatione generatim à Galeno scripta sunt, tum ex illis priuatim quæ de anginae curatione ille idem proponit commentario 4. in librum de ratione victus in acutis, rex. xxx. Adhibentur autem illa non extrinsecus collo, ne ad locum interiùs affectum, quâ transit spiritus, aut cibus, repellant morbum efficientes materias, quæ ad exteriora potius trahendæ sunt; sed interiùs faucibus per gargarismata, aut illinitiones. Quæ tamen eorundem repellentium sit propria in hoc morbo auxiliaris actio, quémue usum illa peculiariter præstent, dum ita adhibentur, non ita indicorum vulgo fortasse obuium; quare ea de re nonnulla adnotare libuit. Existimare enim fortasse quispiam, illius tantùm materie gratia, quæ motu cietur, & fluit, adhiberi repellentia auxilia, vt illi obuiam facta, fluere eam non permittant ad partem læsam, sed vt pars læsa eorundem vsu adstricta, & roborata ne recipiat; quem vsum sicuti repellentia præstant, ita alium enimuero præstant eo non minus necessarium, qui pertinet ad materiam, quæ iam fluxit ad locum læsum, ibique hæret, & inflammationem facit. Hæc enim materia vsu repellentium ex eo loco educitur, locûsque inanitur, cuius inanitionis modum vt liquidius ostendam, explicandum antea est, quomodo generetur inflammatio; est enim par repletionis, & inanitionis modus. Non possum autem eam rem melius ostendere, quàm ipsis Galeni verbis, quæ non vno loco leguntur. In primis igitur hæc sunt in libro de inæquali intemperie, capite quarto: *Quippe calida fluxio ubi in musculum procubuit, primum maiores arteria vnaque replentur, ac distenduntur, ab iis minores, atque ita res procedit donec ad mininas sui perueniant; in iis ubi valenter impressa fluxio est, nec amplius contineri potest, partim eius per ipsam ora, partim per iunctas collum, foras transmittitur, tum verò spacia ipsa vacua, quæ inter prima sunt*

corpora fluxione implentur. Apud eundem Galenum hæc itidem habemus libro artis medicinalis capite lxxxv. Supponatur igitur cuipiam particula in al vundem sanguinis influere, adeo ut discedantur quæ in eo sunt vasa, non maiora tantum, sed etiam parva, quæ prius sensum effugiebant, nunc verò quia plena sunt visum comprehenduntur, sicut plerumque in oculis ob innixa albedinem manifeste sunt patet: Par autem cerè est, quòd & alia vasa, quæ lucent sensum, cum cetera discedantur, nondum ea ipsa ob parvitatem sensus manifesta, & iam periculum imminet, ne quod ex vasis exudat, ad spatia vacua, quæ in medio sunt effundatur, aut ne cum parum aliquod sit effusum. Ex his igitur patet tunc inflammationem fieri, cum ob aliquam causam (sive illa plenitudo sit, sive alia) ex venis maioribus ad minores delabatur sanguis, ab his rursus ad minimas, tumque demum ex his ad spatia inania, quæ in medio posita sunt; dicuntur autem inania hæc spatia, atque hæc regiones, non quòd nullum omnino in eis corpus sit, sed quoniam nullum adsit solidum, quod visu, aut tactu comprehendatur: sed aer tantum, aut spiritus. Igitur ubi inflammata parti adhibentur ea quæ repellunt, quæ sunt si-
gida, & adstringentia, ut habet Galenus eodem capite nonagesimo quinto artis medicinalis, & quinto de simplicium medicamentorum facultatibus, capite decimo septimo, sanguis, qui in loco inflammato continetur, ut adstringentium expressus, eandem quam iuit viam remeando, retrò pellitur vnde venerat, à venis nimirum minimis ad maiores, ex minoribus ad maiores, & inde ad maximas, iuxta Galeni sententiam: ex spatiis enim & regionibus inanibus ac in medio positis, remeare in venas & vasa sanguinem, negat Galenus loco adducto libri artis medicinalis, sed qui in illis continetur, eum egere dispergentibus, aut resolventibus: at si nullus dum per ea ea spatia sit effusus ex inflammatione sanguis, hæc via euacuata materia, morbum tolli. Atqui ex Aristotelis opinione Problematum sectione nona, problemate nono, fieri possit ille regressus ex spatiis inanibus ad venas. Ibi enim rationem reddens, quam ob rem cyathus æris statim appositus, vibices discerneret, id fieri dicebat, quia sanguinem effusum à concretione prohiberet, eam autem prohibere, quia retineret calorem in sanguine, quo abeunte non cresceret, ubi autem in cute non concreveret, rursus diffundi, & redire eò vnde discesserat, atque ita prohiberi cutim à liuore: At cum ex venis discesserit sanguis (suis enim hic locus est) enim muerò ad venas, ut Aristotelis opinione eundem remeare, dicendum est. Id verò in Aristotelis Problemata commentariis scribenti, qui deinde editi sunt, cum durum videretur, nec tamen hic Galeni locus eo tempore innotuisse occurreret, rem esse dixi consideratione dignam, quæ tamen ex Aristotelis opinione est indubitata; & certe etiam veritati maxime conueniens: sed nos quæ de sanguinis recursum ex venis minoribus ad maiores, & quæ parte inflammata ad vicinas, de Galeni sententia proposuimus, eius viri testimonio pluribus confirmemus. Ille igitur proposito capite nonagesimo

gesimo quinto libri artis medicinalis, quum in multitudine sanguinis, qui in aliquam partem influxisset auferenda, proposuisset nobis curandum esse, ut euacuato prius toto corpore materia retrocederet, repellentibus ad eam rem utendum esse dicit, quæ astringunt & refrigerant, Duplici autem modo retrocessionem, aut refluxum materia repellentia iuant. Primum enim reprimunt humores occurrentes, & proximis: hoc enim repercucientium aut repellentium proprium est munus, ut in altum, & ad corporis partes profundiores proximos succos repellant, ut habemus apud Galenum libro quinto de simplicium medicamentorum facultatibus, capite decimo septimo; tum vero naturales actiones ex illis adiuuari cōtingit, nimirum & attractionē, & expulsionē; attractionē, quia vasa magna, & latiora, quæ antea exinanita sunt (vniuersum enim corpus antea purgandum esse dixit) trahunt ad se quæcunque repelluntur; expulsionem, quia minimæ venæ, & arteriæ partis inflammatae, in quibus morbosa materia potissimum continetur, vigore aucto ex medicaminibus adstringentibus, molestum excrementum à se ad alias partes reuertunt; ita tum propria medicamentorum virtute propulsa materia, tum à naturali facultate illinc attracta, hinc abacta remeat, & retrocedit ad laxiores partes à quibus defluerat. Eundem repellentium vsum habemus etiam libro quinto de simplicium medicamentorum facultatibus, capite quinto, cum de medela eorum ageret, quæ indurata ex repletionem sunt (illa autem erat inanitio, seu euacuatio.) Tria enim auxiliorum proponebat genera, refrigerantia, exaltantia, & quæ propriè vocantur siccantia; ab his enim omnibus inaniri partes & superfluum euacuari humore, sed sua ac peculiari à quoque ratione. frigida igitur eam rem duobus modis efficere, nimirum tum repellendo, tum etiam vnâ cum calore multâ educentia humiditatem. Prior igitur modus, quo refrigerantia exinaniunt partē repellendo, & quo durata iuantur à repellentibus, non est alius, quàm modò proposurus, quòd fiat illius humoriseductio; qui in parte indurata continetur, is enim repellentium vfu refluit, & retrocedit à locis angustis ad spatia laxiora. Partem autē duratam meminerimus dixisse Galenum ex repletionem, quæ rennen magis propriè appellatur, ut paulò antè ipse admonuit: si. n. sit pars dura, quia materia in ea contenta sit dura, & teneltris, aut vehemēter impacta, sic ut obderuerit, iam repellentia renuuntur, ut etiā libro artis medicæ, & vbi scribit Galenus. Libro etiā decimo tertio methodi medendi, cap. 16. manifestissimè de repellentibus eadem habetur sententia. Ibi enim, ad iecinoris inflammationem docens medicamenta nunquam sine repellentibus, indicatione à parte sumpta, esse adhibenda, repellentium vsum perspicuè proponit eum esse, ut id educatur, quod in laborante particula continetur. Aut enim inflammato iecinore, mixto utendum esse medicamine, nimirum non absque repellenti aliquo, idque non solum in ipsa phlegmones generatione, quo tempore nimirum, ut aliarum

etiam

etiam partium inflammationi est commune; sed etiam cum nec affluat quicquam amplius, nec repelli, quod in laborante particula continetur possit; quibus postremis verbis, hunc de quo loquimur repellentium usum significat, sicuti prioribus alterum, quo aduersus illa, quæ fluunt valent repellentia. Duplici igitur nomine repellentibus utimur, tum ut prohibeatur ne quid amplius fluat, tum ut retrocedere & remigrare cogatur quod fluxit, & in particula continetur. Alius adhuc addatur locus, priuatim quidem de angina, sed qui communiter cuique etiam pluri inflammationi conveniat, scriptus commentario quarto in librum de ratione victus in acutis, particula trigesima. Ibi enim totius corporis evacuatione, quæ primum omnium est procuranda, proposita, manifestè duplicem repellentium usum, quæ postea sunt adhibenda, his verbis commemorat: *Corpus igitur totum vena scella vacuare oportet, & purgatione, & clysteribus; verum affectas partes medicamentis adstringentibus, quæ præfuerint retrahunt humores, atque ex firmatis eos qui non admodum infirmi sunt, & glutinosi, & crassii.* Sed & manifestissimis verbis idem patet libro vnde decimo methodi medendi, capite decimo quinto, ubi scribitur à Galieno repellentia, quæ adstringendi vim obtinent, duplici ratione in initio fluxionum convenire, & quod robur affectis particulis inferant, vnde minus promptè recipiunt, & quod eorum quæ in viis iam contenta tenuissimum extorsum exprimunt. Nec minus idem apparet ex decimo tertio methodi capite octavo hisce verbis: *Quod verò ex eo quod in laborante membro continetur, quod etiam in proximas partes repellit, hæc plerumque generis medela est.* Possimus enim verò eandem rem alius etiam Galieno locis confirmare, sed hæc sufficere arbitramur. Quamquam ad rem sit repellentium usus quem ostendimus, ut ex inflammato loco iuncti beneficio euacuari possit vitiosa materia, non tamen ex illiusdem esse id ita esse perpetuum, ut quolibet morbi tempore, & qualibet materia conditione, eorum usu illa euacuetur: ex quo fieri contingit, ut in eorundem usu non sit semper perseverandum. Id enim tunc solum licet, quum principium est morbi, & materia est tenuis, nec vehementer impacta & vasa robore prædita, quæ in idem fere recludunt; initio enim morbi, tenuis est materia, neque dum aut efflescere, aut vehementer figi potuit. Id verò ex me non dico, sed ex Galieno, qui eodem libro decimo tertio Methodi capite decimo sexto, cum in iccinoris inflammatione proposuisset vrendum esse repellentibus, non solum in initio, & generatione phlegmones (quibus solis eo tempore in aliarum partium inflammatione vitiosa est) sed indicat sumpta à parte, mixtum cum aliis etiam in vigore, quo tempore in aliarum partium inflammatione, in quibus hæc indicatio non attenditur, eorum nullus sit usus, cum repelli, aut cogi ut refluat eo tempore non possit materia; totam hanc rem nos docet, & causas proponit, ob quas non possit in vigore ad alias partes regeri, & repelli: sic autem scribit:

Accidit enim hoc multis de causis sicut in principio, tum parum est quod affluit, tum magna ex parte tenuius, tum partis ipsius quæ recipit, virtus nonnunquam valentior, utpote nondum lassata, tum quod in afflucta continetur parte non modo valenter impactum; At cum phlegmone in vigore suo iam consistit, tum malus in ea sanguis continetur, isque crassior subinde, ac vehementer impactus, tum virtus partis iam est debilior, quam aliquem valentem requirimus, quo scilicet a se supernacua amolitur, quandoquidem haud satis potens est adstringentium praesidiorum vis, quæ sola totum effluit; quippe potest hac cogendis, ac costringendis, & veluti densandis, & reprimendis corporibus, quæ tenuiora consistentia sunt, ad circumpositas partes expellere; ceterum nisi etiam laborantes particula virtus aliquid auxilietur, nihil adeo magnum efficiat. Hæc Galenus. Quam doctrinam habemus similiter capite nonagesimo quinto artis medicinalis: hic enim cum repellentia auxilia proposuisset adhibenda, ut eorum beneficio à parte affecta repelleretur morbifica materia, & ad proximas remeare cogeretur, quæ nos paulò supra adduximus & explicuimus, hæc subiicit: Si igitur hæc via superfluum omne retrocesserit, bene se res habet: At si aliquid fuerit in parte retentum, coniectandum erit, id lenius, ac crassum existere atque ea ratione iam coactum, atque adstrictum, ut cum difficultate extrahi possit. Fieri autem posset etiam si non eius natura sit, ut ad spatia quæ in medio sunt, sit effusum: in quo casu, tunc ad id veniendum esse tempus suadet, ut hoc ipsum quod reliquum est per patientem licum euacuemus, imponento superiacentibus partibus ea quæ influentem humorem repellendi vim habent. Igitur si tenuis est materia quæ fluit, non crassa, coacta, & adstricta; si non est ad spatia quæ in medio sunt effusa, ut hic scribitur; si vasa sunt robusta, quod habemus libro decimo tertio Methodi, quæ omnia in principio inflammationis contingunt, liceat vsu solius repellentis medicamenti, purgato antea toto corpore, curare inflammationem; nec ad resolutentia, aut aliter evacuationia necesse est progredi. Si autem copiosa est quæ iam fluxit materia, crassa, ibique vehementer impacta, vasque debilia; aut si in spatiis, quæ in medio sunt effusa, quod in vigore accidere solet, non iam nobis illud liceat, sed ad alia inflammationum præsidia veniendum; eo enim tempore, quod decubuit, & quantitate plus, & violentius adeo impactum est, seu per spatia vacua effusum, vasaque ita delassata, ut repellentium vsu educi materia non possit, unde ab eorum vsu abstinendum est: quod enim antea paratum magis vinci haud est victum, qui speremus viribus auctum posse à debilioribus superari? sed & aduersa eo tempore repellentia morbo sunt, materiam enim reddunt crudiorē, & minus apta, ut concoquatur, ob quam rationem scribebar Galenus libro sexto de compositione medicamentorum secundum loca capite primo: Quousque quicquam influit, id ipsum repellere conuenit, ubi verò consisterit, concoctoria afferre, & deinde consequenter discussoria. Non quo repellentia solius materię gratia quæ fluit adhibeantur, sed quia dum fluit materia, quod est initio inflammationis, illa quæ iam fluit, & continetur in parte inflam-

maria est exiguè aeternius, non impacta, nec ad spatium vana effusa, vasque sunt valida, unde licet illam repellere, quum autem eo fulit, impedimenta illi adiunt omnia, vel magna ex parte; unde a repellenti abstinendum est, possumus quod illud tanquam signum est à Galieno. Igitur quamquam ad euacuandum materiam, quæ iam fluxit, & in inflammatione loco continetur, adhibeatur repellentia, non tamen omnibus morbi temporibus (omitto nunc indicationem à parte) à nobis usurpari sine magno detrimento possint, materiam enim magis incassant, durant, exsiccant, & coctioni reddunt magis ineptam, nec inde eam expellunt; quare si initio non videmus inflammationem cedere repellentibus, nec inde regeri materiam, ad alia euacuantium subsidiorum genera nobis transeundum est. Solo igitur initio morbi adhibebuntur in eum quidem usum quam dixi, In vigore autem (omitto & hic indicationem à parte ut in iecinore) quo tempore circa affectam particulam, vti eam exanimamus, resolucentibus vtinur, aut scalpello incidimus, vt per ipsum euacuemus. Dicit Galenus ad repellendum quæ influe, e fortissime possent, & prohibendum quominus ad eandem partem labantur, repellentia enim eo tempore adhibenda, non tamen parti ipsi affectæ resolucentia potius requirit, & præ duritie humoris renuit repellentia, in partibus proximis & superiacentibus ita enim possunt illi perire, quod quæritur: initio autem inflammationis ad finem eam quæritur, nisi minutæ parti, non superiacentibus, apponi darent.

Anginam dari absque inflammatione. Galeni ea de re inter se contraria loca consiliata. Particularis quedam angina Aretæi explicata.

CAPVT XIII

ANGINA inflammationis genere comprehenditur, vnde & per eam definitur, veluti ab ea nunquam hic est ulla, & Galeno etiam ita libi, vt commentatur in libro de quatuor de ratione victus in acutis, textu vigesimo per hanc verba: *ἡ ἀγγίνα ἔστι φλεγμῶν καὶ πυρρῶν καὶ θερμῶν καὶ ξηρῶν, ἡ δὲ ἀγγίνα ἐστὶν φλεγμῶν καὶ πυρρῶν καὶ θερμῶν καὶ ξηρῶν, ἡ δὲ ἀγγίνα ἐστὶν φλεγμῶν καὶ πυρρῶν καὶ θερμῶν καὶ ξηρῶν*, id est, Angina est inflammatio, & per eam definitur, vt per eam libi secundo ad Galienum capite primo, vbi pharynx est inflammatio, nonnulli capiunt. Aliter tamen quando ab angina inflammationem, & ex eadem Galenus capris colligitur, libro eundem quarto de huius affectus, capite tertio, quintum genus anginae alios medicis intactam, ex vertebra autem per eam ad interitum si non oporuit, adducta etiam Hippocratis sententia ex libro secundo Epidemiorum, non ita paucis verbis condisce. Tale autem angina

anginx genus abque inflammatione contingere non dicit eo loco expressè Galenus, sed quanto eo genere adiuncto, cum refert medicorum sententiam, qui quatuor illis tantum ex inflammatione obortis, synanche, parasyanche, cynanche, & paracynanchie propositis, quartum aliud genus ex vertebrarum luxatione relinquerent intactum, eam rem enunctorio significat. Vnde magis vniuersæ affectionem eo loco definiens, adducta etiam alia Hippocratis locutione ex tertio libro Prognosticorum, angina nomine appellat omnes affectiones, quæ cervice accidunt, ubi inspirationem quoquo modo reddant deteriore, nomine cervicis comprehendens quæcunque intus, aut exterius ad fauces, vel guttur pertinentia, cum difficultatem inducere possunt. Fit enim respirandi etiam difficultas per morbos thoracis, pleuritidem, peripneumoniam, & alios, sed illis cervicis partibus: verum si cervix aliter etiam quam per inflammationem affici potest, sic ut respirandi difficultas in aliquam inducat, necessariam esse inflammationem non video: potest autem, angustia enim gutturis abundè est, ac angustia non semper & necessariò ex inflammatione, sed aliter etiam, ex luxatione vertebrarum proposita ex tractione, tensione, & eversione partium nervosarum ad vertebrae pertinentium, quæ absque inflammatione ab eodem etiam succedere, aut humiditate contingere possunt, ex eodem Galeno libro quarto Aphorismorum, commentario ad Aphorismum trigésimum quintum, vnde & eodem loco quartus de locis affectis, cum doceret, quam ob rem Hippocrates eos qui ita affecti sunt, anginosos appellaret, discrimenque proponeret inter anginosum concursum, & pleuriticum, atque peripneumonicum, duo in medium adducebat, alterum, quod in affectione ab Hippocrate proposita, eorum quos anginosos appellauerat, nullum adfuisse in pectore, vel in pulmone vitium, ex quibus etiam difficultas respirandi oritur, alterum, quod angustiae sensus in pectore eisdem adfuisse. Dicit igitur Galenus angustiae sensum, non inflammationem: sed ex Hippocratis quoque verbis à Galeno recitatis, inflammationem illis minime adfuisse manifestè liquet, quæ ita Latine leguntur: *fauces licet inflammatio non angeret, ipsa tamen molestia minime carebant.* Non ignoro hunc locum aliter etiam legi, apparereque corruptum, non tamen sic, ut quacunque lectione inflammationem aliquando abesse non conuincatur necessariò. Ennuiciò enim inflammatione quoque esse hoc vertebrarum vitium, ex eodem Galeno appareat ad extremum capitis tertij, ubi de eadem luxatione ad interius partes idem agens, & accidentia ipsi euenientia percutiens, scribit; interdum ascendente inflammatione, & linguam, & fauces in tumorem attolli: manifestissime etiam, & apertissimis verbis ita rem se habere explicat commentario primo ad librum prothetico-rum, particula vndecima per hæc verba: *Non fies autem in eo quem percutis sermone mentionem eorum, qui anginam ex collis vertebris*

in anteriorem partem luxatis perferunt, tum quod raro contingat affectum
tum quod gutturis muscoli, tum quoque simul inflammari inibi videantur:
non igitur videatur, ab hac anginae specie, quod propositum, ex
Galei quidem opinione bene confirmari posse. Nos horum locorum
conciliationem asseremus paulò post. Interim ex Hippocratis verbis
rem putamus dilucidè constare: sed & ex illis quæ à Galeno scripta
comm. ad Aphorismum trigessimum quintum libri quarti nos superius
adduximus, quibus aduicio ab eodem Galeno deductam rationem: Scri-
bit enim Galenus, hocce genus anginae ex luxatione vertebrarum ab
Hippocrate propositum, raro etiam à se visum accidisse nullo existen-
te in gutture proprio affectu: igitur patitur guttur per consensum, qui
ei cum luxata vertebra: at si muscoli gutturis vnà inflammantur, iam
non minùs eorum proprius affectus hæc angina sit, quam Cynan-
che, aut paracynanche. Modos autem quibus patiatur ceruix, quum ad
interiora luxantur vertebræ, proponit eodem loco Galenus quinque, vt
quinque sunt huiusce anginae genera, si ex diuersitate locorum, qua
patiuntur, anginae species aut differentie sunt constituendæ, quod fa-
ciunt qui quatuor illas, synanchem, parasyanchem, cynanchem, & pa-
cynanchem proponunt. Nouem igitur, non quatuor aut quinque vulgè
iactata anginae genera. Fit igitur angina, eaque propriè dicta, etiam in
abiente inflammatione, vt ex Hippocratis verbis propositis absque con-
trouersia, ex Galeno videm, sed non absque offensione. Tollimus autem
offensionem si possumus, & conciliemus loca, quod antea diximus. Pro-
mum igitur fortasse non cerè affirmat Galenus i. comm. ad prorrhæam,
inflammari musculos gutturis, qui dicat *fontem* in ibi videntur, non
vnde, id est, apparent: tum, quod melius puto, in vtriusque illius locutione
non ex necessitate, nec statim cum morbis incidit, iungitur inflammatio,
sed hæc accidit postea, ex illo vitio statim laesa: est igitur ibi absque in-
flammatione angina, sed ex accide[n]ti iungitur inflammatio paulò post.
Igitur adesse, & non adesse, iuxta sensum quo rem accipimus, & iuxta
morbi tempora dicere possumus. Libro etiam quarto de ratione victus
acutus, particula vigesima, vbi anginam per inflammationem in *fontem* Gal-
lenus, non vniuersè quicquid hæc communi nomine comprehensum
definit, sed particulare & potissimum anginae genus, quod loquar
curandum occurrit. vix enim, licet ex se dari possit, ad illud aliud curan-
dum accessit medicus, quin iam sit iuncta inflammatio. Hæc ea de
re sunt à nobis adducta ex Hippocratis & Galeni sententia. At vnde ex
Aretæi opinione, anginam absque inflammatione dari, licet à his ge-
neris, quàm à Galeno propositam, inaximè perspicuè, & ex illis ver-
bis constat libro primo cap. septimo: ibi enim duas anginas facit, & Aretæus:
alteram, quæ sit inflammatio instrumentorum spiritalium,
alteram, quæ sit affectus solius spiritus in se ipso causam habentis, & cum
in illa sint inflammationis signa, in faucibus, & facie, quæ peccant
humida

humoris affluxum, & abundantiam indicant, in hac, humores si abundantie adeo non adesse signa, ut defectus potius, & inanitionis argumenta appareant, vitiatique spiritus notæ, nimirum instrumentorum quæ spiritui deseruiunt, collapsio, & pro singulorum natura macies maior, vñ cum vehementi strangulatione. In tali potro angina existimasse nonnullos adesse inflammationem, eamque abditam in pectore, latentioribusq; partibus circa cor atque pulmones, scribit Aretæus eodem loco, & repetit libri 7. capite 7. ubi eiusdem morbi curationem proponit; sed libro primo, animi sui sensum manifestè exprimens subdit: *Videtur autem mihi ipsius sciri spiritus vitium esse, praua conuersione ad calidissimum, & siccissimum conuersi, nulla corporis parte inflammatione laborante.* Sequitur autem ad docendum, iam minimè mirandum esse, citra inflammationem, & sola spiritus immutatione fieri affectum adeo acutum, quando absque vlllo corporis vitio, in charonæis, & barathris, vñca inspiratione priusquam corporis partes aliquod malum patiantur, homines intecereant; quod similiter illi contingat, in quem dum aërem attrahit, canis rabidus inspirauerit, licet eum non momorderit; sicuti autem ab externa causa vitiatum spiritus qui in nobis est, ut in exemplis propositis, ita ab interno principio fieri posse scribit Aretæus, & probat exemplis aliarum rerum. Quæ ratione autem spiritus hic, seu aër intrò attractus, ad calidissimum & siccissimum praua conuersione immutatus strangulationem pariat, non dicit Aretæus, sed ex illis dignoscere licet, quæ tum alibi breuiter, tum longiori sermone potissimum scribit Galenus in libro de vsu respirationis; docet enim eius libri capite tertio, sicuti flamma omnis, ut conseruetur, nec perat, indiget aëre externo, qui moderatè ventilet, sic insitum calorem nostrum respiratione egere, per quam frigido aëre attracto roboretur, & conseruetur, si autem eiusmodi refrigeratio non fiat, suffocari insitum calidum, & animal interire, sicuti illis contingit, qui in balneis diutius immorantur, & illis qui super leberem aquæ calidæ consistentes, progredientem inde vaporem respirando hauriunt: fieri enim his suffocationem, propter caliditatem respirando attractam, non propter exolutionem, probat Galenus aduersus Erasistratum eius libri capite quarto. Vbi enim ex attracto aëre non ventilatur calor & pulmo, in quem vsus est à natura instituta respiratio, fit perinde ac si non traheretur, adstringiturque, & densatur pulmo, tanquam si cubita esset respiratio; non ventilatur autem pulmo, cum tale vitium quale proponit Aretæus, concepit spiritus, id est, aër, qui per inspirationem attractus intus continetur. Huiusmodi autem vñ causam intrinsecus spiritui esse paratam, cum suffocatis inter charonios specus extrinsecus adueniat, proposuit antè Aretæus. Enimvero huiusmodi angina speciem ex antiquis Auctoribus præter hunc Aretæum memorat Acmo, ipsèq; Aëtius, quum de angina ab Aretæo desumpta quæ dicitur etiam

proponeret, reuocet omnino. Ex recentioribus qui partium moribus de-
 ferunt, quid sit, nemo illius meminit, præter Ludouicum in Myra-
 toria Hispania virum eruditissimum, qui cum ex Areta o ilam speciem
 proponat, atque inter eum morbum ad aërem attractum, quem et illor-
 tem, & aspidiosum, & fuliginosum effictū, non potest ratione cras-
 sū, & tenuem recipere, vnde suffocari ab eo contingit animal, si uia
 excludere videtur cum semiacensis carbonibus conclauū vndiq; clauso,
 etiam enim inde exhalantes vapores, ex quibus suffocatos & ipse vidit non
 parum, ac testatur etiam Gradius, qui huiusmodi angina ex carboni-
 bus semiacensis, mentionem facit in commentariis suis ad nenum Rha-
 sis ad Alimantorem. Non possum tamen facillè intelligere, quomodo
 talis angina ex suffocantibus vaporibus, ea sit, quam ex vitæ spiritus
 defertur Aretæus. Manifestè enim Aretæus in illa angina proponit spi-
 ritum calidissimum, & siccissimum, id est, tenuissimum; tantum abest,
 ut crassiorem dicat. Non obscurè etiam docet, causam affectus huius
 extrinsecus esse, sed intrinsecus, cum quæ de charonis tradit, illa sit
 rudinis gratia ad rem declarandam affeantur, ut non possit quæ
 ita crasso extrinsecus adueniente incidit angina, hæc Aretæi esse. Quod
 etiam existimasse videtur Thomas à Veiga Eborenensis in commentariis ad
 quartum caput libri quinti de locis affectis, ubi huius angina Aretæi defini-
 tione facta, paradoxam, & duram (sicuti ille dicit) Aretæi sententiam
 existimat, quum ab halitu carbonum angina ab omnibus accipere
 deatur: nisi tamen & hanc eandem reuiceret Veiga. Quæ sententia
 cit aduersus Aretæum Veiga, facillè refelli possunt. Quod etiam
 illi angina inflammatio, id verò eam non tollit, non enim ad angina
 esse necessarium probauimus. Vitium autem aëris attracti, &
 causam, non extrinsecus inquirendam, sed intrinsecus, ut patet, in
 signi, docet Aretæus exemplis similibus propositis; scilicet, cum hæc
 maligna angina, externè apparente inflammatione, nam quod in-
 flammatio interna, id est, humoris affluxus, qui nullus est, ad exte-
 riora vertatur, sed quia iam cessante morbi malitia, & tenuitate
 & morbi materia non adeo tenui, quippe non tanta caliditate, &
 citate vigente, externè fit, & apparet inflammatio, quæ internè in-
 la erat. Et hæc ferme obiter sunt dicti. Ceterum signa in hac angina
 specie caliditatem, atque siccitatem spiritus omnia denotant, ut
 sunt. comitatur enim instans mori collapsio, gratitudo, pallor, &
 oculi sunt caui, interius demissi facies, & gurgulio repleto, &
 multò magis subsidentes, vocis que præsertim, esse tamen de præsertim
 huiusce speciei quam priorem violentiorem, dicit Aretæus, quæ in
 peccatore malum sit, ubi spirandi institum perit, afflicti animi
 spiritus fontem, aut spiritum (in hoc enim vitium posita) in ipso
 fonte vitiatum esse, quippe circa pulmonem, & q. r. Aune igitur per hanc
 modum omnis suffocatio erit angina? non idem, est Aretæi
 sententia.

statim caput eam deficiat, spiritus et impetibus hominis, videtur fore suffocationem comprehendere videatur; etenim enim, illis vultus angina tantummodo generis affluant, angina autem, est abique instrumentorum que spiritui dicata sunt, lesione fieri non possit. Est enim suffocatio; at suffocatio non aliud quam interitus eueniens propter defectum respirationis, qui fit ob angustiam alicuius ex instrumentis respirationi seruientibus, quod legimus apud Galenum lib. 5. Aphorismorum, et commentario ad Aphorismorum trigessimum quartum. In hac tamen dicitur angina, nisi ceruix afficiatur, id est, partes ad fauces, aut guttur attinentes, quod fieri in presenti morbo, signa ibidem apparentia arguunt. Sunt enim vitium quiddam ex pectore, & pulmone ibi vitiatum spiritum, at afficiuntur etiam partes superiores, per quas vitiatum idem spiritus additur, afficiuntur autem non per inflammationem ex contentia Aretæ, quippe nullus ad eos humoris affluxus; sed contrario modo, quod absumpta, exinanita, & emacrata, ac retracta per spiritus siccitatem sint, quippe ab expiratione seruienti insumpra sunt omnia humida, nec in illis tantum partibus, sed in oculis etiam ob viciniam, ex quo caui facti sunt. Forma igitur & essentia morbi, sicut etiam in alia specie angustia est, sed aliunde proueniens. Est verò angustia non solum in pulmone, sed etiam in guttute angustia sensus, quem ad anginam requirit Galenus, non ab affluxu humoris, sed a siccitate, & partium constitutione. Ita igitur vitio spiritus, praua & maligna conuersione ad calidissimum, & siccissimum ininurati fit angina, & quibuscumque in morbis tale spiritus vitium succrescit, in illis eiusmodi angina titur, vnde potissimum in æstuosis febribus, quæ ad eam spiritus caliditatem, & siccitatem perueniunt interdum, vt non solum pulmones, sed partes etiam spiritus superiores afficiant, & in tali febre vidimus eam me aliquando vidisse, quæ etiam ægotantem de nobis tulerit. Illud Galeno aduersarium in hac doctrina Aretæ est, quod vitium est in pectore, & pulmone, quod in angina speciebus, quas ipse proponit, omnino negat. Nos autem hæc non ex Galeno, sed ex Aretæo proponimus; videtur tamen id etiam concessisse Hippocrates libro quarto de ratione victus in acutis, in quo quum similem ei, quam ad Aretæum habuimus, anginae speciem proponeret, tota illa dictione scilicet, nimirum a textu 31. vsque ad trigessimum quintum, inter cetera subiicit, pulmonem fuisse incensum, ceteraque signa eadem seime proponit violentam suffocationem, quam Hippocrates dicit Orthopneum, siccitatem multam, gracilitatem partium, vocem abruptam, seu abolitam, Galenus autem in comun. interpretans dictionem illam, *pulmonem incensum*, eum ardere constitutum, spiritus calidi suffocatione manifestè indicat, quum & talem anginae speciem ad melius conuerti idem ait Hipp. quum ad externas partes malū fertur, quod etiā de angina ex vitio spiritus scribebat Aretæus, vt simile admodum anginae genus ab utroque proponi appareat.

appateat. Manifestè tamen, & expresse, non à solo spiritus vitio eam fieri proponit Hippocrates, sed ex fluxione calida, ac nitrosa à capite astate, vel autumnò ad organa spiritus decumbente. Galenus autem in commentario eiuſdem in hoc genere adeiſſe inflammationem vult, ſed inflammatorias partes non videri, quod autem videtur, citra inflammationem exiſtere. Hæc de cuiſcemodi angina. Cæterum quod initio propolueraſimus, dæi anginam abſque inflammatione, colligatur etiam ex Cælio Aureliano, qui ſine febris eam eſſe teſtatur his verbis libri tertij Oxæon capite primo: *Cæterum cum febricula pſſimum euacuationem præſcripta tradimus libris: nunc autem earum, quæ ſine febribus eſſe noſcuntur, oſtendimus, quo cunctarum perfectiſſa deſcriptione complectimur; multum namque à ſynanchica paſſione ſumemus, &c.* Si autem angina ſine febre eſt, quæ ab internis eſſatu dignis inflammationibus vix, aut ne vix quidem ſeparari poteſt, vt ſine inflammatione ſit, omnino dicendum videtur.

In angina utrùm ſanguis mittendus uſque ad animi defectum. Græcorum, & Arabum ea de re opiniones. Hippocrates aduerſus Cælium deſenſus. Auicenna reſutatus. Hollerij ſententia de meſſura ſanguinis in animi deliquium reieſta. Galeni loca duo expoſita.

C A P V T XIV.

VT ſatis conſtat in angina ſanguinis detractiõnem eſſe neceſſariam, ita inſignitæ admodum copiæ, & ad animi vique defectiõnem mittere expediat, haud ita certa res eſt; Cuius enim plerique omnes negent, faciunt Auicennæ verba, vt ea de re quætere liceat; nec abeſt ratio etiam ex Galeno petita, qua eam fieri poſſe, nobis perſuaderi poſſe videatur. Proponam antea auctoritates, deinde rationem. Archigenes, vt reſert Aëtius libro 8. expreſſè à larga ſanguinis miſſione ſemel facta, & ab animi defectiõne cauet per hæc verba: *Auferre autem ſanguinem parè, non uſque ad animi defectiõnem; citius enim hi animo linguuntur; & alias ſanè ex refrigerationibus, & animi defectiõne, perfacile materia à faucibus ad pulmonem deſertur, & inevitabile periculum inferri.* Paulus idem cenſuit libro tertio capite vigeliſimo octauo *Reliquis autem [Synanchicis] ſanguis proxiſus è cubito mittendus eſt, & euacuanda multitudo, non ſemel, atque aſſatum, ſed ſapius partiis vreis, aſſeruantes, & cuſtodientes ſanguinem: Ex euacuatione enim cenſerim ſitiam in animi deliquia incidentibus agris, ſuffocatiõis periculum ſuperuenire, aſſatum conſuente*
mate

in uena ad patientem particulam. Appositè autem vsus est Paulus verbo *cauendum*, ut sanguinem veluti thesaurum esse indicaret, quod nos duobus conuerimus, *affirmantes*, & *custodientes*. Miror autem ab Andernaco in translatione non fuisse istud expressum; Aëtius pro eo vsus est *cauendum*. Non dissentit Trallianus, qui libro quarto capite primo ea de re ita scribit: *Ante omnia quidem angina laborantibus vena sectionem adhibere necesse est, non tamen uniuersam semel, partia enim euacuaciones ex ipsi afflicti locis causam magis subrahunt, quare serio etiam, & quarto sanguinem auferre oportet, totam animi defectionem euitantes*: Vocet enim siquid aliud his animi defectio, que sepe numero efficit ut affatim, & uniuersè in alium materia corruat. His addere licet, si momentum aliquod facit, Nonni auctoritatem, qui horum virorum doctrinam sequens ita scribit: *His itaque statim sanguinem deerrahere oportet, adhibereque euacuationem, non tamen uniuersam, ita enim animi defectione comprehensi suffocantur*. Cœlius Aurelianus libro tertio acutorum capite quarto, eandem sequitur opinionem: *gnalè tamen facit, qui Hippocrati contraria adscribens, eum hac de re reprehendit per hæc verba: Antiquorum Hippocrates libro quem ad sententias Cindius conscripsit, ex viroque oportere inquit brachio synanchico phlebotomare; sed hoc erit euitandum, si quidem conseruata sanguinis effusio animi, facit defectionem, & propterea prohibet tantum detrahi, quantum sufficiat ad relaxandum stricturnam*. At quid vetat, ô Cœli, ex utroque brachio sanguinem mittentes, animi defectionem, exiguum detrahentes, minimè inferre? loca vnde mittendus, ô Cœli, ostendit Hippocrates, quantitatè haud ostendit; & qui sanguinem diuidit, eum animi deliquium fugere, ex illis constat, quæ modò adduximus ex Paulo, & Alexandro. His autem quæ proposuimus, anne contraria scribere dicemus Aretæum, qui libro primo capite septimo, hæc de sanguinis missione in angina scribit: *Haud ignobile quoque adiumentum præstat, si ad animi usque defectum ægrym perduxeris, ita tamen ne animo deficiat: nonnulli enim sub vena percussa, ex animi deliquio perire*? Manifestè excludit Aretæus animi defectionem, quod & auctores superius nominati. Quid igitur est, quod vsque ad animi defectionem mittendum sanguinem tradit? an, ut quàm fieri possit proximè accedamus? periculofum enimuero consilium; quis enim extremos illos præfinitè limites ratione, ac nisi diuinando assequi possit? Hac etiam re à nominatis auctoribus dissentire videtur Aretæus, quod vna modò animi defectione exclusa, citra hanc, vel semel & affatim, quàm largissimè sanguinem detrahete videretur; non itidem Aëtius, qui ex Archigene parçè, & sobriè detrahit, & citra animi defectum longè facis, quod illa indicant, *citiùs enim hi animo linguuntur*. Nimirum id præcipit Aëtius. Largam sanguinis missionem in angina caueto, adeoque plusquàm in aliis morbis, aliis enim celestius, &

facilius hi animo deficiunt; tum verò aliàs ex refrigeratione, quæ etiam citra animi defectum contingit ob largam sanguinis missionem, timet defluxum materiz ad pulmonem, vnde inevitabile malum. cauet eandem largam semel sanguinis missionem Paulus, qui veluti bonus quæstor, sanguinis thesaurum asseruat, naturæque opes non cunctas simul, & ad prauos vsus effundit, copiosamque illam, & coaceruatam sanguinis deductionem adeò non prodesse dicit, vt etiam oblit; quippe ex refrigeratione corporis, ad fauces confluyente sanguine, augetur inflammatio, & suffocatio aduenit; cauet Trallianus, qui in triduum, & quadriduum diuidit, itaque magis salutare existimat: quippe morbi causam ex affectis locis ita magis subtrahi, contra ad illa confectim erumpere frequenter. Solam quidem animi defectionem videtur timere Trallianus, qui eam solam videretur excludere, sed timet etiam manifestè largam emissionem semel factam, à qua vix defectio separari potest; quippe exigua sæpius, quàm larga, pluribus collectum diebus conceditur. Interim enim natura & calor roboratur, nec ita vt lædat refrigeratio consequi potest. De hac re ita Græci. Inter Arabes Auicennas libro tertio sen nona tractatu primo capite vndecimo, contrariis verbis rem ita confudisse videtur, vt quid omnino sentiat non appareat; ita enim apud eum legitur: *In calida quidem oportet, vt incipiamur cum plebecimus, & non extrahamus sanguis plurimus subito, & propiè quum iam incipit virtus debilitari, imò sumam vni omni hora decima, & decima vsque ad diem tertium cum separationibus continui; si autem debilitari non incipit, tunc oportet, vt sine cessatione extrahatur sanguis, vsquequo appareat syncopis inforti, & oportet vt declinetur cum separatione versus conseruationem virtutis, & prætermissionem syncopis.* Primùm igitur, quod Græcos tres aut quatuor diximus tradidisse, non subito, nec semel multum sanguinis extrahit Auicennas, atque tunc id maximè facit, quum virtus incipiat debilitari: in virium enim imbecillitate auxilium diuidit, vt verba manifestè sopant; licèt ipsa particularis partitio, quam expresso etiam numero proponit, sit satis obscurè prolata, & mihi quidem valde ambiguum, quod ad illius explicationem affert Gradius; si autem vires constant, subdit Auicennas, semel & nullo interposito spatio sanguis detrahendus est, donec animi defectus appareat, quibus ea statim subiicit, quæ aduersari eisdem videantur; rursus enim partitis vicibus, & ita extrahendum sanguinem dicit, vt virium conseruandarum gratia, animi defectio euitetur. Id verò, ô Auicenna, rem confundere, & obscurare est, non docere est. Quod de viribus dicitur, superuacaneè proponitur, semper enim pro virium robore mittitur sanguis, virtute autem debili, non minus in aliis quàm hi, vel nihil, vel parçè, & per interualla sanguis detrahitur. Constante virtute quæro in angina quis modus sanguinis parçè, inquit Aërius, non assatim, nec vniuersè, sed per interualla Paulus, & Alexander: tu verò sine cessatione, donec appareat syncopis; At quomodo cum separa-

ratione (vt loqueris, aut potius vt loquuntur interpretes tui) quod illico subiiciatur? Haud ignoro Ioannem Costam cum primis eruditum, qui omnia Auicennæ dicta mordicus retinere, & approbare voluit, hæc ita accipere, tanquam animi deliquium excludat Auicennas, & Paulum amuletur, cuius verba nos superius adduximus. Enimuerò, vt primū dictionis Auicennæ membrum, excepto virium examine, de quibus nihil Paulus, quod nō erat necessē, idē est cū Paulino, ita reliquis nihil cū Paulo. Constat sibi Paulus, expressēque sententiam suam absque retractione aperit; Cauendum ne superueniat animi defectio; sanguinem igitur non semel, nec vniuersē emittēdum. Auicennas vult apparere syncopim; apparet autem quod est, quomodo igitur excluditur? an exclusa apparet procul per vitrum, aut cancecellos? Enimuerò, vel per hunc modum, suffocationem quoque augeat, & interitum afferat: nec aliam ob rationem in plures dies diuiditur auxilium. Periculosa scilicet hæc exigua interstitia, quod antea aduersum Aræzum proponebam. Non excludi, suspicionem etiam facit alius Auicennæ locus, qui scriptus est libro primo sen quarta, doctrina v. cap. xx. de phlebotomia, hisce verbis: *Luce in febris synochis non emus, si usque a syncop. m. perueniam, & s. p. incipio apoplexia, & in synantiis, & in magnis apostematis, perniciosi, & fratribus de oribus.* Hæc enim ex parte sumpta sunt de Galeni commentatio ad Aphorismum vigesimum tertium libri primi, quo loco, ad animi vsque defectum sanguinem mittendū esse cū dicat Galenus, in maximis inflammationibus, ardentissimis febribus, & vehementissimis doloribus, animi defectum minimē excludit, sed eum omnino fieri, & ad illam euacuationem sequi affirmat; quod etiam probabimus paulò post, idque vel maximē in synochis febribus, quas iungens anginae Auicennas, & de vtriusque idem proponens iudicium quod pertinet ad sanguinis missionem, sanè si illis conuenit adeò larga sanguinis missio, & huic similiter conueniet. Videret igitur Auicennas in angina hanc animi defectionem minimē improbasse, qua re cum ab Aëtio, Paulo, & Alexandro maximē dissentiat, ab Aræto non ita, qui licet defectionem excluderet, proximè tamen accedebat, vt eius sententia Auicennæ multò magis quàm Paulo fauere, apparere possit. Reliqui tres Arabes, Serapion, Rhafis & Haliabbas, Græcorum trium sententiæ ex toto subscribentes, eandem animi defectionem omnino fieri prohibent. Serapion duas ponit rationes, quarum alteram apud Paulum habuimus, quod ex sanguine semel, & vniuersum emissio, materia præceps agatur ad locum affectum, alteram apud Alexandrum, quod ita melius à loco affecto subtrahatur noxia materia; tum aliam addit, anginosi ob meatus angustiam à cibo prohibitis, non adesse vires quæ eam ferant sanguinis missionem. Hanc nos despiciamus, quippe querimus (diximus etiam antea) virtute haud renuente in angina

quis modus sanguinis. Rhafis ad finem libri tertij qui Continens inscribitur, in plures dies diuidit & ipse sanguinis missionem: ratio prima est, quæ & Alexandri, & Serapionis, ad materiam ex loco detrahendam, ita enim melius res succedit: altera à viribus, non quòd non ferant in præsentia, sed quia sit providendum, vt possint ferre quod postertius relinquatur, quum ex prohibita deglutitione non liceat per cibum virtutem restaurare: non igitur summè debilitandam ex adeò larga sanguinis missione. Iahabbas libro quinto Practicæ capite secundo eadem recinit, multum educendam sanguinis (si virtus, ætas, tempusque anni aduenerint) non tamen semel vniuersum, sed paulatim, & semel exiguum, ne transglutienti difficultas augeatur; ita præter vnum Auicennam sibi inuicem contraria proponentem, cauent omnes animi defectionem non solùm; sed largam etiam semel sanguinis missionem, præter Aretæum, qui defectionem proponens, quamquam non sic vt animo deficiat æger, non videtur eam adeò extimuisse. Hæc pertinent ad auctoritates. Dixi non deesse rationem ex Galeno petitam, qua in angina ex missione sanguinis animi defectio probaretur: afferenda ea modò nobis est ex commentatio ad Aphorismum xxij. primi libri, cuius etiam paulò antè meminimus. Scribit igitur Galenus eo loco, in ardentissimis febribus, in maximis inflammationibus, & vehementissimis doloribus vtile esse vsque ad animi defectionem sanguinem detraxisse. Si igitur maxima inflammatio est angina, ita sanè detrahendū. Antequàm ad argumentū respondēdo, illud cōprobo quod antea dixi me facturū, animi defectum illis verbis à Galeno ita intelligi, vt sit ipse, non vt propè absit (inclusiue inquam, si ita loquendum est, non exclusiue.) Non ignoro hanc Galeni opinionem fuisse ab Auertoe improbatam lib. 7. Coll. capit. 8. qui nunquam tentari debere a medico adeò periculosum auxilium existimauit, quod tamen necessarium, & salutare, si opportunè adhibeatur, nos existimamus, & Auertois rationes futes, quas tamen in præsentia dissolue non putamus è te esse, ab alijs etiam confutatas, & potissimum à Conciliatore differentia clxij. vbi hanc quæstionem examinat. Nos autem non de te in præsentia, verùm de Galeni sententiæ explicatione differimus, quem in febribus calidissimis, & summis inflammationibus, & vehementissimis doloribus mittēdum eò vsque sanguinem præcipere existimamus, donec in animi defectum incidat æger. Id autem puto facillimè colligi ex verbis quæ habet ille auctor in commentario proposito, quibus si animum aduertisset Brasauolus, nunquam dixisset profectò, animi defectionem excludi, quod scribit Brasauolus in commentatio ad Aphorismum tertium 1. lib. Galenus enim docens, qualis sit ea animi defectio, de qua loquitur Hippocrates, hanc affectionem distinguit, & aliam esse dicit ab ea, quæ fit ob merum ægroti: at si hæc sit adeòque, & includitur, non autem excluditur (quomodo enim diceret differre hanc ab ea, quæ ex euacuatione est, si non heret, quæ nulla esset?) fit etiam, &

succedit

succedit illa. Quin, iterum eandem distinguit ab ea quæ fit vitio suc-
 corum mordacium in ore ventriculi existentium; si autem hæc fit, cur
 non & illa similiter ad quam comparatur, & cuius discrimen proponi-
 tur? sed quid clarius illis verbis; *quæ igitur ratione evacuationis fit animi defe-*
ctio, nunc dicitur ab Hippocrate. Fit igitur animi defectio; quomodo igitur
 excluditur, quod est dicere non fieri? Nec verò ex hisce verbis tantum,
 sed illustri etiam exemplo à Galeno proposito liceat idem facillè com-
 probare. Ille enim libro nono methodi medendi, capite quarto, hi-
 storiam recitans adolescentis illius palæstritæ, febre synocha absque
 putredine laborantis, animi deliquium manifestè ex adhibita sangui-
 nis missione ei successisse scribit per hæc verba: *Aufero itaque ab homine*
eiusque de industria sanguinem, quoad animo liqueretur. Idem apparet ex
 alio loco eiusdem libri capite decimo, ubi quum doceret Galenus tali
 præsidio opportuno tempore, & debita mensura esse nobis utendum,
 idque nisi fieret, interfici à medicis ægrotos, quod duobus contigisset,
 quos in ipsis medicorum manibus interisse viderat, manifestè animi
 deliquium per hæc verba successisse scribit. *Duos igitur in ipsis medico-*
rum manibus periisse vidi, qui in animi deliquium ubi incidissent, haud am-
plius restituti sunt. Sicuti autem lipothymiam aut animi deliquium ex
 his locis à medico quærri apparet, ita syncopem cauci non obscurum
 est; quos enim memorat Galenus in medicorum manibus interisse, illi
 syncope apprehensi sunt. Est autem syncope præcepti virium lapsus,
 sicuti definitur à Paulo Ægineta libro tertio capite xxxij. animi autem
 deliquium ab ea differt, tanquam minus à maiori: vires enim in hoc
 non ita collabuntur, sed constant; quam differentiam colligere licet
 apud Alexandrum Trallianum libro duodecimo capite tertio. Nam
 cum de variis syncopes differentis, & causis egisset, tum de animi deli-
 quio, aut lipothymia suscepto sermone ita scribit: *Quoniam autem lipo-*
thymia, seu animi defectio: omnes syncopes inducemes ægris contingunt, viresque re-
pentè desiciunt, & cætera; quod habemus similiter apud Galenum lib. 1. ad
 Glauconem capite decimo quarto. Idemque colligitur ex eodem Galeno
 libro duodecimo methodi capite quinto ad finem. Ibi enim dum lo-
 queretur de affectu humorum crudorum, ab iis dicebat dum vel one-
 rant, vel obstruunt, syncopem inferri; si autem neutrum ex illis effi-
 ciant, non sanè syncopem inferre, sed quæ animi deliquia appellan-
 tur, Græcè *ἀποθυμία*; est autem *ἀποθυμία* idem quod *ἔκλυσις*,
 sicuti etiam lipothymia idem est quod *ἔκλυσις*, hoc est, exolutio, quod
 habemus apud Galenum primo ad Glauconem capite decimo quarto
 per hæc verba: *Qualis est lipothymia, & exolutio: nam consuetudine medici de*
una re hæc duo nomina dicere. Arabes autem ut Auerroëem, & Avicennam,
 voce syncopes pro lipothymia, aut animi deliquio, qualcuor affectus est,
 vltis videmus, quos malè secutus est Conciliator, qui hanc distinctionem,
 quia Græcæ linguæ ignarus accipere voluit, & syncopem, ac lipothymia

pro synonymis habuit, quæ ex locis propositis manifestò disident. Igitur ad lipothymiam deducendus æger est, ad syncopem non est. At quomodo inter secandum venam id cognoscitur, quâque notas habemus, adesse animi deliquium, ulterius tamen haud progrediendum, ne syncope subsequatur? Hollerius Hempanus in comm. ad Aphorismum tertium primi libri, scribit ad animi deliquium sanguinem mittere, apud veteres esse detrahere usque ad viginti quatuor vascula, ut vnumquodque vas capiat uncias tres, hanc autem sanguinis quantitatem, scribit paulò post complere sex libras mensurales; quas in acutissimis febribus eam sanguinis missionem requirentibus, detrahare posse aliquem ex Galeni consilio in libro de sanguinis missione itidem scribit ille Auctor. Absurda & ridicula sententia; est enim qui citra triuon aut quatuor librarum detractionem animi deliquio corripiatur, quod felici ægroti fortuna me expertum fuisse memini, dum iuuenem mulierem calidissima febris laborantem curarem, quæ ex ea larga sanguinis missione iugulata febre, illico conualuit, nec recidiuam passâ est: vnde tribus diebus (erat enim hic tertius morbi dies) absolutus est morbus, aliter per multos duraturus, quod pro certo habeo, fore ut sæpe contingeret, si ita copiosas sanguinis detractiones usurpare auderemus; sed nimium, & plusquam deceret, si non respondeat auxilium, deterret bonos etiam medicos infamæ timor. hæc obiter. Igitur præscribi, aut assignari certa sanguinis mensura vel pondus non potest, quo termino animi deliquium præsumè contineatur, magna enim sunt naturarum discrimina, multiæque in sanguinis abundantia hominum inter se differentia. Nec verò eum terminum præscribit Galenus, qui libro de curandi ratione per sanguinis missionem capite duodecimo, illud tantummodo affirmat, ubi feruescentis sanguinis inest plenitudo acutissimam accendens febrem, subito ac simul esse euacuandum plenitudinemque exhauriendam, etiam ad animi deliquium detracto sanguine, modò vires consent, vnde se meminisse, quibusdam sex detractas protinus cotylas, aut postidie, aut tertio, quatuor die. Cotylas sex interpretatur Hollerius sex libras mensurales, scilicet uncias mensurales septuaginta duas, quod ut aliquando factum est, ita sæpius cotyla accipere dicta est uncias nouem mensurales; nimirum hæc Attica fuit cotyla, quæ & medica sæpius, ita ut cotylæ sex non sint plus, quàm uncie sexaginta tres mensurales. At quomodo ait idem Hollerius ad finem commentarij: *Hæ autem sex libra viginti nostratua vascula continent*, si paulò antea dixit: *Est autem ad animi usque deliquium sanguinem mittere apud veteres, detrahare usque ad viginti quatuor vascula, ut vnumquodque vas capiat uncias tres*; cur hic quatuor vascula demit? an non inter veteres Galenus? an veteres alij à Galeno ea de re aliter senserant? qui verò hi? an alia, & alia vascula intelligit? sed cum de illis loquatur Hollerius utrobique, quibus in Gallia vtuntur, de ciisdem

de eisdem loqui apparet, non enim de antiquis, nisi apud veteres extiterint vascula, de quibus loquatur primo loco, quarum singula vncias tres contineat, quibus antiqui illi soliti essent sanguinem excipere, quod mihi quidem ignotum est. Sed & illud Hollerio faciendum erat, si rem definitè tradere volebat, vt cùm libræ, aut vnciæ mensurales quas proponit, non sint ampliùs in vsu, nec vasa illa cornea lineis intersecta, & distincta, quibus varios humores metiebantur antiqui, quorum vasculorum mentionem facit Galenus libro primo de compositione medicamentorum secundùm genera capite decimo sexto, & eorundem librorum capite sexto, vt ponderales quibus sanguinem vasculis exceptum æstimare licet, adscriberet: sunt enim mensurales à ponderalibus aliæ: quippe mensurales eadem in omnibus, quorum pondus æstimamus; ponderales autem iuxta corporis quod pondere æstimatur grauitatem, aut leuitatem varix; ponderales enim vnciæ grauitatem corporum, mensurales molem decernunt, vt scribit Galenus primo de compositione medicamentorum secundùm genera, cap. xij. Cùm autem Galenus aliquando, discendi cupidus quantum grauiatis pondus cõtineret olei libra Romana mensuralis, eam ponderasset, inuenit, sicuti scriptum habemus lib. vj. de cõpositione medicamentorum secundùm genera ca. viij. duodecim olei mensurales, decem vnciis ponderalibus æquales; quam eandem proportionem etiam alibi refert. Diligenter igitur rem appendere est necesse, si pondus sex cotylarum sanguinis, vbi ad mensurales vncias reducantur exactè habere volumus; quod tamen nos hoc loco importunum minimè faciemus. Sed redeuntes ad propositum dicimus, detractionem sex cotylarum sanguinis nequaquam fuisse positam à Galeno terminum definitum, sub quo animi defectio eneniret, sed ita aliquando corrigisse, se recordari: nimirum id in aliquibus obseruauerat, quod tamen aliquando etiam aliter accideret, vnde non semper ad hanc quantitatem detrahendus erit. Auicennas meliùs eandem rem designasse & præfinisse videtur libro tertio sen xj. tractatu ij. cap. viij. de signis syncopis; cùm enim ibidem nonnullas eius affectionis notas proposuisset, desumptas à pulsus compressione, inæqualitate, & paruitate, sanguinis fuga, coloris faciei mutatione, palpebrarum dimissione, oculorũ debili motu, coloris mutatione, hallucinatione, frigidityte extremorum, sudore frigido, nausea quandoque ac totius corporis quandoque frigidityte, subdit hæc. *Quum igitur incipit aliquid horum signorum post phlebotomiam, aut solutionem ventris, aut administrationem rei necessariò faciens lesionem, abstinetur ab ea, & renouetur causa, quoniam iam perducet ad syncopem, si non abscinda. vr.* Sane enim sicuti eadem notæ, aut magnæ aut paræ, eundem morbum, maiorem, vel minorem, debiliorem, aut vehementiorem ostendunt, ita vel lipothymiam, vel syncopem, quæ non nisi maioris & minoris ratione differunt, eadem notæ maiores, vel minores indicabunt. Paritur autem in anima

animi deliquio virtus tum animalis, tum etiam vitalis; quippe propriè cordis est affectus, tum animi deliquium, tum syncope. Indicat id lipothymiz nomen, *θυμός* enim ad cor pertinet, secuti *λεηνοθυμία* ad animales etiam virtutes eum affectum pertinere significat. Malè igitur existimauit Mena Hispanus, virtutes tantummodo animales affici, nimirum neruorum, & musculorum, quod ex Auicennæ loco comprobare conatus est, qui legitur libro tertio sen vndecima tractatu secundo capite nono hisce verbis: *Et scias, quòd casus virtutis quandoque perducit ad syncopem, & quandoque ad id quod est infra syncopem, ubi virtus non destruitur, nisi à neruis, & laceris ipsis existentibus ab ea vacuis, quare homo fit non motus, neque remouetur à suo situ, & statione, nisi cum labore; & causæ illius est accidens eius quod diximus. Nam cum vehemens sit, facit cadere virtutem integrè: & si non sit vehemens, facit cadere virtutem neruorum, & lacerorum.* Auicenna tamen hoc loco non loquitur de syncope, aut lipothymia, de quibus satis locutus fuerat capite præcedenti; sed de alio affectu, qui vt propriè pertinet ad caput, ita virtutem animale[m] lædit, ac tollit sensum, & motum, licet aliquando ita augeatur, vt affecta etiam vitali virtute, syncopem accersat, in qua virtus cadit integrè, id est, omnes virtutes, tum animales, tum vitales collabuntur: læditur autem & insigniter vis animalis in lipothymia, vt etiam pereat sensus, & motus, quod scribit Aëcius libro quarto capite 101. per hæc verba: *Differe autem animi deliquium à syncope, quòd animi deliquium derepenè incidit, sensu, & motu hominem priuans, & omnino non sudans, syncope verò, & vigilans, & dormientes inuadit, & omnino cum sudoribus, qui syncopitici appellantur.* Nec tamen ea virtutis animalis læsio ita est accipienda, vt semper sensu, & motu hominem ex toto priuet, aut destruat virtus neruorum, fit enim aliquando cum vehementior est lipothymia, non fit aliquando, cum non adeo vehemens, sunt enim in eadem lipothymia, antequam perueniat ad syncopem, gradus, quod & in me ipso, & aliis non semel vidi. Affici autem cor & virtutem vitalem, licet non æquè ac in syncope, apparet non solum ex voce seu vocabulo quod superius proponebam, sed etiam ex pulsu, quem variè mutari docuit Auicenna, quique notas illas exhibet, quæ, vt in syncope maximæ, ita in animi deliquio quod illam præcedit, exiguæ sunt; quam etiam rem in iis obseruare quotidie licet, qui animo linquuntur: sed expresse, & nominatim, si necesse est, illud affirmat Galenus comment. ad Aphorismū octauum libri septimi per hæc verba: *Commune autem est omnium raptionum exolutio, & animi deliquium, ob vitales spiritus excretionem, vt alibi ostensum est.* Et iterum comm. ad Aphorismum quadagesimum primum libri secundi: *Quicumque verò nulla tali de causâ sepius ac firmiter exsoluuntur, id ob virtutis vitalis imbecillitatem hoc patiuntur.* Exsolutionem autem idem esse ac lipothymiam antea diximus. Aduertendum autem, in Græco Aldino Codice pro illis quæ scripsimus τὸς ζῳτικῆς διαίτης, id est, virtutis vitalis, legi, τὸς ψυχικῆς διαίτης, id est,

id est, *vitalis animalis*, Leoniceum tamen legisse *ῥατὶς*, quæ vitæ vi-
ta, quam lectionem nos approbavimus, in eandem etiam repe-
rimus, exarata ad marginem eiusdem codicis Græci, quem habemus, in quo
est finita etiam aliæ, vulgaris meliores lectiones continentur, quæ non
leve aliquando auxilium afferunt. Sed & ex causis vnde lipothymia sit, illæ
evacuaciones, siue repletiones, aut dolores sint, quas distinctè perecutit
Galenus libro primo ad Glauco. capite decimo quarto, faciliè colligere li-
ceat, lædi ac debilitari vitalem virtutem. Er verò quid opus foret incisa
vena dum sanguis effluit, pulsuum mutationi, tanquam indicio haudqua-
quam mendaci, animum diligenter attendere, & è vestigio quiescere, pulsu
alio, ascente, seu in magnitudine, seu quavis inæquabilitate, quod præci-
pit Galenus libro de curandi ratione per sanguinis missionem capite de-
cimo quarto, si in lipothymia ex sanguinis detractiōe vitales vires haud
perirentur, nulloq; pacto concederet pulsacilis virtus, quod ait Hispanus
ille auctor? Lipothymia autem esse dicere, nervorum & musculorū imbe-
cillitatem, quid aliud est, quàm commune & perpetuum omnium ferè
morborum symptoma dicere? Ferè pudet ad eam rem tot argumenta
attulisse. Iam igitur ad argumenti ex Galeno propositi dissolutionem,
quod multò antea debebam, redeo post multa; Eo autem probabatur,
in angina sanguinè mittendum esse vtiq; ad animi deliquium, quod esse
summa inflammationi, in summis autem inflammationibus ea sanguinis de-
tractio conveniret. Respondemus, primum, non omnem anginam esse
summam inflammationem; quippe magnum & parvum, non speciem morbi,
sed magnitudinem, & vehementiam indicant: tum concedentes in pro-
posito casu anginam esse talem, ibique maximam subsistere inflammationem,
dicimus ratione affectus, qui adeo magnus est, convenire ei missionem
sanguinis vtiq; ad animi deliquium, sed esse quod impediatur, respirationis
difficultatem, quæ cum sit actio vitæ sic necessaria, ut exiguo admodum
tempore absq; ea perdurare viuis homo possit, primâ & omnium dignis-
simam præbeat indicationem. Docet autem Galenus lib. 7. methodi me-
dendi capite duodecimo, in complicatione affectionum, primum om-
nium attendendum esse, à quo maximè discrimen ægro impendere vi-
deatur. Igitur in summis inflammationibus, quatenus summa inflamma-
tiones sunt, & proprias exhibent indicationes, sanguis ad animi vtiq;
deliquium mittendus est; cum hoc tamen, ne id fiat, si aliquid impediatur.
At impedit in angina difficultas respirationis, quæ ex animi deliquio au-
geretur succedente ad eam largam sanguinis missionem, vnde illico ex
suffocatione interiret æger. Quare copiosius etiam liceat mittere, ubi mi-
nor est respirandi difficultas, cum quo tamen fiat magna angina vis, si-
cuti inflammatis pharyngis, seu faucium musculis; maxima autem re-
spirationis difficultate vigente, sicuti inflammatis laryngis musculis
accidit, ratione huiusce symptomatis quod cavendum maximè est, vtiq;

respiratio custodiat, largam semel factam sanguinis missionem, & animi deliquium declinamus, euacuationem potius patientes.

De purgatione in angina. Hippocratis loca duo ex quarto de ratione victus in acutis declarata, alterius vera lectio demonstrata aduersus Massariam.

C A P V T X V.

IN angina propulsanda maximè proficuum, atque adeò necessarium ille, sicuti venæ sectione, ita medicamento purgante confessum vti, scriptum habemus apud omnes propemodum de medicina auctores, Aretæum, Celsum, Galenum, Alexandrum, Paulum, & apud Arabes, Rhiasim, Autennan, & Mesuëni, quorum præcepta deinde alij, in medicina facièda admodum clari secuti sunt, usque ad nostra tempora pendè omnes; Alexander tamen Massaria Vicentinus insignis eruditionis vir, purgationis hunc usum adeò non confessit, ut vehementer damnauerit, & pestiferum existimauerit; & quoniam aduersariam existimabat se habere auctoris sententiam libri quarti de ratione victus in acutis, textu trigésimo, siue ille Hippocratis sit, siue alius, ubi in angina curatione medicamenta attractoria auctor ille proponit; idcirco eius loci auctoritatem, interpreter qui ea loca Latina fecerunt coarguendo, sibi conciliare conatus est. Nos qui de auxilij utilitate, tot auctoribus certi sumus, eius rationes aut proponere, aut expendere non laborabimus in præsentia; sed ad Hippocratis locum, in cuius gratiam hæc de Massaria dicimus, quædam adnotabimus. Mirandum autem est, Massariam, tanquam aduersarium Hippocratis selegisse locum, qui ex nullius quod sciam interpretis, Galeni cerrè sententia, haudquaquam eius opinioni aduersaretur, neglecta interim eiusdem Galeni auctoritate, qui expressè ac disertis verbis, non vno in loco purgationem in angina proponit, ut vole clarior res sit; Nam quòd non laboret Massaria de Alexandro & Aëtio, & similibus, ut ipse ait, ferri fortasse aliquo pacto possit, at Aretæum, Celsum, & Galenum quis ferat ita contineri? sed veniamus ad Hippocratis locum, quem excutere mihi institutum est. Dixi non aduersari eum Massaria ex interpretum sententia: quippe Latina Hippocratis versio ex Cornario, quæ passim legitur, non *metuens quibusdam attractoribus habet*, sed, *eclegmatum delectis in curant*, quomodo etiam conuertit, & locum exposuit Franciscus Vallesius, ita scribens, *et curam eclegmatum*. In Hippocratis quidem textu ad quem Galeni habemus commentarios, inter Galeni opera

opera à Iunctis edita, ex Vassii interpretatione ita locus legitur, quomodo adducit eum Massaria: quam versionem recepit similiter Hieremias Thriuerus, qui in eundem librum commentarios scripsit, ut facile fuerit Massariæ, in re tamen minimè necessaria, locum de ecligmatis, sicuti facit, non de purgatoriis accipere; nec tamen qui de attractoriis pharmacis locum exponunt, purgatoria medicamenta intelligunt. Galenus enim perspicue intelligit, vel de medicamentis acrioribus, quæ & fecare, ac in tenuia diuidere, ac tum glutinosa, tum crassa confringere possunt, nimirum ad gargarizandum exhibita, per hæc enim verba quæ habet Galenus in commentario, puto illa Hippocratis exponi, *ἀνὰ στήθεσιν ἐπιτίθει, id est, & calida exhibens gargarizantia.* Quod enim dixit Hippocrates *ἐπιτίθει*, id est, calida, acris intelligit Galenus, nimirum, quæ calida facultate sunt; etsi de iis quæ actu calefaciunt, Hippocratis verba vellet accipit Vallesius, Galeni fortasse non aduertens sententiam, aut ab ea vltro discedens; vel rursus, attractoria Galenus intelligit medicamenta illa, quæ externus collo apponuntur, cum scribit, *Πραττειν & ad externam suæ sicuti reuellere oportet, circumpositus collo, quæ attractoria pellant facultate medicamentis.* Vtroque autem modo, quæ de attractoriis scribit Galenus, accipi posse proposui; Nam cum Hippocrates, cuius verba exponit Galenus, tum attractoriis medicandum scribat, tum ceratum collo, & capiti circumponendo, dubium esse possit, vera ex his à Galeno intelligantur, quum ex Hippocratis doctrina vtendum attractoriis dicit; vtrique enim attractoria sunt & calida. At vtrouis modo accipiamus, de purgatoriis nescit quidem. Conspicuum tamen esse potest, legisse Galenum eo loco, non vocem quæ ecligmata, sed quæ attractoria significaret; quare si ab ea quidem voce tantum timet Massaria, nec in Galeni expositione sibi satis auxilij putat, nã illi alia procuranda est defensio. Quod enim tanquam nouum, multam enimuero ostentans Græcæ linguæ peritiam ait, scriptum eo loco esse *ἐκκλιματίζω*, quod est ab *ἐκκλίω*, id est, *lingo*, facile eueri possit; quid enim si leuissima immutatione dicamus legendum *ἐκκλιματίζω*? & verò ita legendum esse docet Galeni commentarius, qui de ecligmatis, aut linctibus, seu arteriacis ne verbum quidem, de attractoriis autem, Græcè *ἐκκλιματίζω*, plurimæ, vt vidimus. Volo tamen pro Massaria pugnare, & pro iis qui *ἐκκλιματίζω* receperunt; ita enim legendum, ex alio Hippocratis loco confirmari possit eodẽ quarto de ratione victus in acutis textu vigesimo primo, qui ita scriptus est: *Porro si angina fuerit, & si aliud quodpiam ex pleuritidis malum, ecligmati repurgato.* Respondere igitur sibi videntur loca; & verò ibidem non videri legisse Galenum apparet, qui de repurgatione quæ fit per sputa, Hippocratis locum expressè interpretatur. Nec verò ausim, vt supranotem, ita etiam hunc locum immutandum esse proponere, cum

deinde sic Galeni auctoritate, quæ contrarium potius suadet. Dicunt tamen, quod ex loci sententia & consideratione succurrit, aliter quàm Galenus faciat, eum locum exponi melius; & quod dicitur eclegmata repurgari, intelligi de medicamento purgante; Primum enim eclegmata, non tantum linctus, & atteriaca esse, sed alia etiam potionum genera, apparere potest ex Paulo Aegineta, qui libro 4. cap. xvij. ad lumbricos latos eclegmata apparet, cum tamen ad lumbricos non lambendo, vel lingendo, aut sensim deglutiendo, sic ut per asperam arteriam medicamenta deferantur, sed in ipsum protinus ventriculum delabi de re sit, si autem alia quàm atteriaca, eclegmatum voce, potionum, aut medicamentorum assumptorum genera intelligere possumus; quid videretur intelligi purgantia, si ad Hippocratis sententiam de eclegmatis, id est, linctibus seu atteriicis ineptus sensus, de purgantibus maxime accommodatus sit? Et verò rem ita se habere ostendo; nam cum Hippocrates eo loco universè in morbis magnis sanguinem esse mittendum proponit, de angina & placentiis malis particulatim loquens, aliâque proponens auxilia, scribit hosce morbos eclegmate esse repurgandos, quod si ægri imbecilliores appareant, vel plus sanguinis quàm oportet mitti tunc, clystima tertio quoque die infundendum. Vult igitur clystima eclegmati substitui, cuiusque vicem sustinere, si modò ægri vires sint debiliores; At verò quomodo clystinata debilibus conueniant magis quàm atteriaca, si clystinata vires reddunt debiliores, maiorem spirituum capiam eductentia? aut quomodo clystinatum vicem sustinere possint eclegmata, cum illa totum corpus, sed potissimum inferiora, hæc verò etiam quam quandam partem, & superius positam euacucent? Nec verò de atteriicis illud dici potest, maiores ab ipsis requiri vires, quod per spiritus viam fiat humoriseductio, quod absque virtutis animalis robore contingere non possit, quod multi medicinae professores aduertunt ad animam esse, prout a longinquo loco, ut à pulmone, aut thorace,eductio fit, at à gutturo, & faucibus adeò proxima via est, adeoque facili transitus, vnde minimo virium robore indigemus, si quidem per eas partes expurganda sit quæ anginam efficit materia, quod tamen cum vi contingat, de qua expurgatio vi à medicinis scriptoribus quicquam scriptum fuerit, præterquam loco de quo agimus, quæ de re etiam fuit à nonnullis Hippocrates, seu auctor ille reprehensus, ideo de purgatione, quæ totum corpus euacuatur, intelligi locum existimo, quam purgationem si non poterant præ imbecillitate ægri, clysterem substitueret, qui eandem humoris ipsorum, & per eandem viam, sed minori cum virium necessitate, carentem, & minori dispendio, purgantis medicamenti vicem gerit, quod in multis etiam aliis morbis, & ipse Galenus scribit, & alij de medicina auctores. Si autem de medicamento purgante hic locus accipiendus est, ubi eclegmata scribitur, multò magis de eodem accipiam locum alterum scriptum in tex. xxx. quem initio proposui, & quo attractoris etiam medicandū proponebat

proponbat Hippocrates, si quidem lectionē Galeni sequimur, qui etiam purgant. attamen vi purgant, ut ex Galeno in primis notum est. Cuius ibi vetustissimus auctor omnia ferē auxiliorum genera ad anginae curationem proponat, quare auxiliū adeo efficax, aut potius summē necessarium prætermisisse dicamus? Non igitur ἰαλκτικῶσι legendū, qua voce nitebatur Massaria, sed ἰαλκτικῶσι ex Galeni commentario, quod si sit, iam non de arteriacis, sed de purgantibus totum corpus, locus merito accipendus videatur; quod etiam dicimus, si legatur ἰαλκτικῶσι, & eodem modo accipendus alter, in quo eclegma absque controuersia scriptum est. Cū hęc scripsissem, consului Aldinæ editionis codicem Galeni Græcum quem habeo, ad cuius oram calamo exarata penē infinita sunt locorum variæ lectiones, cuius libri antea quoque mentionem feci: erat autem ex illis vna hæc: nam pro ἰαλκτικῶσι, repositum erat ἰακτικῶσι. Ego autem mirificē letatus sum, quod coniectura assecutus fueram, cuius codicis auctoritate confirmari, nec lectorem ea de re celare volui.

De laryngotomia, seu gutturis sectione in angina. Pauli locus expensis, & declaratus. Veterum, & recentiorum ea de sectione opiniones. Aretæus refutatus.

CAPVT XVI.

SCITA est Hippocratis sententia primo libro Aphorismorum scripta, extrémis morbis extrema conuenire remedia. Inde cum in venæ sectione, aut purgatione nihil fuit auxilij aduersus malum, ad ferrum & ignem confugiunt Medici, quæ auxiliorum ellē extrema idem vetustissimus auctor memoriæ prodidit. Fuerunt autem sectiones, & vsiones magis vsitata temporibus antiquis: quippe earundem vsuni, ut credibile est, meliūs nouerant, & audentiores erant antiqui: secabant enim, & vrebant non solum hydropicos, pleuriticos, & purulentos passim, sed in vatus capitis affectionibus, summa cum utilitate temporum arterias, multasque alias partes variē, ut legere licet apud Paulum libro sexto, & apud Albucasim, quarum partium sectiones hodie penitus omisse sunt. Inter has synanchicorum sectio fuit, de quibus solis in præsentia quadam addere libet. Dicebatur hæc operatio ὑπογγοτεμία à Græcis, & Græco similiter nomine laryngotomia dicitur à Cælio Aureliano, medicinæ Latino scriptore lib. tertio acutæ passionum cap. quarto, scilicet laryngis, aut supremæ gutturis partis sectio. Hanc antiquissimam fuisse ex eodem Aureliano discere licet, qui Asclepiadem refutat, eam tanquam a veteribus acceptam approbantem. Hoc Asclepiadis placitum legimus etiam in libro, cui

ctor non paulum Aegineta antiquior. Ille enim libro quinto capite septimo ea de re ita scribit: *Quicumque autem strangulationem, quæ ab angina canenies, quo laxius spiritus duceretur, arteriam secue ut, non sanè experimento rem comprobasse videntur. Nam & caliditas inflammationis maior ex vulnere efficitur, & strangulatum adauget ac infirmum commuet.* Quin etiam si aliqui periculum id euaserunt, vulneris ora in unum coalescere nequeunt, amba enim cartilagineæ, atque inter se inzulcinabiles sunt. Improbauit eandem sectionem Cælius Aurelianus methodicæ medicinæ scriptor Latinus, qui & Alecepiadem ea de re libro tertio acutarum affectionum capite quarto reprehendit. Cùm enim illius opinionem tanquam à veteribus ductam proposuisset Aurelianus, paulò post eam refutans scribit: *Est etiam fibulosa arteria ob respirationem diuisura, quam Laryngotomiam vocant, & quæ à nullo sit antiquorum tradita, sed caduca, atque temeraria Asclepiadis inuentione affirmata, cui ne nunc occurrentes, Latini respondere videamur, aut tantum seclus angustia oratione damnemus, libris quos de adiutorio sumus scripturi, respondebimus.* At Arabes omnes eandem receperunt. Rhasis enim tertio libro continentis capite septimo scribit, se vidisse Ancilifium quendam medicum ea curatione utentem, rationemque sectionis & ipse proponit, quam tamen non esse usurpandam nisi sub ipso extremo vitæ discrimine affirmat; tum iuxta Pauli sententiam, hoc curationis genus euitandum esse dicit, quæ tamen in re deceptus est, ut antea ostendimus. Auenhoar libro primo tractatu decimo capite xiv. eiusdem sectionis summi gutturis meminit, quæ tamen se nunquam usum fuisse dicit, quod admodum difficilem existimaret, nec vnquam ab aliquo ea tempestate in usum reuocaram vidisset: fieri tamen posse scribit, incisionemque debere esse ad quantitatem foraminis naris, aut parum minorem; id respexit ut puto Auenhoar, quod respirationis gratia facta incisione, quæ naris vno foramine fit, sufficiat ad vitam, & quoniam erant qui dicerent, Galenum eiusmodi incisionis nunquam meminisse, eos mentiri scribit Auenhoar, meminisse enim Galenum ex loco quo etiam incidere siphac, id est, abdomen præceperat. Ego tamen huius loci nullam habeo notitiâ. Subdit Auenhoar voluisse se incisionem experiri in capra, cuius in aspera arteria incidit corium, & pelliculam, nimirum membranam quæ subtus posita est, & de ipsâ aspera arteria seu canna pulmonis, ut ipse dicit, aliquid minus lupino: tum ablato quotidie vulnere aqua mellis, & insperso puluere astringenti, fuisse capram sanitati restitutam. Cum hoc tamen, quia neminem viderat, qui ea curatione in anginoso usus esset, primus instituere eam minime voluit. Eandem gutturis sectionem habemus apud Auicennam lib. 3. sen nona, tractatu primo capite xj. quæ utendum esse ait, quum anginæ sunt vehementissimæ, & nihil proficiunt medicinæ, & certa creditur futura perditio, ut ipse loquitur, aut eius interpretes. Docet autem modum sectionis, nimirum scin-

de illa illi. Hæc itaque sunt inter duos annulos canine, ut ibidem
 dicitur, & cetera, quæ apud ipsum videre est, quem modum legitur
 etiam apud Rhazim. Alphanianus tractatu xj. cap. tertio eandem præbat,
 ubi reliqua auxilia nihil profuere, quod in libris chirurgiæ se de re in-
 nasse scribit: Albucasis parte secunda chirurgiæ, capite quadragésimo
 tertio, hanc eandem, ut multas alias nostris temporibus multis confu-
 tas & ceteras proponit: non admittit autem semper, sed Pauli Aeginetæ
 verbis recitatis, nomine omisso videtur eam improbare, cum eodem mo-
 do ac Paulus probet, referens ad finem capitis historiam ancille cuiusdam
 quæ gladio, inflicto sibi in guttur vulnere, partim gutturis incidit, quæ
 tandem sanitati fuit restituta. Apparet igitur falsum esse quod Aretæus pro-
 ponebat, vulnus in gutture non posse glutinari, quippe & Albucasis in
 ancilla, & Auenhoar in capra fuisse glutinatum affirmant. Docent au-
 tem, qui modum sectionis præscribunt, non esse cartilagineas absconden-
 das, sed vinctula quædam membranosa, annulos illos alterum alteri col-
 ligantia, quod nominatim ex Avicenna superius propoluimus. Hæc de
 eiusmodi sectione ex auctoribus antiquis. Inter recentiores approbantes
 multi, aliqui etiam in usum reuocauerunt. Scribit enim Hollerius Scuti-
 panus libro primo de morborum curatione capite vigésimo tertio in
 scholio, quum quidam ægrotus angina suffocaretur, iussisse sibi absen-
 tem medico gurgulionis finem amputari, & seruatum fuisse. Ioacchinus
 Empiricentis in conuentario ad librum nonum Rhazis ad Almanzor em
 capite de angina, post multa proposita remedia, ea de re ita scribit: *Poste-
 rius in desperatis remedium est arteria aspera incisio, quod etiam veterum inuentum fuit:
 etate nostra, quod sciam, factum non est; quomodo autem fieri debeat, optimæ
 declarant, & est citra periculum, interim enim aut resolvitur prorsus, aut ad sup-
 purationem venit, & liberantur.* In his tamen non possum approbare, quod
 dicit Ioacchinus, hanc sectionem esse citra periculum, quæ ab antiquis scilicet
 auctoribus, ut vidimus, maximè timetur, & præsertim ab Aretæo. Et verum
 quomodo possit esse citra periculum, quum & vasa insignia sint admo-
 dum proxima, quorum incisio periculi plena est, & difficile glutinari
 possit vulnus? non est tamen eiusmodi, ut in extrema necessitate non sit
 tentanda, quod iidem antiqui auctores præcipiunt. Similiter quod subicit
 Ioacchinus: *Interim enim, vel resolvitur prorsus, vel ad suppuracionem venit, &
 liberantur,* quid valeat nescio; non enim sectio illa aut ad resolutionem,
 aut ad supputationem quicquam facit, sed ad respirationem solam ad-
 iuuandam, quæ cum sua & consueta via fieri non possit, nouus aditus
 incluso spiritui est aperiendus. Brasauolas in conuentario super quartum
 librum de ratione victus in acutis, testatur se cum sapientius quidam che-
 rurgus non auderet in anginoso iam mortis propinquo, eam sectionem
 aggredi, propriis manibus ægroti guttur dissecuisse, quod & in aliis
 pluribus felici cum successu se tentasse scribit. Antonius Bonaventura
 Florentinus in libro de abditis morborum causis, non quidem guttur
 dissecuisse,

dissecuiss, sed aëginoso ab aliis medicis omnino derelicto, & cuius erat desperata omnino salus, iamq; funeri destinato, adhortantibus etiam illi qui aegrotos adstabant, locum sub ipsis maxillis, ac etiam supra collū, alioribus plagis incidisse scribit, ex quo quum sanies multa prorupisset, ad eò morbum leuatum esse scribit, vt faucibus ipsis spiritū simul & cibum capientibus, facili deinde ad bonam valetudinē daretur recursus. Hæc autē plagarum infectio altē sub ipsis maxillis & supra collum, proposita etiam fuit à Celso libro quarto capite quarto, non tamen guttur attingit; aut ipsum vulnerat. Hæc igitur, quæ alioquin nonnullis temeraria videri medicina possit, tot virorum auctoritate possit à nobis in desperatis anginosis cum ratione tentari. Nec deterrent Aretæ rationes. Quippe de vulneris glutinatione iam exemplis res est comprobata. Quod autem scribit ex vulnere augeri caliditatem inflammationis, augeri strangulationem, & oboriri tussim, respondemus, haud esse credendum, ex sectione augeri caliditatem inflammationis effuso sanguine ex partibus inflammatis, aut ei proximis, in quo sanguine posita est caliditas; tum quantumvis ea augetur, præstat adhuc, vel cum incremento caliditatis incluso spiritui aditum patefacere, ex eo præpropera imminente morte, quum caliditati incolumi, vita aliis deinde ingeniis prouideri possit. Augeri autem strangulationem, ô bone Aretæ, concede vt tibi non credam, quī enim hoc fiat, si referatur aditus spiritui, qui antea erat clausus? & licet quantumvis fingas ex vulneris dolore, aut etiam calore, sanguinem confluere ad locum inflammatum, semper enim data porta ingreditur, & egreditur spiritus. Quod verò de tussi adiiicit, neque locum habet: non enim sectio impedimentum aliquod cursui spiritus apponit, vt tussis excitetur: quandiu autem per viam læuam & æqualem spiritus fertur, nec aliquo offendit, tussis non est; exit autem spiritus, cum ad vulneris foramen peruenit.

Sanguis spumofus unde feratur. Qualis ex neceffitate à pulmone. Qualis ab alijs partibus. Locus Hippocratis ex Coacis prænotionibus declaratus.

C A P V T X V I I.

Nter sanguinis indicia à pulmone excreti, præcipuum quod obferuatur ex Hippocratis Aphorismo tertio decimo libri quinti, fuma eft. Duo autem hic quaeruntur. Alterum: vtrum quicumque a pulmone reieciatur fanguis, ille fit ex neceffitate fpuhofus, nec nifi euifmodi ab eo reieci poffit; vt fic argumentari liceat, non eft fanguis fpuhofus, igitur non eft à pulmone. Alterum: vtrum quicumque fpuhofus eft, ille fèper, & neceffario fit à pulmone, vt fic colligere poffimus, Sanguis eft fpuhofus, igitur à pulmone. Ad primum refpondet Galenus in Tommentario Aphorifmi propofiti, atque etiam commentario ad Aphorifmum xxx. libri feptimi. Non verè dici, vlcato pulmone ex neceffitate fpuhofum fanguinem expui, poffe quippe etiam non fpuhofum ex pulmonis vulnere prouenire: dicimus autem in præfentia vulnus, quod vlcus dicit Galenus, quia eo nomine verè vulnus magis quàm vlcus intelligi hoc loco Galenus, vt paulò poft liquidò patebit. Dictum probat Galenus experimento: fe enim vidiffe fæpius, quibufdam ab alto cadentibus, aut calce petitis, aut percuffis in paleftra ea ictus forma, qua altera ad fe lum ruenti, aliter fuper pectus incidit, fanguinem plurimum eum tuffi optimè coloratum, abfque vilo dolore excretum, quem ratio dictaret, ab aliquo pulmonis vafe difrupto prodire. Ex his colligitur, nomine vlcus, vulnus paulò antea intellexiffe, ad valorem enim raptionem pertinet potiùs vulnus, quàm vlcus. De fanguine autem fpuhofo, eodem commentario agens Galenus, ac etiam commentario ad Aphorifmum trigefimum libri feptimi, fcribit prodire eum de carnofa pulmonis fubftantia, quod eft ipfius proprium corpus, atque adeò de ipfius vifceris propria carne aliquid inde fimul auferri, cuiusque vlcus ideo indicari, qui verò abfque fuma prodire dictus eft de pulmone, fanguis ille de venis eft pulmonem nutrientibus. Pulmonis enim corpus leue exiftens, rarum, & veluti ex fuma quadam fanguinea concreta conflatum, ficuti fcribit Galenus vi. de vfu partium capite decimo, vbi ex fe aliquid emittit, tale enim uero, hoc eft, rarum, & fpuhofum, apparere neceffe eft: fed qui ex venis additur, quanquam tenuior, leuior, & magis vaporofus fit, quam qui in alijs venis, non eft tamen ficuti ille qui de fubftantia vifceris aufertur, fpuhofus. Ita qui de fubftantia, & carne pulmonis emittitur, ille ex neceffitate eft fpuhofus, qui autè de venis, non talis. Eandem doctrinam

de Galeno, ut credere par est, desumptam, habemus apud Auicennam capite de spu sanguinis, ubi sanguis de substantia pulmonis excretus, spumofus proponitur, de alio autem, qui ex venis, dicit eum non esse spumofum. Hæc vera cum sint, indigent tamen aliqua distinctione. Quippe ex pulmonis vasis etiam aliquo pacto spumofus prodire potest sanguis, quæ res in alterius quæstionis explicatione patebit vberius, quam iam aggredimur. Quærebamus igitur, num spumofus sanguis aliunde etiam quàm ex pulmone offendi possit? Respondet autem similiter Galenus eodem libro quinto Aphorismorum xij. solius pulmonis vlcera à spumoso sanguine indicari, ut bene colligere liceat, Sanguis est spumofus, igitur à pulmone, quod alij etiam de medicina auctores affirmare videntur, præsertim Arabes, ut Rhafis, Serapion, & Al-saravius, qui sanguinem spumofum vulnerari pulmonis indicium proprium proponunt, & Galenus quinto de locis affectis, eum sanguinem efficacissimum signum eius rei esse dicit. Verum non caret difficultate, & controuersia hæc responsio. Nam idem Galenus commentario ad Aphorismum trigelimum libri septimi scribit, eos qui morbo laterali laborant, aliquando spumofum expuere, licet raro, & eos etiam, quamquam rarius, qui pulmonis inflammationem patiuntur. Et Auicennas etiam, hoc idem ex spuma signum sanguinis de pulmone excreti cum proponit, tanquam non soli pulmone conueniret, addit & ipse: *Et quandoque expellunt spumofum pleuretica, & peripneumonici.* Præterea qui ex pectore educitur, eundem cum spuma esse dicit, & qui ex aspera arteria, per hæc verba, *& quandoque est spumofus ex canna pulmonis,* quod etiam habemus apud Aretæum, ac Paulum. Postreum Hippocrates in libro de Coacis prænotionibus, de hepate spumofum prodire scribit per hæc verba Latine: *Quicumque sanguinem spumofum spuum, dextrum præcordium dolentes, de hepate spuum, & multi pereunt.* Primum dico, quod pertinet ad cognitionem affectus rem non esse difficilem, quæ enim propositæ sunt ex membrana succingente costas in pleuritide, aspera arteria, thorace, & iecinore sanguinis reiectiones, illa ut alia indicia ab eisdem auctoribus comprehensa omittantur, cum dolore plus minus sunt; at de pulmone absque dolore, quod testatur Galenus eodem commentario ad Aphorismum xij. libri quinti, sed ex Hippocratis, Galeni, & Arabum dictis obortam difficultatem hæc ratio non expedit. Quippe nil aliud intuentem, ita ex illis Auctoribus ratiocinari licere diximus: spumofus est sanguis, igitur à pulmone. Si verò aliunde spumofus prodeat, ut ex membrana succingente, aspera arteria, thorace, atque iecinore, iam ita malè colligatur. Hollerius Stempmanus adeò certum putauit ex auctoribus recitatis, spumofum sanguinem affecti pulmonis esse signum, ut in commentario ad locum allatum ex Coacis prænotionibus, sententiam illam tanquam minus dissimilem non acceperit, sed potius damnauerit. Sed quando, & hic ex Coacis locus nostris sit sustinendus, & alia præter eum

sint adducta, omnibus ut satisficiamus eritendum est. Non incommo-
dè igitur rem totam mihi distingere videtur Gentilis, cuius senten-
tiam video etiam secutos recentiores clarissimos, & eruditissimos vi-
ros: quare utile esse putavi de re adeò necessaria eius opinionem totam
comprehendere. Scribit igitur eruditissimus hic Auctor sanguinem
de substantia pulmonis emissum, necessariò esse spumosum, quippe
non dissimiliter affectus est sanguis pulmonis ac substantia ipsa pulmo-
nis, inde sequitur eum ex necessitate esse spumosum: sicuti enim in
pulmonis substantia aër, & vapores continentur, minimis particu-
lis diuisim minimis anfractibus spongiosæ carnis pulmonis, eodem
modo sanguis in substantia pulmonis diuiditur & spumescit. Verum-
tam non potest etiam sanguis, ex aliis quoque corporis partibus per
os redditus, esse spumosus: qui enim per hanc partem commixtio-
ne saluæ egreditur, potest apparere spumosus duabus ex causis. Al-
tera est, mixtio aëris, non enim potest ab illis regionibus venire, ni-
si socio aëre, cuius impetu extrà fertur, commixtus autem aër; &
minimis particulis diuisus spumam efficit. Altera causa est, quia fieri
potest, ut vehemens calor in partibus respiratoris coniungatur, si-
cuti cum in pleuritide ea peripneumonia expulitur sanguis, huius e-
nim feruore fit spuma, velut in viridi spumoso sputo, quod pro-
ponitur libro secundo Pronosticorum, commentario quarto, sed
hoc non est perpetuum, licet frequenter contingat. Non enim pro-
prie spumæ semper concurrunt: nam calor igneus rarò, aëris au-
tem vicinia & societas non reddit sanguinem perpetuò, & ex ne-
cessitate spumosum; fieri enim potest, ut sanguis sit adeò viscidus
& crassus, ut ab aëre socio non possit diuidi, nec ideo spumescere.
Hinc fit, ut cum breui itineris, temporisque spatio socium se præbet
sanguini aër, contingat & non contingat esse spumosum, sicuti cum
mittitur ex aspera arteria, quare cautiè dixit Auicenna, *& quandoque
est spumifus ex canna pulmonis*; qui autem sanguis à pectore redditur,
longo itineris spatio socius aëri est, frequentiusque ideo contingit
esse spumoso, & rarò fit, ut spumam aliquam non habeat, & ideo
absolutè de eo dixit Auicenna: *est cum spumofitate quadam, & spuma.*
Tum proponit Gentilis, quod propriè pro locorum conciliatione
querimus spumæ carnis pulmonis, & aliarum partium diuersitatem.
Dixit enim Gentilis multum differre spumositatem in sanguine qui est ex
carne pulmonis, à spumofitate sanguinei venientis ab aliis quibusdam
partibus: Primùm quidem ratione formæ, & habitus ipsius spumæ,
spumæ etenim, quæ in sanguine apparet veniente à substantia pul-
monis est minuta, profunda, infinitisque penè bullis distincta per
vniuersam sanguinis substantiam, ut sanguis ferè vniuersus videatur
quædam spuma, tum ratione coloris, qui ad albedinem quandam in-
clinare

clinare videtur, idque ob duas causas. Altera, quoniam iam aliquanti spei casedit à forma sanguinis, ac tendit ad formam humiditatis fecundae. Altera, quod aer imis partibus ei commixtus reddit ipsam magis lucidum, id enim aer sua natura efficit. At si sanguis ab aliis partibus effundatur, non erit per eum modum spumofus; non enim spuma imis illius partibus sic inhaerefcit, nec minutis illis bullis ita distincta est, cum in sanguine non sit aer per singulas quasque minimas particulas ita diuisus, sicuti in eo qui in carne pulmonis continetur. Subiicit postremam Gentilis, raro contingere spumam sanguinis de carne pulmonis excreti, quin sit ei etiam iunctum sputum sanguinis ex vena in eodem viscere dissoluta, sicuti etiam, neque hoc abique illo, quanquam estimatione hoc frequentius contingere posse videatur, sanguinem à vena sine carnis solutione prodire. Hæc omnia à Gentili proposita sunt. Cuius sententiam præsertim de spumæ diuersitate, vel ex pulmonis carne, & substantia, vel ex venis delati, secutus est Thomas Rodericus à Veiga in commentatio ad caput sextum libri quarti de locis affectis, vbi Galenus, sicuti diximus, spumam proponit esse efficacissimum signum sanguinis de pulmone excreti; Rodericus tamen spumæ tres veluti gradus constituit per hæc verba: *Alterum caput agnoscit curaturo sumnoperere necessarium, separare thoracis sanguinem ab eo, qui affecto pulmone produci; vocat autem efficacissimum pulmonis signum spumam: Et quod magis miremur in Aphorismo habet; si spumofus est sanguis, è pulmone prædit, si ex pulmone non semper spumat, nempe ubi ex vasis produci, quæ non sicuti cohaere videntur cum eo, quod legimus ab Hippocrate, in plurimide nonnunquam sputum spumans videri. Et Paulus ex gutture spumofum sanguinem prædicare docet, propter commercium respirati aeris; Et Auicenna ex pectore ob eandem spumam causam, sed aliud est, nonnihil spuma permixtum educi, quod in illis casibus apparet, alius ex toto spumescere, quod solius substantia pulmonis proprium est. Ita possunt tres spumæ veluti gradus in excreto notari sanguine, aut enim omnino spumans est ex visceris carne, cuius induit similitudinem: est enim pulmo coagulata spuma, aut plurimum spumans è pulm. nis vasis, aut spuma permixtus ex thorace ipso, & gutture. Hæc fere à verbo secutus est Iacotius in commentatio ad locum ex Coacis recitatum, cum enim controuersiam proposuisset, & vtriusque sanguinis distinguentes aliquas notas anrea comprehendisset, tunc pro locorum conciliatione de spuma ita scribit: *Quod ad spumam verò pertinet, undecumque finiat, nonnihil spumæ permixtum habere potest, ex viscida, & aeris substantia secum mixta: At ex toto spumescere solius substantia pulmonis proprium est. Itaque relictissimè spumam in tres veluti gradus distinguant. Nam cum leuiter spuma permiscetur sanguis, ex gutture, thorace, hepate prodire præst, cum verò plurimum spurpat, è pulm. nis vasis effunditur, cum totus spuma est ex visceris carne, cuius induit similitudinem:**

rudinem: Est enim pulmo, veluti coagulata spuma. Hæc manifestè Iacorius à Veiga sumpsit, sed vt Veiga Gentilis nomen subtrahit, ex cuius penu sua locupletabatur, ita iure Veigæ nomen à Iacorio est suppressum. Nos autem sua unicuique reddere probi viri munus esse putantes, cui illa deberentur palam fecimus. Atque hæc quidem ab illis Auctoribus per eum modum & optimè dicuntur, atque ex spumosi sanguinis varietate inuicem conciliantur: at verò Aphorismi tertij decimi veritas, alia etiam ratione sustineri fortasse possit. Quippe omnem spumofum sanguinem, præter eum qui est ab aspera arteria, qui supra pulmonem est, à pulmone ferri dicimus, vel mediatè, vel inuariatè, vt loquuntur; qui enim à membrana succingente costas, à thorace, & ab hepate fluit, non funditur quidem à pulmone primum, sed cum ipsi per pulmonem via sit, ab eo etiam fertur, vt non falsa dicat, qui dicat eum ex pulmone ferri. Et Aretæus quum sanguinem de thorace excretum, minime spumantem esse proposuisset, subdit: si autem & pulmo, ex transitu sanguinis simul patiat, aliquid spuma consequitur, via enim ex thorace in arteriam per pulmonem est; tanquam spumam trahat ille sanguis à pulmone. Eadem portio tandem via pergit etiam, qui à succingente membrana, ea à iecinore prodit; hic enim per venæ causæ rami in dextrum cordis ventriculum, tum in pulmonem ascendit. Solus non attingit pulmonem, qui ab aspera arteria fluit: at verò hæc cum pulmonis meatu sit, pulmonis nomine si eam comprehendamus, iam spumofus omnis sanguis qualiscunque est, ille à pulmone erit, quod per Hippocratis Aphorismum vniuersè dicitur.

De Rheumate, Catarrho, Influxione, & distillatione; Alcomarij lapsus. Duo Galeni loca ad catarrhum pertinentia, malè de Græco versa, emendata. Argenterius notatus.

C A P V T XVIII.



PROPRIAM in hoc capite quædam pertinentia ad catarrhum seu distillationem, ex quibus occasio erit emendandi duo Galeni loca, alterum lib. tertio Aphorismorum duodecimo, alterum libro tertio de causis symptomatum capite quarto, quorum ille à Leoniceno, hic à Linacro ita conuersi sunt, vt falsam sententiam continere videantur. Igitur duo sunt nomina, seu duæ voces apud Græcos medicos, sed potissimum apud Galenum, cuius doctrinam proponimus priuam & va-riam, quibus apud Latinos fluxio, & distillatio respondeant, licet aliquando fuerint confusa, vt

oscu

ostendimus. Sed Græcas primùm voces, quibus iam satis nostrorum etiam medicorum assuetæ sunt aures, explicabo; de Latinis deinde dicam. Igitur Rheuma significat vniuersè omnem motionem cuiuslibet humoris, à qualibet parte nostri corporis ad quamlibet, vnde & à Galeno dicitur aliquando ῥῆμα ἢ ὕδρῳ, id est, *assuxio humoris*: Catarrhus autem particularis quadam fluxio est, particulari inque ad affectionem, seu morbum, seu symptoma magis propriè indicat. Igitur ex rheumate omnis ferè morbus est, in materia quæ mouetur positus, vt inflammatio quælibet, cuius potissimùm occasionem esse rheuma, expressè scribit Galenus secundo ad Glauconem capite secundo. Morbus etiam articularis, tumores, & abscessus cuiuslibet partis, à rheumate rectè fieri dicuntur; non ita à catarrho, si Galeni doctrinam sequimur. Amiceinas tamen, seu eius interpretes, ita sensisse visus est, Catarrhum appellans omne genus rheumatis, libro enim tertio sen secunda, tractatu primo capite xi. anginam & pleuritidem, & peripneumoniam à catarrho pendere dixit, sicuti etiam libro primo generatim catarrhum vocari scribit omne genus apostematis, cuius causa corporalis, (vt loquitur interpret) monstrat materiam de vno membro ad aliud, quod est sub eo. Et ita acceperunt etiam nonnulli auctorum nostrorum memoria, Arabum doctrinam secuti, sed illam rheumatis è catarrho distinctionem, vel etiam à Platone colligere liceat, qui libro tertio sen republica sub persona Socratis, rheumata & flatus, tanquam generales morborum causas proponit, catarrhos autem, & inflationes tanquam ab iisdem productos particulares morbos: quæ etiam catarrhi, & inflammationis nomina, noua & portentosa ibidem esse dicit; ex Timæo etiam illa distinctio appareat, vbi ῥοιῶν καὶ ῥευμάτων, id est, *catarrhales morbos*, ab acida, & salia pituita, veluti à fonte pendere dicit, cum ex rheumate orti ad alios etiam referantur humores; sed nos Galeni videamus opinionem. Galenus igitur catarrhi nomine solam ex capite fluxionem intellexit; & hæc omnium maximè communis significatio est: hæc autem fluxio aliquando per venas fit ad partes inferiores, & similiter dicitur catarrhus, aliquando per asperam arteriam ad pulmonem, & catarrhus similiter appellatur, sicut scribit Galenus in commentariis ad Aphorismum duodecimum tertij libri: fit etiam ad os, & eodem nomine insignitur, sicuti habemus apud Galenum libro tertio de causis symptomatum capite quarto. Sunt igitur tres Catarrhi significationes, ex capite per venas ad partes inferiores, ex capite per asperam arteriam ad pulmonem, & ex capite ad os. Ex his autem prima meritò videatur appellanda communis, subsequentes duæ propriæ, aut particulares. Quomodo igitur Galeni verba in commentatio duodecimi Aphorismi libri tertij, videntur dicere communem secundo loco positam, cum ita Latine legantur? Per hæc verba videtur Hippocrates indicare, non quas valde communi vocabulo distillationes, seu catarrhos consuevimus nominare, quæ scilicet ex capite

sunt

fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant: idem autem est rheuma & rheumatismus, nisi quod aliud magis materiam, hoc autem magis actionem, & motum designat. Calfus, quod in præsentia meminimus, rheumatis voce nunquam vituit, motum humoris, cursum, & decursum dexte. meminit catarrhum a itein destillationem esse apud Latinos, Græcistum verus ostendit, quod ita exponit eam vocem; & Celsus etiam, qui in pulmonem, & ad os quæ feruntur fluxiones, destillationes semper dicit; nec non Plinius, qui sæpe ea voce per hunc modum vituit, vt de nucleis auellanis libro xxij. cap. viij. tollæ & destillati in medentur, tussi quoque veteri; & libro xix. cap. vi. de alioq Tussim, & destillationem thoracis, pulmonis, & arteriæ vitia sanat; & alibi sapientis. Hæc loca haud vidisse, aut saltem haud meminisse videtur Argentarius, quum ad quadragesimum secundi Aphorismorum, Latinos auctores dixit non habere proprium nomen, quo catarrhum significet, sicut iterum eodem loco labitur, Græcos dicens generali vocabulo vit in re particulari, catarrhum cum fluxu humorum confundens, Græcæque Latini malè admiscens: fluxus enim humorum apud Græcos est rheuma, quæ vox Argentario videtur fuisse ignota, rheuma autem apud Græcos à catarrho distinctum, sicuti supra declarauimus. Apud Latinos item fluxus, & destillatio cum ita etiam distinguantur, confunduntur tamen aliquando, vt initio adnotauimus. Celsus enim Aurelianus medicinx Latini auctor, etsi minus elegans, influxiones dixit quæ propriè destillationes appellantur, septimum enim caput secundæ libri tardarum passionum, interibit de influxione, quam Græci catarrhum vocant, & sequitur: *Est influxio nunc ad nares, quæ appellatur coriza, nunc ad fauces, quæ appellatur bruchos, nunc ad iheracem, vel pulmonem, quæ appellatur pnyssis.* Plinius etiam libro xxij. cap. xxij. cum de fluxu stillis dixit, *Hæ fluxu nibus alii, quos rheumatismos vocant, medentur,* si motionem humoris ad aluum intellexit, sicuti eo locutionis genere vti consuevit, non verò diarrhæam, aut ventris deiectionem, atque motus ille humoris ex capite sit, eo nomine intellexit destillationem & catarrhum, voluit tamen eam appellare fluxionem alui, & rheumatismum: potest verò non malè generis vocabulum speciei accommodari, sicuti etiam Græci in his ipsis vocabulis de quibus loquimur, fecerunt aliquando; ipso tamen particulari nomine vt, magis evidens, & explicita locutio est. Huiusce igitur catarrhi, seu destillationis causam cum proponeret Galenus libro tertio de symptomatum causis capite quarto, vt iam locum quem diximus emendemus, eam dicit esse cerebrum, tum ratione propria, tum ratione materiæ; ratione autem propria duobus modis, vel tanquam partem similem, vel tanquam partem instrumentariam. Eam autem rem quum liquidius declararet Galenus, hæc habet, vt quidem leguntur in Linacri versione: *Catarrhi, & coriza causa est cerebrum, quum perfrigeratum quidem est, cum similitis pars*

quodammodo in corpore videri, quia antea, id est, Thomas Linacrer, quilibet illos de Græco in Latinum conuertit, eandem translationis vocem vsu paucis, sed pro ea vult e voce *αππορροια*, quæ propriè significat effluxum seu refluxionem. Igitur translationis, seu refluxionis duci esse modum proponit, alterum *ἀππορροια* *ἢ ἀππορροια* *ἢ ἀππορροια*, id est, per impulsionem, quia agere partes se ab gentes impellunt ad alias: alterum *ἢ ἀππορροια* *ἢ ἀππορροια*, id est, per attractionem, quum partes sine attrahant ad se. Tum primo an illum alterum euacuationis modum explicans, quod sit per expulsiōem ex a corpore, eum similiter bipartitō dividit, sic et im, vel per sensibiles effluxus, vel per effluxus ratione tantum contemplabiles, vbi in vniuersum sunt quatuor euacuationis generis, quæ et in Galeni exemplis occurrunt, quorum tamen primum, quod sit per sensibiles effluxus, totus partitus, sit enim sensibilis, vel per ipsammet partem, quæ partitur eadem secta aut iuncta, vel per ea, quæ vnâ cum illa adaptatione *ἢ ἀππορροια* *ἢ ἀππορροια*, id est, secta vena, qua aperta, illa etiam aperitur, & sanatur quæ est in parte inflammata, quippe quæ cum illa societas habet. Hanc autem postremam diuisionem scriptam habemus similiter in libro de curandi ratione per sanguinis missionem cap. nono, & decimo ad initium, ubi tamen pro *αππορροια* *ἢ ἀππορροια*, habet Galenus *αππορροια* *ἢ ἀππορροια*, id est, per venas coniunctas cum partibus illis, quod non est aliud, quam declaratio eorum quæ leguntur in libro xxi. in illis, *ἢ ἀππορροια* *ἢ ἀππορροια*, & nexte venæ illis quæ in parte affecta, his adaptantur, & sanantur etiam referantur, & manunt. At libro artis Medicæ, eum eandem sit doctrina, & summa rerum, quædam aliqua ex parte differere videntur. Proponit igitur hoc altero loco, curationem sanguinis in parte inflammata redundantis, esse eius euacuationem, quam ibi manifestiori voce, ut ipse ait, *ἀππορροια* Græcè appellat, & venit Leonicius ab euacuationem, seu ab euacuationem; esse autem manifestiorem vocem dicenti Galeno credamus, ea tamen nec videtur libro tertio decimo methodi, ubi eandem locum tractat, nec alio in libro quod sciam: & vix eiusdem vocis apud alios auctores rarissimus vsus est. Apud Latinos item ab euacuatio, & ab euacuatio adeo non manifestior vox est, ut sit prioris barbarâ & ignota, licet Galeni interpretes ea vsi sint. Neque vero aliquam haberi sensu, quæ *ἀππορροια* referre possit euacuatio enim, & euacuatio, inanitio, & exinanitio, quæ Latine voces sunt, videntur quidem ex vi vocabuli referre *κίρρον*, & *ἀππορροια*, at eum non ita differant apud Latinos, quod illis vsi sunt, sicuti hoc Galeni loco *κίρρον*, & *ἀππορροια*, non liceat pro illis hæc usurpare: sed omittamus voces. Galenus hoc loco dixit esse manifestiorem vocem ad eam rem significandam, quia eandem operis declarauerat, non est autem aliud *ἀππορροια*; ex eodem Galeno, quam euacuatio non absoluta, id est, ex qua non euacuatur totus humor alteribi existens, sed pars tantum illius: vnde tunc adhibetur, quum humor, solum quantitate alicubi peccat, alioquin minoris copia ibidem secundum

eundem in eam recipi solent, quia nec oportet sola illa perire, nec tantum
 aut quantitatis pars euacuatur. Ac si non copia qua oneretur, ab illa
 sit præter naturam, sic ut nullo pacto ea in parte corpori locum habet,
 a blatio illius omnino la conuenit, quæ *xiv* dicitur, seu vacuatio, id
 igitur *συνίξις*, illius quæ superat partis euacuationem *συνίξις* est
 totius materia. Dixi autem de humoribus, qui totus euacuandus est, ut
 ri præter naturam aliqua in corporis parte, non in corpore simpliciter,
 quia datur humor secundum naturam in corpore existens, sicuti est san-
 guis, qui ratione corporis sola quantitate peccans, nunquam vacuati-
 tus deberet, sed solam *ἀνωξιστον* desideraret, & tamen aliquando abso-
 luta, & perfecta vacuatione est auferendus, ut sanguis ex illis dicitur veni-
 tiam, intestina, aliam arteriam, & pulmonem, ut sibi capere quæ-
 to, & nonagesimo Galenus; denique sanguis extra primum locum po-
 situs. Quare salutar Trusianus, quo quod Galenus dicit, præter naturam
 intelligit esse id, de cuius genere nihil est corpori naturale, ut videtur la-
 pis, & ianies: non enim ita hoc loco accipitur. Sed fuisse decepti Tulla-
 num antiquus interpret, qui quod ait Galenus præter naturam, vertit hoc
 genere præter naturam; quem Trusiani egrotum hac in re fecerit, quia
 alij non indocti recentiores huius loci Galeni interpretati. Fuisse
 eam a *ἐκκρίσει* possit *ἀνωξιστον* dictam esse vocem multum
 ad eam rem significandam, quam *συνίξις*, siue vacuationem, quæ
καὶ *ἐκκρίσει* simpliciter dicta est ab eodem Galeno ex Hippocratis sen-
 tia secundum Apolloniorum *xv*. vacuatio omnium humorum æqualiter
 quilibet est vere dictio, quæ totum corpus euacuat, ut patet ex illis lo-
 cibus hic autem non ita intelligitur, sed vacuatio tantummodo partis
 affectæ. Hæc de tali voce. Enimmodi igitur euacuationem dicit Galenus
 fieri vel sanguine recurrente (hic dicit sanguinem recurrentem *ἡ* *Γαλ.* *ἀνδρομήτης*, quod *xij*. methodi dicit *μεθυσματὸν ἀνδρῶν*, & *μεθυσματὸν* *ἐκκρίσει*)
 vel per ipsam in partem affectam recurrentem autem sanguinem
 ex tribus modis, vel impulsum, *ωσδὲ*, quæ voce similiter vius est *xij*. me-
 thodi, vel attractum, *ὡσδὲ*, ut eodem *xij*. methodi, vel transmissum, *ὡσδὲ*
καὶ *ωσδὲ*. hoc tertium membrum non apposuit *xij*. Methodi, prioribus duobus
 contentus. Dicit autem Galenus, vel aliquo ex his, vel omnibus, sicuti &
xij. Methodi, vel uno, vel utroque: non enim semper omnibus vi necesse
 est. Tamen alteram rationem, seu modum euacuationis, aut abeuacuationis
 per partem affectam subiicit, quæ similiter, ut libro *xij*. Methodi dixi
 bipartitam, quod vel fiat manifestè, & sensibiliter (id lib. *xij*. Methodi dixi
 per sensibiles effluxiones) vel per vapores attenuata materia, quod per ef-
 fluxus, ratione tantum contemplabiles dixi lib. *xij*. Methodi. Hic autem
 consideratur subpartitio lib. *xij*. Methodi posita, membrum continens euacuationem
 per partem affectam manifestè, & sensibiliter, quam ibi dixi fieri vel per
 ipsam in partem, vel per ea quæ vnà cum illa aperituri id est, quæ foras
 eam venatum habent. Vna igitur est, ut apparet, doctrina, & summa re-
 rum.

per hunc modum a membris, primum quod in Methodi euacuatur san-
guis ex particula affecta; eo alio transiit, seu eo refluyente duo-
bus modis, vel quia partes rigore expellunt, vel quia sanæ attrahunt;
libro autem artis medicæ, euacuatur, aut abieciatur, si ita liceat loqui,
quia recurrit tribus modis, impulsus, attractus, & transmissus. Rursus
aliud est discrimen in ultimo membro, nam quod xij. Methodi per par-
tem affectam euacuatur sensibilibus ebullientibus, illud euacuatur vel per
ipsammet partem, vel per ea quæ vnâ cum illa aperiuuntur, id est, quæ
societatem habent in libro præparatis medicæ, de his quæ vnâ cum parte
affecta apponuntur, nulla fit mentio. Cum autem per impulsionem &
attractionem utrobique idem intellexerit Galenus, actionem nimirum,
quæ exilis vitz partis affectæ pellunt à se redundantem sanguinem, &
actionem, quæ partes sanæ trahunt ad se eundem; ita per transmissionem,
cuius in libro artis medicæ mentionem facit, non est facile videre, quid
proprie intelligat. Existimo tamen duo intelligi posse, primum cum per
expulsionem, virtute & actione partis affectæ euenientem, intelligatur
transitum moris ab eademmet parte, & per attractionem partium sana-
rum, transitum motus ab eisdem sanis; per transmissionem intelligi nolo
transitum humoris, nec euenientis virtute partis affectæ, quæ expellat,
neque sanatum, quæ trahant, sed motionem per se, & sponte, sola
eiusdem humoris quantitate inclinare ad partem aliquam proximam.
Aliud etiam intelligi potest, nimirum actionem medicamentorum ad-
stricentium, quorum spe res limitatur materia, nec abigente parte
artia, nec tamen huius sanis, sed sola medicamenti facultate operante,
hic autem expressio confirmatur ex illis quæ paulò post subdit idem
Galenus, eadem enim sua capita iterans, & docens quomodo euacuato
toto corpore licet in singulis vti hæc habet, ut vertimus: *Ex affecta autem
parte spiritus adstringendo, & refrigerando. atque & ex inanimata loca trahent
a se quæ repellantur: Ostensum enim & hoc est in sermone de potentis naturalibus
& vti præterea adstringentibus medicamentis roborata, à se ad alia trans-
mittent.* Hic sanè postremis verbis tertij illius membri videtur haberi de-
claratio. At quomodo non est hoc idem cum primo membro, quum dicitur,
agiam partem à se abigere? an non etiâ hic cum medicamenta specta-
mus, pars est quæ expellit? Dicimus esse eandem partem quæ expellit, & mi-
nimè distare illa duo membra, & ob eam rationem factum est (ut iam, quod per-
tinet ad præteritam illam diuersitatem, conciliemus loca) ut lib. xij. methodi
duo tantum membra proponerentur, libro autem artis medicæ tria.
Quumvis autem eadem pars sit, quæ abigit, possumus tamen conside-
rare, vel actionem eiusdem per se, vel actionem medicamentorum par-
ti appositorum. Igitur in libro artis medicæ, consideratur actio pro-
pria medicamentorum repellenrium à propria facultate emergens, li-
bro autem xij. methodi vnâ cum actione partis inflammatione labo-
rantis; & ita quæ duo, & quæ tria erant membra. Porrit autem rectè

confidit, cum actione, non enim ibi quædam, quæ à natura posita sunt, necdum autem quicquam aliud inprimis est, ut scribit Galenus xij. methodi capite de ordo lecto. Quod autem pertinet ad alteram diversitatem; quæ in eductio sanguinis per partem affectam xij. methodi dicebatur fieri, vel per ipsammet scarificando, vel per ea, quæ vnâ cum parte affecta adaperiuntur, id est, per venam iunctam, & locietatem habentem, quod alterum membrum minimè apponitur in libro artis medicæ, dicimus sanguinem in particula inflammata contentum vtroque modo euacuari, potius quidem & potissimum ex ipsamet parte, quæ euacuatio in primis procedenda, cum ex locis etiam vicinis, quum priori non licet vi, non enim pars affecta seorsum in promptu est. Ex partibus autem vicinis oportet, cum eas non iunctæ sunt venis partis affectæ, his enim apertis, illæ etiam aperiantur, & noxia materia emittitur. Quare pro vna & eadem vna haberi possunt, licet altera altera magis precebat, & vno ac solo non significentur, ut in libro artis medicæ, aliquando tamen dissinguntur in duo, ut xij. methodi, quæ res liquida patet ex libro de curandis vitiis per sanguinis missionem capit. xix. vbi agens de inflama aut vbi in quæteratis, id est, ad quas amplius non inquit fluxio, & curatio exhietur, cum qui fluxit, quæ de re in præsentia agimus, habet Galenus hæc. *Interpretes phlegmonæ reuulsi euacuare oportet & quæ verò inueterata sunt, non ipsi, si fieri potest, affectus partibus, quod si nequeat, saltem ex vicinis. Illa videntur videri possint conciliata inter se hæc loca. At superest adhuc vna dissensionis scrupulus, qui omnino est euacuandus. Galenus enim in libro artis medicæ postquam illa disseruit de resolute humore, & beneficio expulsiōis, siue attractionis, siue transmissiōis, & euacuatiōis per affectam partem, siue scarificationis, siue vnde fluxio & effusio, quorum nullum potest habere locum, vniuerso corpore non euacuato; quippe nec expelli, nec attrahi, nec transmitti quicquam posse, pleno corpore non admittente, nec scarificari, nec vnde, aut discuti humorem tunc, quippe ex dolore & calore, quæ seu in toto, seu in illo necessaria sunt, maiorem citari fluxionem, tandem hæc conclusio venit, ut seu priorem, seu posteriorem rationem in vna non partem spectes, totius corporis euacuatiōem procedere sit necesse, & que huic primæ, & omnino maximè necessariæ indicationi, omnia postremò adiuuante, primum omnium esse satisfaciendum, vbi illa se nobis offerat, si enim nunquid plenum sit, sed modò ratiō in toto corpore, tam non est euacuatiōis occasio. Talis autem indicatio adu insignis, & in curanda inflammatione in primis necessaria non apparet xij. methodi capit. ix. sed quadruplex illud tantum coram nobis anteà propositum. An ne igitur tam rationum prædictarum omnium eo loco dicemus? Non omnium fieri, cum omnia ad fluxionem præprehensione potuerit, nec tamen expressam, sed rationem, & rationem*

ceteris non fuit eodem expreſſum, & iterum iterum capite antea, quo agebat de indicationibus propoſitis inflammatio non fuit, ſeu euacuationis humidi quæ iam fluxu, & in parte affecta continetur, ratione cuius, illi tantum indicantur quatuor euacuandi modi, qui propoſiti ſunt, nec aliud quidpiam. Ceterum euacuandum eſſe vniuerſum corpus, ratione cauſæ præcedentis, ſeu ratione affectus complicati cum morbo, denique ex al quo accidenti, dicitur antea capite quarto, quinto, & ſexto euſdem libri: & iterum adhuc capite xj. & xix. ſub e quibus quibus locis curationem proponebat cauſam quæ ad excitandam inflammationem conueniunt, inter quas eſt totius corporis repletio. Dicit autem fuiſſe eodem capite non ſignificatam, quæ quæ non expreſſa ſignificat eam eam Galenus illi verbis, quorum fortaliſſimum non ita omnibus obuius, cum ſcribit ad excutandam quod eſt in parte inflammata, utique via ab ipſo paulo ſuperius propoſita eſſe obuium videntur, diligenter obſervantibus, ne quæ ex accidenti læſio ſequatur, quibus verbis docet, eſſe prius occurrendum illis, quæ impedire poſſunt, ne propoſitis indicationibus ſatisfaciamus; inter illa autem poſitum eſt totius corporis repletio, quæ iungitur inflammationi, & idcirco capite ſubſequenti vndecimo, cum excitationem propoſuit in inflammatione icterici, eius curationem explicans, ita ſcribit: *Omni enim ego primum ab his quæ retuli incipiens, an totum corpus inaniſſime diligat coſiderabo.* In libro porro artis medicæ capite noniſſimo quinto, cum affectuum qui complicati ſunt curationem proponeret, ut ex ipſis Galeni verbis patet: *ſi uero ex præſiſtis aliqua ad inuicem complacentur, alias habebunt indicationes*, idcirco præceptum illud totius corporis inaniſſi, quod eſt in inflammatione in primis ſpectat, in primis proponit ad ſubueniendum illud poſt indicationes quæ habentur ex inflammatione, quæ non ſiſta eſt, quæ eadem ſunt cum illis quas lib. xij. modo dixi explicare, alibi quæ necceſſariæ ſunt ratione inflammationis genitæ, uti ex accidenti tangatur affectio alia, quæ prohibens quoniam illis ſatisfacere poſſimus, alias ſubiacet ad quas prius ſint oculi intendendi, cum ſmola eſt corporis totius repletio, quæ ad curationem inflammationis genitæ cum prius nihil faciat, prohibens tamen quæ ex neceſſitate agenda ſunt, cum eſt eſt maxime inſignis, eique in primis ſatisfaciendum eſt. Antequam ſincere hunc capiti faciam, attingere liber ad eundem locum facientia verba quædam, quæ ibidem à Galeno ſcripta, mihi diutius moleſta fuerunt, nec ſatis ab interpretibus explicata videntur. Galenus enim cum de ſcopis ageret ad inflammationis curationem facientibus, eoque eſſe dicitur, vel reſiſtentiæ materię in inflammata parte exiſtentis ad alia corporis loca, vel euacuationem euſdem per partem affectam, illis ſatis ſcopiſ, rationes quas affert, neutro ex modis propoſitis nos ſatisfacere poſſe dicit, niſi viuerit corpore antea euacuo, unde colligitur hæc verba. *Ad hoc igitur ambo vniuerſum corpus euacuare oportet.*

Id verò non satis habet, sed addit quæ molesta esse possunt: *Aut omnino ad alia loca reuellere quod insuit particula affecta.* Quoniam autem paulò antè meminerat reuulsionis, id est, attractionis ad alias corporis partes, quæ erat retrocessionis membrum, eamque nisi toto corpore antea euacuato, non concesserat Galenus, ideo commentatus ad hunc locum Oddus Patavinus antiquam versionem præfert, quam etiam habuit, & exposuit Trusianus, nec non sequitur Acachius in hunc modum: *Ob utraque igitur hæc opo res euacuare totum, & deinde è contrario trahere omnino ad alias regiones id quod insuit patienti parti;* tanquam explicet Galenus ordinem eorum, quæ ex eis indicationibus agenda sunt, & primò vniuersum corpus euacuandum dicat, tum reuellendum, tum repellendum, & deinde resoluendum. Profectò si locus ita legatur, *vera sunt hæc, & euulsus scrupulus est.* At constanter Græci codices habent *non ita.* Ratio autem ab Oddo adducta, non cogit vt ita legamus, & ostendit eum vicum admodum supinè locum considerasse. Cum enim reuulsionem, seu retractionem, quæ est retrocessionis membrum, non habere posse locum dixit Galenus, nisi toto corpore antea euacuato, reuulsionem intellexit humoris ad alias corporis partes, sed quæ eisdem retineretur, non eiusdem euacuationem extra corpus, vt ex Galeni verbis liquidissimè patet; Est igitur talis reuulsio absque euacuatione: hic autem cum euacuandum totum dicit, vel reuellendum, eam intelligere necesse est; nec verò intelligitur quæ sine euacuatione fit, quam præcedat oportet totius euacuatio, sed quæ cum euacuatione humoris sensibiliter accidit. Vnde nullo pacto necesse est ad antiquam lectionem recipere, in qua deinde legitur, quæ etiam in cunctis cunctis non minores pati possit, cum alia in qua legitur, vel eundem sensum exprimat, & Galeni doctrinæ sit admodum contraria. Nobis porro non est animus expendere illa omnia, quæ ad hunc locum afferunt, sed illa tantùm proponere, quæ locum magis explanare videntur. Igitur cum ex superioribus collegit Galenus vniuersum corpus esse euacuandum, quod per illa insert: *Ad hæc opo etiam ambo totum corpus euacuare oportet,* tum illa addit, *aut omnino ad cuncta loca reuellere,* quoniam cum ex variis corporis partibus posset hæc euacuatio perfici, vniuersè illi animus erat significare, vnde totum corpus euacuandum esset. Sic enim totum euacuandum esse dicit, vt simul & parte quæ inflammatione tentatur, reuellamus. Igitur particula, *aut,* quæ disiungit sæpe, vim iungendi habet aliquando, vt hoc bene, aut vtrum declarandi superiora. Explicat enim Galenus, non totum totum corpus esse euacuandum, sed ex parte contraria, vti eadem opera reuellamus. Iungenda enim est totius euacuatio reuulsioni: quæ libro decimo tertio methodi, capite quinto, vbi plethoricum corpus est, inanui laborante scarificat crura Galenus, & alio loco cum humore habente, reliquit. Ita enim, & totum euacuamus, & simul reuel-

mus. Et capite tertio, ubi ~~est~~ inflammatio in aliqua parte, est
 eius corporis affectus, ad eundam inflammationem ducet tollen-
 dam causam. Quare si est plethora, aut plenitudo, eam auferendam
 sanguinis missione primum, tum balneo, exercitatione, frictione,
 & aliis quæ proponit. Omnia autem eo dirigit, ut cum eo, quod
 totum euacuet, reuellant etiam à parte quæ inflammatione est ob-
 lecta. Vnde scribit: *Quid enim patere, vel me tacente arboror, cum cui
 crura phlegmine laborant, non esse vel ambulatione, vel cursu exercitandum,
 sed nec stare illi esse iubendum, immo sedentem plurimum fricari, mox manuum
 motu exercitari illi esse sanum.* *At si cui in supernis partibus coepit pars aliqua
 phlegmone tentari, huic motus ex inambulatione, aut cursu est salutaris; si-
 militer & frictio huiusmodi ea potior est, quæ cruribus adhibetur; illi quæ
 in supernis partibus administratur.* Quippe præceptum in contrarium reuel-
 lenti, in omnibus talibus commune est. Quibus adhuc alia adiicit, quæ
 totam rem liquidius declarant. Hic igitur non erat Galeno institutus
 de reuulsione sermo, sed de totius euacuatione: ad ea tamen veluti
 rei natura cogente, declinauit oratio. Non dissimiliter libro decimo
 tertio methodi capite vndecimo, cum iecoris inflammationem to-
 tius corporis plenitudini iunctam curaret, & ob plenitudinem san-
 guinem mitteret, locum tamen eligit, cuius beneficio etiam reuel-
 lit à parte intamniata, scribens: *Ergo pariter tum reuellendus, tum edu-
 cendus qui ad securum fuit sanguis est, internam dextro cubito secta vena; pro-
 pterea quod, & e directo, & ampla via cum vena quæ caua dicitur,
 societatem habet; hæc non apparente media secanda est: quod si nec ea se osten-
 derit, reliqua ac tertia incidenda est.* Et id etiam, ut opinor, significa-
 uit, cum libro de curandi ratione per sanguinis missionem ita scri-
 pserit: Porro, ut summam dicam, incipientes phlegmones reuulsu euacua-
 re oportet, quæ verò inueterata iam sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectus parti-
 bus, quod sinequeat, scilicet ex vena. Ita in euacuatione totius corpo-
 ris, quæ cuius partis gratia illa instituitur, pars eadem semper est
 inspicenda, & ab ea reuellendum, non ita si pars aliqua non labo-
 ret. Quare Galenus libro de curandi ratione per sanguinis missionem
 capite decimo nono, in quibus corporibus nulla dum particula est
 affecta, ceterum euacuationem vere inuente anteverimus, in iis, si
 quidem talis sit homo, qui quotannis æstiuo tempore febrilibus mor-
 bis obnoxius esse assolet, atque eorum suppeditationem euacuare stu-
 demus; æquè partem quampiam in sanguinis detractionem accom-
 modam esse scribit, sicuti etiam si arthriticus sit omnibus articulis la-
 borans, quibus autem eximè pars quampiam, ubi prius euacuati non fue-
 rint, infestetur, haud æquè liceat ex quauis parte euacuationem moliri,
 verum sicuti in iis, qui pati iam incipiunt. Quam obrem podagricos ex cubi-
 to euacuandos præcipit, comitialibus autem morbis, vertiginibusq; ob-
 noxiis, potius ex cruribus. Quod verò de præcautione à morbis in iis qui

tam, ut præcipit Galenus, multo magis de his qui agunt ab ipse
vita, partes lesionis, dicendum est. Evacuantes igitur totum ratione
partis, partem semper respiciemus, ab ipsa simul reuellando. Hic verò re-
uulsionem intelligimus, quæ propriè talis est, & consideratur ratione to-
tius corporis, cuius partes superiores opponi dicuntur inferioribus, & dex-
tre sinistris, vnde ab his ad illas, & ab illis ad has reuulsio fit. Superiores
autem dicuntur quæ supra locum sunt, aut supra renes, ex Galeno in sex-
tum de morbis vulgaribus xiv. & libro de curandi ratione per sanguinis
missionem cap. xiv. Quamvis enim dolenti partem capitis posteriorem,
recta in fronte incisa vna reuulsorium sit auxilium, vt habetur apud Ga-
lenum quinto A; horismorum lxviij. non tamen hoc præsidio liceat uti,
nisi antea totum corpus fuerit euacuatum, vt habemus apud eundem Ga-
lenum libro de curandi ratione per sanguinis missionem cap. xix. quoniam
illud est locale remediũ. nec talis missio sanguinis, cuius beneficio fluens
sanguis reuelli possit, dum totum corpus plenum sit. Est igitur reuulsio
quidam particularis ratione capitis solius, qua humor ob vna illius parte
ad aliam trahitur, cum qua tutius corporis euacuatio non beneungi
potest, vnde illam præcedere necesse est. In reuulsione autem quam pro-
posui, eo modo ungi possunt & ungiuntur, cum vna & eadem opera-
tum euacuans totum, tum à parte affecta reuellamus. Id verò est, quod
Galenus hoc loco, quem non paucis declarauimus, significare voluit.

*Cetum palumbinum & ex sinapi, vtrum in destillatione calida capiti
apponendum sit. Galeni & Tralliani opinio. Loca duo Galeni
concordata. Amati Lusitani error ostensus. Cornary lapsus
in versione cuiusdam verbi apud Aëtium. Auicen-
nae locus de eadem destillatione sub-
tilissimè expensus.*

C A P V T X X.

GALENUS libro quinto methodi medendi cap. xiiij. cum de
eructo sputo verba faceret, curationemque proponit
eiusdem à destillatione procedentis, quam ipse Roma in
splendida muliere peregit, quæ de pulmonis vlcere pericula-
batur; inter alia auxilia eidem ab initio adhibita, medicamentum in vit-
ceratum, fere raso capiti statim impositum, tum quarto die iteratum ex
fimo syluestrium columborum, nec non illud, quod ex thapsia colligitur.
Quis fuerit destillatio, & qua temperie præparatum caput vitæ moue-
ris, non exprimit Galenus: sed fuisse destillationem tenuem signifi-
cat, quoniam ad incassandum, theriacam recepit, nimum autem quæ for-
annos confectam, se exhibuisse scribit. Hoc idem ex thapsia colatum,

reclama

terum proponitur a Galeno cap. xlii. subsequenti, ubi de eiusdem distillationis cu adunc fitionem continetur, expressa tamen distillationis qualitate, quod falsa esset. Alexander Trallianus, tum ex hoc, tum ex aliis exemplis affectionis natura, mulieris illius caput fuisse intemperatè elid affectum colligitis, v. par est, licet non exprimat Galenus, distillationemque aëtem, comprehendit cum curationem mulieris cap. xlii. propositam, quam aperte significat Trallianus, etsi haud nominet, tum vniuersè præceptum de catarrh ex stercore, & thapsia deinceps à Galeno propositum, quem auctorem tamen non solum hoc loco, sed alibi sæpe diuini sumi titulum honorat Trallianus: reprehendit autem quod nullo humectante, & refrigerante vsus, statim ab initio siccantia, & calefacientia adhibuerit, & adhibenda proponat, quibus tamen caput intemperatum intemperatius reddatur, & quæ in thorace sunt, aciora efficiantur, cum hæc acré qualiorem adaugeant, & erosionem magis intendunt, quam cures, quum potius, sicutiple præcipit, refrigerantibus, & humectantibus quæ contemperant, & leniunt, vt indurum eliet. Ita enim extinguere calorem capitis, qui ex inferioribus materiam elicit, attrahitur, & pulmonem transmittit. Ad hanc rem sunt quæ adnotemus. In primis, idem ceratum ad distillationem extrudentem sanguinem, proponitur ab Aëtio libro vii. cap. lx. quippe qui Galeni ipsūdem locum referat: proponitur itidem à Paulo Aegineta lib. ii. cap. xxv. qui tamen apponit illud non statim, sed vbi auxiliū ab eo præscriptis non cessat morbus. Propōnitur itidem ab Auicenna libro tertio fen. x. tract. iij. cap. vj. qui & Galeni locum à me recitatum nominatim affert, nec tamen ille apponit statim, sed sicuti Aegineta, cum alia præsidia non potuerint morbum tollere. Mesues libro secundo cap. octauo de cura catarrhi, proponit non sanè steretis palumbinum, sed raso capite, & fricato loco ex caepe, aut squilla, eodémque rubificato, vesicatorium ad materiam catarrhi diuertendam. Eodem autem libro capit. de fluxu sanguinis ab ore, Galeni locum, & curationem, ceratūque ex stercore columbino, & ipse affert, nec improbat. Enimvero, quæ habet Aëtius, vix momentum faciunt, cum ille quæcunque apud Galenum, aut alios reperiret, indistinctè, & abique vilo iudicio colligeret, nihil ferè de suo vnquam addens. Non ita Paulus, & multò minùs Auicennas, aut Mesues, vt liceat horum auctoritates, si opus sit, Tralliani auctoritati pro Galeno opponere. Sed verò, & rationibus à Tralliano propositis respondendum est, quod tamen antequam facio, Tralliani opinionè adhuc ex eorundem Galeni, Aëtij, & Auicennæ locis comprobare libet. Galenus igitur libro vj. de tuenda valetudine cap. ix. ceratum illud videtur improbare, cum enim doceret providere capiti ex natura addò intemperato, vt multa excrementa gigneret, quæ ad subiectas partes demissa, illius uolumento essent, reprehendebat medicos, qui circa subiectarum partium curationem satagendo, aut collemellam incidebant, aut

medicamenta exhibebant, quibus caput procurarent, quod in pulmone per asperam arteriam deflueret; aut ventri prospiciebant, aut ori, aut alio partibus; cum ipsa morbi origo potius esset auferenda, quod per hæc subiicit Galenus: Cum scius arbitror, esset, ipsum malis seu fontem tollere, caput ipsum firmando, aut si hoc pia magnitudine naturalis intemperantia non liceret, saltem illi prospicere, ab ipsa scilicet vitij specie providentia indicatione semper accepta; nec committere, ut quod nonnulli medicorum faciunt, qui omni caput medicamentum quod ex thapsia & sinapi componitur applicant, id ipsi quoque faciam: quando si ex calida intemperie caput male habet, talia medicamenta noceant. Expedie igitur hoc frequenter b.lneo potabilis aqua fouere, quo & calidos vapores, qui in capite sunt euocemus, & totum capitis temperamentum melius reddamus. Hæc omnia ex Galeno proposui, non quod omnia necessaria existimarem, poterat enim satis esse, quæ postremo loco sunt adscripta, paucis verbis comprehendere, sed ob duo totum locum recitavi. Primum est, ut admonerem & palam facerem, totum locum fuisse ab Aëtio desumptum, cuius sunt lib. iij. cap. liij. hæc ipsa verba à me ex Galeno recitata, quod cum non animaduerteter Amatus Lusitanus, & ab Aëtio hæc eadem ex Galeno proposita, tanquam Aëtij sumeret, existimauit hoc loco improbari ab Aëtio ceratum, atque ita Aëtium aduersari Galeno; res verò non ita habet, nec Aëtius plus aduersatur Galeno, quam Galenus sibi ipsi. Alterum est, ut in Aëtij translatione errorem iudicaret; qui sensum non parum obscurat; pro eo enim quod Græcè scribitur, *ἀπὸ τοῦ αἵματος*, vertit Cornarius, indicatione ex figura ipsius accepta Verbum *αἷμα*, referens ad figuram capitis, quæ ad vitij, seu intemperiei speciem referenda est; nihil enim facit ad medicamenta quæ subiicit Galenus, capitis figura, cum multum faciat vitij species; si enim calida est, non vult uti sinapi, & thapsia Galenus, sed balneis potabilium, & dulcium aquarum. Hæc igitur de Aëtio. Auicennas etiam videtur suffragari Tralliano eodem capite antea proposito, quum de distillatione acri efficiente spiritum sanguinis, ita scribit: *Oportet, ut studium impendatur in infrigiendo caput, quantum possibile est.* Non igitur vitile ceratum ex stercore palumbino, aut ex thapsia, quod vehementer calefacit & exsiccat. Hieronymus Capivaccius Galeni sententiam aduersus Trallianum defendere conatus est, nec tamen rem, ut mihi videtur, satis explicat. Dicit autem Capivaccius, calefacientia tribus nominibus usurpari posse, vel tanquam euacuantia, vel tanquam retrahentia, vel tanquam calefacientia; Galenum igitur illis uti tanquam euacuantibus; euacuant enim insensibiliter materiam discutiendo; *potissimum autem*, ut retrahant materiam; nullo autem modo ut *calificant*. Igitur, subiicit Capivaccius, illis vult Galenus propter

MATELLAN.

in materiam morbosicam, non propter intemperiem calidam, cum ergo materia falsa peccat copia, euacuanda est, & cum peccat motu, quo ad pulmonem distillat, retrahenda est sursum: utrumque autem ex cerato consequimur. Non igitur de alterantibus loquitur Galenus, sed respicit indicationes, quæ sumuntur à materia genita, non autem eas quæ sumuntur à causa generante. Vera proponit Capiuaccius, at non satisfacit Tralliano. Quis autem adeò vecors, ut existimer à Galeno ceratum apponi calefactionis causa? Nec id ignorabat Trallianus, qui scribit à Galeno opum fuisse cognitam destillationis causam: estque adeò apertum de illo cerato capiti superimposito Galeni consilium, ex verbis capitis xij. & xiiij. ut neminem qui ea legat latere possit; quippe ad exsiccandam fluxionem, & roborandum caput, quod est ipsi providere, quam rem proposuit capite xiiij. Existimat autem Trallianus id fieri non posse, nec debere usui illius cerati, quod vehementer calefacit, & exsiccat; sed oppugnandam potius causam, id est, caliditatem, humectantibus, & refrigerantibus, ceratūque illud noxium magis esse ob rationes propositas. Satisfaciamus igitur Tralliano, & scrupulum eximamus; quippe magis vrgere dicimus fluxionem præcipitis materię, quæ eo tempore mulierem detinebat, quam intemperiem, aut causam, id est, caliditatem: illi igitur fuisse antè occurrendum, magis autem vrgere inde apparebat, quod fluere iam sanguis, & periculum instaret vlcus in pulmone; quo tamen sanguine nondum apparente si materia cum eo videatur præcipitanter labi, ut vlcus periculum nihilominus sit, cerati etiā vius apparet, ad eum finem ut retrahatur ab inferioribus materia, & retineatur in capite. Quamquam enim interim aliquantisper augeatur intemperies, & causa quæ morbum efficit in capite, euitato tamen ex attractione, & detentione materię ferè insaniabilis in pulmone morbi periculo, mox intemperiei, & causę succurretur. At cur, dicat aliquis, non potius præstamus illud opus refrigerantibus, & exsiccantibus, quæ causam minime augebunt? Quia non licet; vel enim refrigerantia, & exsiccantia sunt partium crassarum, vel tenuium, si crassarum, tardè operantur, nec licet opus præstolari, periculum enim est in mora, quippe casus præceptus est: si autem tenuium partium sint, quale acetum, expriment potius, contrariūque operi, quod querimus efficient, attrahere enim sursum eo tempore volumus; quam rem non videtur comprehendisse Trallianus, qui calida ideo etiā improbauit, quod elicerent, & attraherent materiam, quæ postea ad pulmones transmitteretur, id ipse noxium putauit, quod nos maxime salutare in casu vrgentis destillationis; si autem destillatio non adeò vrgeat, nec sit adeò præceptus casus, tutius sit in intemperie calida à calefacientibus abstinere; talem autem corporis statum

considerans Galenus libro sexto de tuenda valetudine, quippe minime instante periculo, & in latitudine sanitatis destillationem citans, in-temperiemque oppugnans, humectantibus, & refrigerantibus vitur, ex quibus locorum conciliatio apparet. Et cum hic idem qui scriptus est libro sexto de tuenda valetudine, sit quem recitat Aëtius libro tertio capite quinquagesimo tertio, non plus aduersari existimandus est quam Galeni ille ipse. Solus igitur Auicennæ locus est reliquus, quem explanemus; Si igitur refrigerandum esse caput præscribit Auicenna, non sane utile ceratum sit, quod admodum exalfacit. Tria dicimus ad hæc. Primum, quod aliqui codices legunt hoc loco, *iudicium me- dica impendendum esse in refrigerando caput*, alios habere, sicuti dicit Bel-lunentis *in regendo carni*, quadrat autem maxime hæc lectio: videtur enim eo verbo significari illud, quod Galenus quinto methodi capi-te decimo quarto dicit, providendum esse capiti, quam providen-tiam fieri subiicit vñ cerati propositi, quod magnopere exficcat, quod etiam secutus Auicenna, manifesteque rem explanans subiicit, non esse caput humectandum. Alterum est, si lectionem sequimur, quæ *in infigidando habet*, dixisse Auicennam non simpliciter refri-gerandum esse caput, sed quantum possibile est: nimirum causam morbi, seu intemperiem refrigeratione indigere nouerat, quoniam tamen motui seu fluxioni humoris calida aliquando ita esse neces-saria videret, vt pro refrigerantibus calida, & attrahentia melius ef-fet vsurpare, ideo dixit refrigerandum quantum fieri possit; non sa-ne vehementer, vt vulgò illa verba accipiuntur, sed quantum sine materia fluentis impetus; est verò cum non sinat, quia ad scopum, quem intendimus, non sunt apta, sed pro illis calefacientia suadet. Tertium addo, si recipimus communem expositionem eorum ver-borum, *quantum possibile est*, id est, vehementer, interpretandum esse locum sicuti facit Iacobus de Partibus, qui adinuaduertens, vehementer frigida capiti apposita in huiusmodi destillatione, obef-fere posse magis adhuc exprimendo, admonet nos, ne huiusmodi va-lidè refrigerantia applicemus super verticem capitis, ne exprimendo destillationem augeant compresso ab illis capite non secus ac spon-gia, sed apponantur fronti, & temporibus; aut naribus attrahan-tur, veluti odores ex rebus refrigerantibus; aut in ore detineantur, sicuti sunt pilulæ de myrrha, & opio. Non igitur aduersatur Gale-nus, nec sibi ipsi, cum paulò post ex eodem Galeno ceratum pro-ponit. Videatur sane à Paulo, & Auicenna hæc re dissidere Ga-lenus, quod ceratum initio statim, & properanter apponit, ubi ve-rò tentatis prius aliis auxiliis, ubi illis morbus non cedit. Varias autem cerati facultates eos considerasse constat, quippe Galenus, vt attraheret ab inferioribus partibus præcipitem materiam quod Patum faciendum erat, nec alia auxilia præuertenda, ideo statim

usus est. Auicennas autem & Paulus, vt exsiccarent, & roborarent caput, quod aliis auxiliis exsiccare, & roborari non potuit. Ita Galenus præcipitis materiaz morum potissimum, illi eandem in capite existentem; & capitis roborationem aduertentes, variis temporibus rectè eodem auxilio vsi sunt.

In cruento sputo ex acri, & salsa destillatione conuenire sanguinis missionem ex Galeni opinione. Tralliani & Pauli quæ aduersari videntur, illis quandamtenus conciliata. Auicenna ea de re inconstantia. Hippocratis, & Galeni loca ex sexto Epidemiorum. non refragari.

C A P V T X X I.

Vbi ex aliquo interno viscere sanguis per os redditur, venam secandam esse dicunt frequenter medici, ita enim ab ea parte sanguinem reuelli, inflammationemque prohiberi. Id præcipue scribit Galenus tum alibi, tum libro quinto methodi capite octauo: id tamen non est absque aliqua difficultate, nam cum possit sanguis effundi, aperto, disrupto, atque eroso vase, vbi erosio id mali procurauerit, ex quacunque tandem parte sanguis reiciatur, vel pulmone, vel thorace, vel fauceibus, vitandam esse sanguinis missionem Trallianus scribit libro septimo capite primo, magna enim ex parte corpus eorum qui sic ex erosione sanguinem reddunt, gracile, & perficuum esse, atque corporis habitum assumentorum similem, nec non idem vitio opportunum, & phthisico affectui. Paulus quoque libro tertio capite trigesimo primo, quibus cruentum sputum sit ex distillatione, venam secandam ita proponit, si destillatio non sit, (vt ipse loquitur) autem pungitiua, & valde coherica. Sed horum auctorum sententia, non simpliciter, & sine distinctione accipienda, adhibet enim distinctionem Galenus v. method. cap. decimo quarto, vbi cum de illis ageret qui ex destillatione salii, & vitiosi succi in pulmone tussissent, nec dum tamen sanguinem reuerent, postquam & purgationem, & alia medicamenta propinxisset,

posuisset, de venæ sectione ita loquitur: *Ceterum, de mittendo his sanguine, aliud scire licet, quicunque parum habere sanguinis videbuntur, vis ad quendam succum probiorem (sicuti prædixi) reduciis, de trahere sanguinem poteris, tum vultus reficere, denuoque si res suadet, sanguinem mittere, potissimum quibus veluis limus vitiosus, & crassus totus est sanguis. At qui valids sunt, mulique sanguinis, is statim à principio est detrahendus. Porro autem si nondum fluente sanguine, nec vulnerato pulmone in destillatione salta mittit sanguinem Galenus, protinus quidem, ubi vires sunt validæ, alioquin postea ad probiorem succum reducens, ut sanguinis missionem ferre possint; multo magis, vel protinus, vel paulò post is erit detrahendus, qui iam sanguinem expuunt, quum huius symptomatis ratione, illius auxiliij utilitas quoque desideretur. Et verò idem Galenus cap. xij. eiusdem libri v. curationem proponens adhibitam splēdix illi mulieri Romanæ, quæ ex catarrho sanguinem expuerat, ob eam rationem à venæ sectione abstinuisse scribit, quia iam quattriduum propemodum sine cibo, propter catarrhum egerat, alioqui missurus. Sed & Halyabbas lib. xi. præticæ cap. x. in sputo sanguinis ex venarum pectoris, & pulmonis corrosione, facta à defluxu acuto ex cerebro, venam secar basilicam. Dicere autem fortasse possimus (si aliquis conciliationi locus est, nec Alexander, ut in aliis quibusdam à Galeno dissensit, etsi soleat id aperte ille dicere) loqui Alexandrum de illis, qui à natura tenuem illum, & ex sanguinem habitum sortiti, aliorum omnium maxime in sputum sanguinis incidere solent; hi enim cum refici non possint, quia naturalis est habitus, non ferunt venæ sectionem; de tali enim habitu, quum naturalis est, loqui Alexandrum manifestè apparet ex verbis; sed cum iidem habitus etiam non ex natura sint, & in eundem morbum incidere quoque possint, non est hinc penitus abneganda venæ sectio. Quod etiam videtur innuere Alexander, scribens magna ex parte eorum corpus qui sputum ex erosione patiuntur, tale esse, quippe tale a natura: absolute verò id non protulit. Igitur si non illa sanguinis inopia à natura laboretur, nec adeò infirmis viribus destillatio vrgear, probiorèque succo illos refici pote sit, quâquam ex destillatione sit sputum sanguinis, secanda quoque vena erit. Et idem etiam Auicenna (adeò sibi non constat aliquando) eodem capite spuri sanguinis ex corrosione auxilia proponens, scribit eius curationem esse mundificationem (ut ipse loquitur) cum euacuatione, phlebotomia, & aliis. Anne verò eadem ei adhuc refragari existimandum Hippocratis dictum vj. Epidemiorum, quod aliqui existimauerunt: *Impedimentum in cruenta sputentibus, semper arri, phlegmone lateris, bilis*: quod Galenus exponens commentario tertio ad calcem dicit, si vehementer biliosus homo sit, impediri venæ sectionem in sanguinis sputo: non sanè putem. Primum enim variè legitur locus ille Hippocratis, & variè exponitur, ut Galenus ipse statatur, & Galeni interpretatio non omnibus arridet, tum verò, nec bilis cum abundat, venæ sectionem impedire potest, nisi ita abundet, ut ipsam sanguinem*

laqueet.

saperet, alioquin in biliosis morbis nunquam vena secaretur, sed hanc rem determinauit idem Galenus libro . . . de tuenda valetudine, qualitatibus, & quantitatis humorum limites constituens, intra quos venam secare liceat, aliter non liceat, & nos hac de re alibi copiosius. Hic supponimus spatium sanguinis ex corrosione, fieri etiam posse cum probi sanguinis copia aliqua, quo casu venam secandam esse dicimus.

In sputo cruento sanguinem modo ex superioribus, modo ex inferioribus partibus esse mittendum. Galeni, Pauli, Alexandri, Mesues, & Auicenna, ac recentiorum ea de re opiniones. Suppressis mensibus eadem via incedendum: ex proximo atque etiam affecto loco euacuatione interim uti licere, cum reuulsione adhuc opus est. De reuulsione aliqua ex Galeno.

C A P V T XXII.



E eadem venæ sectione in sputo sanguinis quod consideremus offert nobis aliud Alexander; pertinet autem ad locum vnde mittendus sanguis: Galenus enim v. methodi cap. viij. internā cubiti secat, & ab eadem subsequenti die iterum mittit. Idem ex Galeno, ut credere par est, repetit Aëtius libro viij. cap. lxij & alij auctores: sed Alexander cap. primo libri septimi cum in eiusdem mali curatione venam cubiti secandam proponeret, hæc addidit, prodesse ægrotis nihilominus ex imis etiam corporis partibus sanguinis detractionem. *Noni autem ego me, inquit, cum vena cubiti in conspectum non venisset, etiam ex vena in talo scilicet sanguinem dimisisse, & multò magis profuisse. Nam vena ad longinquiores partes prouocat, & firmiter multò reuulsionem efficit.* Mesues etiam utraque loca proponit, siue curationem, siue prouidentiam spectemus: in curatione enim cum phlebotomias iterandas dicat ex vena basilica, nunc dextri, nunc sinistri brachij, addit. *Et quandoque conuertimus sanguinem ad longinquam diuersitatem, sicut ad partes inferiores, & hoc cum phlebotomia saphenæ, & ventosatione crurum, & scarificatione in ipsis.* Loquens autem de prouidentia scribebat: *Expositi autem ad sputum sanguinis sunt, habentes pelus, & c. nos autem precauemus ne cadant in illud cum phlebotomia saphenæ, & positione ventosarum, & prouocatione hæmorrhoidarum.* Auicennas etiam seorsum de præcautione, & curatione loquens, in præcautione rectius esse dicit, sanguinem vbi abundat ad partes inferiores inclinare cum phlebotomia saphenæ, & post eā cum phlebotomia basilicæ. De curatione autem scribens, proponit succurrendum esse secando basilicam partis, in qua existimatur esse solutio singularis, repetitis detractionibus singu-

his tribus horis. Addit rationem: *Phlebotomia enim attrahit sanguinem ad vascum*, (ad contrarium emendat Bellumenſis) & *prohibet aduentum apoſtemiſis in vulnere*. Hæc autem cùm generatim, & abſque diſtinctione dicant de loco vnde mittendus ſanguis in cruenta expuitione, ſiue illa in mari bus, ſiue illa in ſceminis fiat, dubitatione adhuc augeri, difficilioremque reddi contingit, ſi tale ſputum fiat mulieri cui menſes diminuti, aut ex toto ſuppreſſi ſint. Memini ſine caſum incidiſſe aliquando Genuæ, & rem variis opinionibus, & variis diſputationibus agitatam. Profecto enim ſi magis profuit detractio ſanguinis ex venis tali, ac per eum modum firmior fiat reuulſio, quod ait Alexander: ſi per eaſdem venias fit diuerſio ad longinquiora, quod ait Meſuës, quod idem putem, ac fieri firmiorem reuulſionem; iam melius ſit inferiores, quàm ſuperiores ſecare. At Gale nus v. methodi internam cubiti ſecat, & alij ex ipſo. Hæc generatim. At particulatim in mulierum caſu quid agendum? Trallianus particulatim & diſtinctè nihil proponit. Vcùm ſi proficuum magis in vitis inferiorem ſectionem exiſtimar, adhuc utiliorem in mulieribus exiſtimaffe dicendum ſit, ob rationem quam ex Galeno paulò pòſt adducemus. Meſuës loco recitato non obicere de mulieribus videtur ſuam opinionem ſignificare, nã poſt illa quæ ſuperius adduxi generatim de curatione ſcripta, ſecandam ſaphenam, cucurbitulas affigendas cruribus, eãque ſcatificandas, hæc ſubdit: *Et quædã que exigui diſpoſito hemorrhoidarum, aut menſtruerum prouocationem*, quæ ſimiliter iterat cùm de prouidentia loquitur: ſcribit enim prouocandas eſſe hemorrhoidas, & menſtrua; eſt autem menſtruatorum prouocatio mulierum propria. Nec verò dubitandum agere de prouocatione menſtruatorum per venæ ſectionem, non per medicamenta, cùm inſtrumentum illud, non pharmaciã ibi tractaret Auicenna. De præcautione idẽ ſentire videtur. nã poſt illa quæ ſuperius ex ipſo adducta ſunt, ſecandam ſaphenam, & baſilicam, addit quæ particulatim ad mulieres pertinent, prouocanda eſſe mulieribus menſtrua, eorum circuitus tempore inſtante. At cùm, iam non prouidentiam, ſed curationem tractat, baſilicæ tantùm ſectionem proponit, repetitis vicibus ſingulis tribus horis, cuius verba antea à nobis adducta ſunt. Sic igitur præcautionis gratia, inferiorum venarum ſectionem etiam proponit, in curatione penitus omittit: quamquã nonnulli ſunt, qui ex Auicennæ opinione, in curatione etiam ſaphenam ſecandam exiſtimant, ex quibus inter paulò antiquiores alicubi eſt Valeſius de Taranto, & inter recentiores Capiuaccius: cū tamen Auicennas ita vti dixi, auxilia quibus ab imminente morbo caueat, qui ei eſt obnoxius initio deſcribat, facti autem, ac exiſtentis deinceps. Hæc de Auicennæ opinione. Hippocrates v. Aphoriſ. xxxij. mulieri ſanguinem euimenti, menſtruis erumpentibus ſolutionem fieri proponit, quod Galenus in commentario comprobat: ita enim reuulſionem fieri ſanguinis qui ad ſuperiora tendebat, & eiũdem extra corpus euacuationẽ. Si igitur rectam & ſalubrem naturæ operationem imitari debet Medicus, ad inferiora trahet

trahet & ipse sanguinem, eumque inde euacuabit: sed & idem Galenus libro de curandi ratione per sanguinis missionem cap. xviij. in vteri affectibus est autem vteri affectus mensium suppressio, ex qua cruentum sputum oritur inferiores venas secat, & euacuationes ex cubito hoc nomine damnat, quod purgationes menstruas comprimant, sanguinem ad superiores corporis partes retrahendo, quum ex cruribus adeo non retrahant, ut etiam promoueant: id autem est quod paulò antea ex Galeno, ad opinionem Alexandri adstruendam me allaturum dicebam: sed & capite subsequenti xix. iis quibus suppressi sunt menses, semper in cruribus secandas esse venas dicit. Inter recentiores Altomarius cum antea sputo sanguinis laborati secandam proposuisset humeralem, aut mediani in cubito, si mulier sit, cui menstrua non ferantur, in talo secandam esse dicit, pari ratione ut sanguis auertatur. In viris igitur auerti putat secto cubito, in mulieribus talo. Hallerius Stenpanus non dissimiliter, in sputo sanguinis ex menstruorum suppressione, venam cruris aperit. Iacchinus Emperien- sis siue in viris, siue in mulieribus, iuxta morbi conditionem, inodò ex superioribus, inodò ex inferioribus sanguinem mittit. An verò recentissimū niemorem Ludouicum Mercatum in libro Praxeos ex talo mittere? eundē consultum cum casus Genux incidisset, ad cubitum inclinare sic tamen ut de talo aliquando etiam mittendum dicat. Sed & de cubito missum, approbatum in eodem casu à clarissimis Medicis etiam video. Quare distinctione aliqua opus esse omnino apparet, quæ ex affectus natura, & cō- ditione, id autem est dicere, ex indicatione habenda. Igitur expuenti san- guinem quo consilio vena secatur? quæue eius auxilij ratio? Respondet Galeno v. Methodi cap. viij. vbi internam cubiti aperit, *ἀποπληξίῳ*, id est, reuulsionis gratia, Interpres reddit, *auertendi sanguinis causa*, ad sen- sum bene, ad verbū non omnino, auertere enim, quod Galenus *ἀποπληξίῳ*, & *ἀποπληξία* dicere solet, vniuersalius est, & tanquam genus, deriua- tionem & reuulsionem propriè dictam comprehendit, vtrumque autem hic locum habet, propria tamen vocis notio erat interpreti retinenda, auctoris sensus ea commentanti relinquendus. Dicit itaque reuulsionem Galenus, non propriissimè tamen eam accipit. Igitur mitti sanguinem hēmoptoico dicit Galenus reuulsionis causa; mitti dicit Auicennas, ut at- trahatur sanguis ad vacuum, seu ad contrarium, ut emendat Bellunensis, atque ut inflammatio prohibeatur. Reuulsionem fieri debere ad loca ma- ximè longinqua, habemus xiiij. Methodi cap. xj. atque etiam 2. in sextum Epid. vij. At verò cubiti vena, vtrum ne maximè distat à pulmone, de cu- ius affectione potissimū agimus, aut etiam ab alio viscere interno? non sanè; magis enim distat talus, & cubiti tamen venam reuulsionis causa aperit Galenus, & aperit Trallianus, licet aperta etiam aliquando quæ in talo est, maius emolumentum dicat apparuisse. Igitur vel reuulsio non semper ad maximè distantes partes fit, vel non reuulsio in hēmoptoico attenditur; at vtrumque ex Galeno est propositum. Dicimus vtrumque

rectè esse accipiendum, & intelligendum: reuulsio enim exactissima, & absoluta, ad maximè distantes partes fit, quò enim magis à loco affecto recedimus, sanguinem ad longinquiora fluxionis initia retrahentes, exactius & firmitus reuellimus, quod Alexander dicebat; reuulsio tamen etiam est quæ fit ad partes non maximè distantes, sicuti hoc loco à Galeno accipitur, & eodem xij. Methodi capite xj. vbi iecinore inflammationem pati occipiente, reuulsionis causa internam dextri cubiti secat. Porro autem reuulsionis hunc locum alibi nos diligentius tractamus. Interim in hæmoptico attenditur quidem reuulsio, sed modò exactissima illa & absoluta, modò alia, quæ non fit ad partes adeò distantes; est enim cum alia, alia magis proficua, & necessaria est, id autem communiter, tum de vitis, tum de mulieribus existimamus; de mulieribus enim quardam particulam postea dicemus. Igitur absoluta illa reuulsio fiat hæmoptico secata vena in talo, quæ maximè distans & æt' iñ est, tum autem isthæc sectio locum habet, cum ad patrem, vel nihil decubuit, sed fluxionis metus est, vel parum quid: si enim nihil, prouidentie causa longè auertimus, humoris momentum omne ad contraria, id est, ad longissima fluxionis initia retrahentes, venamque longissimè secamus, inde mittentes sanguinem, vnde exiens, ne dum ad patrem obnoxiam trahatur, sed ab ipsa longè aueratur: atque isthæc finissima & validissima est reuulsio, sicuti ab Alexandro dicitur, eoque tempore, & affectus conditione, curationis hocce genus maximè salutare est: quippe in parte longè diffusa ab ea quæ tentari solet, vitium & morbi causa est, aduersus quam loco proposito facta euacuatione pugnamus, quod est vniuersum medentis consilium. Ita Galeus libro de curandi ratione per sanguinis missionem cap. xix. prouidentie causa comitialibus morbis, & vertiginibus obnoxios ex crucibus euacuat; nec minus eadem animaduersione, & consilio procedendum, si paululum quid fluxerit, proximūque iam sit parti, aut etiā in ipsa contineatur, adhuc enim quæ sumitur indicatio ab humore fluere parato, seu ab origine fluxionis, aliis præualet, & est Galeni sententia libro modò adducto de curatione per sanguinis missionem ca. xix. in prouidentia esse procedendum, ut in iis qui pati iam occipiunt, in his igitur, ut in illis; quippe prouidentiam magis quàm propriè curationem animaduerrit eo tempore medicus. At si materia iam copiosè fluxerit, detinetur: que in parte laborante, vbi inflammationem mouerit, vel eidem sit proxima, ut inflammationis periculum instet, tunc alio reuulsionis genere est utendum, quod non fit ad distantissimas partes, & proximè accedit ad derivationis naturam; hoc autem erit secata vena in cubito: ita enim reuellitur materia, quæ est in loco inflammatione obstituto, cum id per naturam partis licet, aut quæ est proxima loco: dixi, cum licet per naturam partis; nam à pulmonis venis non licet sanguinem ibidem contentam reuellere: quippe regredi non potest qui est in vena arteriali sanguis, prohibentibus membranis in dextro cordis ventriculo, licet tamen eum reuellere, qui ex vena cava proximè labitur in pulmo-

nem, ibidem inflammationem geniturus. Cùm igitur defluxi sanguinis eo loco non exigua continetur copia, celeritque inde extractione opus est, non distantissimam, sed proximiorē venam tundemus: si enim distantissimam, qui pulmoni proximus est sanguis, & præceps inflammationis minatur periculum, inde celeriter haudquaquam emissus, inflammationem ipsam gignet. Neque enim à distantissima parte eam sanguinis copiam semel haurire licet, ex qua affecti loci, seu illius qui affecto proximior est, euacuatio consequatur. Igitur ad proximas venas eo casu deueniendum: quod est etiam consentaneum doctrinæ Hippocraticæ vj. Epidemiorum, vbi ex Galeni sententia commentario 2. particula viij. aliquando licet retrahentium auxiliorum vsus sit adhuc necessarius, adhuc fluente humore, intermittenda tamen illa dicit, interim adhibitis aliis, quorum beneficio succos in particulam prius illatos, ibidemque hærentes excernamus; quod sanè fiat in eadēmet particula sectis venis, quod plus est quàm proximam aperire; ad eò non timet Galenus eo casu aliorum ad particulam attractionem. Vbi igitur illapsi sanguinis copia sese prodet, proximè venæ sectione succurtemus. Cognoscere autem copiam ex illis non est difficile, quæ à sanguine in ea parte eumulato proficisci solent, intet quæ præcipuè nominauerim febrem: vbi enim multa præter consuetudinem prope cor sanguinis extiterit copia, illud viscus accendi, & fibrem gigni necesse est, sed & sanguinis qui expuitur magnus est impetus, & insignis copia: magnum enim quod abundè suppeditat, proximum est promptuariuni. Quod si & illud contingat, vt fluxionis origo in superioribus sit, hoc est supra cor (etsi ab inferioribus nunquam non esse sit credibile: quippe ab inferioribus ad cor ascendit sanguis) tunc vena cubiti secta reuulsio propriè fiat, & simul deriuatio; quippe ad originem retrahit, & proximum sanguinem exhaurit; talis autem euacuatio proponitur sæpe à Galeno, & reuulsio dicitur: manifestissimè primum in libro de hircudinibus, ac reuulsione, cap. xj. per hæc: *Vehementes humorum fluxiones reuulsoriis auxiliis cohibemus, ne consensim prorumpant; sunt autem reuulsoria auxilia hæc, cùm in pectus aut ventrem inclinatio, aut momentum [humorum] est, ad manus res alia; vniuersum autem cùm ad inferiores partes;* sed & commentario 2. in vj. Epidemior. xxxij. reuellentia auxilia manifestissimè dicit, quæ ex propinquo euacuant, & deriuantia potius sunt. Hæc autem habet Galenus: *Auxiliorum reuellentium hæc una quadam species est, opsonibus consiliente diuturnas oculorum fluxiones traducere ad fauces, videlicet per aëria medicamenta reuellentibus, quibus palatū inunge, atque gargari; ac inebere conuenit.* Reuulsio igitur quæ dicitur, sit etiam ad partes non ad eò diffusas, & hac tali vtimur, cùm morbi conditio ac natura id postulat, quam in cruento sputo cùm Galenus consideraret, ideo cubiti venam in eo secuit. Mesues autem, qui fieri etiam posse videbat, vt initio morbi reuulsionis ad maximè longinqua esset vsus utilior, quandoque conuertere nos sanguinem dixit ad longinquam diuersionem; qui casus cùm

incidisset Tralliano, effecit ut illam reuulsionem maximè approbaret. Auicennas cum morbum præcauens utraq; euacuatione, seu reuulsionem vteretur, sed primùm à parte longinquiori, morbum sanè curans: quippe materię copiam quæ iam fluxit attendens, ut auerteretur ea à loco, & prohiberetur inflammatio, basilicā secat, uti Galenus, eadem ratione ductus. In mulieribus peculiaris ratio est menstruorum ratione; nam cum illa exeuntia à morbis multis soleāt vindicare, morum illum medici imitari solent: quod cum verum sit, non ita tamen accipiendum, tanquam in illo sint omnia. Distinctione igitur res opus habet. Dicimus autem etumpentes menses stato tempore morbis auxiliari, alioquin nihil aut parum prodesse: denique sicuti excretiones alias symptomáticas, non quantum morbo sit necesse. Igitur hæmoptoicæ mulieri instante mensium circuitu, siue ex suppressione illius sanguinis tunc morbo genito, siue eodem antea fluere consueto, vena tali aperienda est; ira enim socio naturæ auxilio sanguis reuellitur, qui primus medici scopus est. Atque hoc sensu accipiendum quæ suprà ex Hippocrate recitauimus: *Adulæ eris sanguinem vomenti mensibus erumpentibus solutio*. Si autem menses non instant, fuerintque antea suppressi, ut in venis circa vterum sanguinem esse collectum coniectura sit, quod & aliis signis deprehendatur; tunc ex talo, uti venæ illæ euacuentur, sanguinem mittemus: alioquin eadem reuellendi ratio est, quæ in viris, de qua suprà dixi; quare non simpliciter erat reuulsio viris, & mulieribus alia, atque alia constituenda, quod fecit Altomarius. At si, tum circa cor atque pulmones maxima redundant copia, cuius impetus tinceretur, quo casu, ex cubito mittendum esse diximus; tum eadem circa vterum etiam appareret, quo loco vena aperienda? utrobique sanè. vtra verò præuertenda? si menses instant, talus antea feriendus; si non instant, cubitus; hinc enim maius, & proximius imminet periculum. Ita de tota re statuendum esse arbitror. Ex quibus etiam satis patere possit, quatenus & qualem vim habeant, quæ ab initio ex Hippocrate, Galeno, Tralliano, Auicenna, & recentioribus proposuimus; illa enim cum vera omnia sint, non tamen singula vbique: sed à nobis singula definita sunt, & limitibus comprehensa; quorum beneficio eorum auctorum sententiæ omnes seclè accipi possunt. Illa tamen adhuc fortasse liquidius explicanda, quæ pertinent ad locum vnum cap. xviij. atque item alterum cap. xix. libri de curandi ratione per sanguinis missionem; illic enim scribit, quæ ex cubito fiunt euacuationes, id habere adiunctum malum, quod purgationes menstruas comprimant, sanguinem ad superiores corporis partes retrahendo; hic autem, iis quibus suppressi sunt menses, semper in cruribus. Dicimus ad primum, malū illud non esse huiusmodi, ut superiorū venarum sectionem possit simpliciter, & per omnia impedire, alioquin in feminis nunquā superiores secarentur; sanè ubi inferiores aperire licet, ex eisquæ id commodi habetur quod requiri

quirimus, & quod ad morbum de pellendum satis est, superiores omit-
timus, ar ubi affectionis natura est, cui ex superiorum sectione manus
afferatur auxilium, iam quod malum erat, desinit esse malum à maiore
bono oppressum: satiusque sit sanguinem ad superiores corporis partes
retrahere, cum eo, ut qui in illis iam continetur, & vitæ periculum af-
fert, foras pellatur, quàm dum illum ex inferioribus non moues, ad
necem trahas ægrotantem; qui enim conceditur trahi sanguis, non sa-
nè trahatur ea copia, nec ad illa loca in quibus tam præceps afferat pe-
riculum: non enim ex illa sectione id omnino contingere potest. Ad al-
terum ex capit. xix. dicimus, de prouidentia casu ibi loqui Galenum,
quod & manifestè suis verbis exprimit, scribens ubi euacuationem vere
ineunte autuerimus, quo à morbis præcaueamus; sicuti in viris, prout
vel rotum corpus, vel hæc, aut illa pars laborat, modò hæc, mo-
dò illas venas incidimus, ita ubi expressi menses sunt, semper inferio-
res secandas esse, tunc enim vnicus affectus est, quo vniuersû medici con-
siliu diriguntur, & quo ut dirigatur nihil impedit. Solam enim aufer-
re causam eò tempore studet medicus, ar cruento sputo iugiter fluente,
alia prospicienda illi sunt, quæ non inferiores statim, sed superiores antea
incidendas esse vehementer indicant.

*De loco missionis sanguinis in pleuritide, Auctorum omnium, Græco-
rum, Arabum, & Latinorum sententia varia, iuxta temporum
successionem quo floruerunt, sigillatim explicata. Quid commune,
& quid proprium; quid simile, aut dissimile continerent ostensum.
Positis quibusdam fundamentis de reuulsione, & deriuatione, pro-
pria sententia affertur, & rationibus confirmatur.*

C A P V T X X I I I.



DE loco vnde in pleuritide mitti sanguis debeat, magna
verboium contentione inter recentiore medicos agitarum
est, ab antiquissimis Auctoribus questionis sumpta occa-
sione. Græcis enim omnibus hac de re minimè conuenit
interse, nec Arabibus, & multò minùs his cum illis. No-
bis in præsentia haud est animus opiniones omnium excutere, ratio-
numque momenta sigillatim expendere omnia, hoc enim penè infini-
tum. Illud placer, singulorum opiniones summam perstringere, ut
vnum serè sub aspectum magna de re sententiæ, auido ac curioso lecto-
ri occurrant. Interim tamen dum illæ comprehenduntur, è re nata de
iisdem aliqua explicabuntur, non sine fructu. Postremum quibusdam
adhibitis

adhibitis distinctionibus, de tota re sententiam nostram in medium afferemus. Igitur, ut à vetustissimis incipiam, Hippocrates libro secundo de ratione victus in morbis acutis particula decima, in pleuritide secatur internam cubiti venam; ac non adiecit vtro in brachio, laterisne affecti, an oppositi. Verùm quatto eorundem librorum particula lxxiij. id manifestè proponit, eo corporis latere mittendum sanguinem in brachio scribens, quo ager pleuritide laborauerit. Nec minus libro primo de morbis, secundam dicit esse venam in manu, [id est, in brachio] vel spenitidem appellatam, vel heparitidem, iuxta utram fuerit morbus; manifestè innuens ex latere partis affectæ mittendum esse sanguinem. Sed Aretæus, vetustissimus & ipse auctor, contrarium opinatus est; scribit enim libro quinto capite decimo reuulsionem spectans, secandam esse venam cubiti oppositi, præstat enim, ut ait, maxime procul abducere. Aretæo consentit Archigenes, ut apud Aëtium videre est libro octauo capit. lxxij. ex opposito enim brachio sanguinem mittit, ita enim ex Archigene Aëtius: *In his qui acuto morbo, ut diximus, infestantur, si quidem circa mammam, ac clauiculam hæreat dolor, venam incidere oportet, ut dictum est, in brachio, non eo quod rectè ab inflammatione late e procedit, sed opposito.* Galenus autem libro de curandi ratione per sanguinis missionem cap. xvj. apertissimè cum Hippocrate sentit, scribens, *Pleuriticis, quæ de directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio, clarissimam sæpe utilitatem attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certe post temporis intervallum.* Galenum secuti tum Orbasius, tum Aëtius idem proposuerunt; Orbasius enim libro vij. Collectaneorum ad Iulianum capite quinto, verba Galeni fermè recitans ita scribit: *Quoniam etiam pleuriticis sanguinis missio de directo laborantis lateris adhibita, evidentissimam sæpe utilitatem attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certe post temporis intervallum.* Et denno libro primo Synopsis capit. x. *In lateris dolore eam [venam] quæ rectè ad locum affectum pertinet, incides.* Confirmatur ratione præceptum ab eodem Auctore: secatur enim in pleuritide vena, reuulsionis maxime causa: primis autem illico verbis eiusdem capituli quinti libri septimi, ita scribit: *Si venam causa reuulsionis feceris, de directo partium ad quas sanguis fluit, perspicuam inde utilitatem celeriter videbis, at si contrà feceris, nihil proderit.* Et primo Synopsis eos ea. x. *Reuulsionis causa venam secato de directo partium ad quas sanguis fluit.* Sed & Aëtius libro tertio capite duodecimo, eandem quam Galenus hac de re sententiam proponit, ita scribens: *Sed & in pleuriticis venam de directo affecti lateris fice.* hic autem loquitur, vel ex propria sententia, vel ex sententia Galeni, ex quo erant desumpta illa, quæ proximè præcedebant: antea verò ex Archigenis sententia loquens, lateris oppositi sectionem probauit. Alexander, & Paulus cum venæ sectionem proponunt, loci nullam faciunt mentionem. Ex Latinis Cœlius Aurelianus manifestè sententiam suam declarans, scribit mittendum esse sanguinem ex parte opposita

opposita per hæc verba: *Ita adhibent la phlebotomia, scilicet ex alio brachio, quod fuerit: dicitur Lateris contrarium, certe rationis causa, quam sipe memorauimus.* At Cornelius Celsus libro 2. capite 10. nec eiusdem, nec oppositi lateris venam nominat; sed partem proximam, & partem longinquam. Verum cum iuxta eisdem auctoris doctrinam, sanguis mittatur solummodo ex brachio, ex eorporibus, & ex talo, nulla erit pleuritidi propinquior pars quam cibus, eiusdemque lateris: id autem postquam proposuit Celsus, refellit sententiam illorum, qui aliter existimabant, & eorum argumento resistit; quibus tamen non obstantibus, contrariam opinionem videtur amplecti, statim subiiciens, usum ipsum docuisse, ex longinqua & opposita parte sanguinem esse mittendum, quod pluribus docet. Sequuntur Arabes, quorum inter se neque etiam cōcordes omnium sunt opiniones. Serapion omnium fortasse antiquissimus, tractatu secundo cap. xxj. quum mittendus est sanguis, nimirum materia calida, & dolore ascendente, secat primū basilicam, scilicet lateris oppositi, vt interpretatur Rhasis quarto Continentis, tum si adhuc materia fluat, retrahendum esse vult ad locum contrarium ei, ex dorso ad longitudinem. Quibus verbis non video quid significetur aliud, quàm secandam esse saphenam eiusdem lateris, sicuti videtur interpretari Rhasis. Si autem ægritudo iam confirmata sit, & non amplius materia fluat, ex loco dolenti, id est, brachio eiusdem lateris sanguinem esse mittendum scribit. Sub Rhasis nomine duo sunt distincta volumina satis magna, alterum ad Almanforem scriptum; alterum, cui titulus Continentis: vtriusque non eundem esse auctorem putat Falopius, & sicuti Continentis auctorem tanquam senem, & maximæ auctoritatis virum magnopere extollit, ita hunc alterum tanquam empiricum, quinimo empiricissimum, vt ipse loquitur, & malum medicum videtur negligere: nos sanè non ita putamus, neque rationem videmus, cur alter alteri, si modò duo sunt, adeò præferatur, vel potius cur alter adeò habeatur despectui: sed hæc non ad hunc locum faciunt. De missione igitur sanguinis in pleuritide, tribus in locis hisce in libris fit mentio, nono ad Almanforem cap. xvij. libro primo diuisionum ad eundem Almanforem cap. liiij. & quarto Continentis ad finem libri, nec vbique eadem proponuntur. Nam ix. ad Almanforem habetur, si dolor vsque ad clauiculam peruenit, sanguinem ex axillari eius partis, quam dolor infestat, esse mittendum. At libro diuisionum, abique vlla distinctione scribit, pleuriticis esse mittendum sanguinem ex basilica lateris oppositi, tum postea die tertia ex latere doloris. Quarto autem Continentis ex mente Serapionis dicit, initio sanguinem esse mittendum ex manu oppositi lateris, tum ex saphena lateris affecti, postremo ex manu affecti lateris. Auenhoar libro primo tractatu decimosexto capite tertio ita habet: *Curatio huius ægritudinis est phlebotomare ægrotum ex basilica brachij oppositi, etsi quibusdam nouis medicis nostri temporis*

videtur minuendum ex eadem parte æg. itudinis, adductis ad eam rem logicis, & sophisticis quibusdam rationibus: id verò mihi nullatenus videtur rationi consonum, nec verum, certissimèque existimo, ita facere, ægrotum esse ad mortem præcipitare. Halyabbas, qui est idem auctor, atque Isaac, licet diuersi fuerint, qui eum librum ex Arabico transtulerunt, lib. vj. præc. cap. xij. scribit: Initio pleuritidis si dolor ad furculas ascendat, secandam basilicam lateris oppositi, quo materia morbi detrahatur in partem contrariam ei ad quam cepit declinare: at si morbus iam processerit, & materia firmata sit, tunc eiusdem lateris venam secandam, multumque sanguinis extrahendum. Alsiharauius libro practicæ, tractatu xj. capite vltimo, vbi mixtum de inflammatione diaphragmatis, & costarum agit, locum mittendi sanguinis varium constituit, pro varietate humorum mouentium inflammationem. Dicit enim primùm, in curatione apostematis diaphragmatis ex sanguine, si initium morbi sit & prima dies, antequam ægrotus confirmetur, si vires consent, & reliquæ conditiones adsint, secandam basilicam oppositi lateris; transactis autem tribus diebus, firmatæque ægrotudine, iterum secandam venam, sed brachij dolentis partis: Tum subucit: *Cum verò fuerit inflammatio ex sanguine bilio, secetur basilica eiusdem partis.* Auicenna lib. iij. sen x. tractatu v. cap. primo, varia loca proponit: initio enim morbi, dicit mittendum esse ex latere diuerso, quo genericè vt puto contrarietatem significat, particularem nullam venam deuorans: tum distinguens magis, laudat sectionem saphenæ oppositæ in longitudine, id est, saphenam partis affectæ, quòd celerius adiuuet: Capiuaccius tamen hoc loco, putat ab Auicenna tundi saphenâ non eiusdem, sed oppositi lateris, ita enim interpretatur saphenam oppositam; at cum non oppositam simpliciter, sed oppositam in longitudine dicat Auicenna, eiusdem lateris venam metitò accipiamus, sicuti etiam accipiunt Gentilis & Iacobus de Partibus, & Matthæus Gradius Mediolanensis. Igitur Auicennas primùm secandam dicit saphenam lateris affecti, quòd celerius adiuuet, tum basilicam oppositam in latitudine, id est, basilicam oppositi brachij, deinde nigram, id est, mediani eiusdem oppositi brachij, qua non apparente, cephalicam eiusdem loco secat, licet non adeò celeriter adiuuare dicat. Postremum omnium post aliquot dies mittit sanguinè ex latere conueniente in latitudine, id est, ex vena brachij partis affectæ. Auertotès vij. Collectorum, vniuersè in inflammationibus partium aut naturalium, aut spiritalium, vbi auertendum est, secat partem oppositam, vt parte dextra laborante secat sinistram, & sinistra laborante secat dextram. Meues secat basilicam lateris oppositi, si autem magna fuerit repletio, saphenâ lateris oppositi, vt saphenam dextram, si sinistram latus, & è conuerso, vt aliter quàm Auicenna ea de re existimasse videatur, quam opinionem etiam Gentilis tuetur, vt paulò post dicemus.

mus. Ita senserunt antiqui hi clarissimi viri. Qui verò postea per subsequentia tempora fuerunt, ad annum antea circiter centesimum, & Latine, seu potius barbarè de medicina scripserunt, cum ex Arabibus artem illam addiscerent, eosque magistros haberent, eorundem sententiæ adhæserunt. Delituerant enim per illa secula ferè omnes Græcorum de medicina libri, Arabum autem in omnium manibus erant, quos autem ex Græcis perpauco habebant, Latine male conuersos penitus intelligebant. Gentilis itaque Auicennæ & Mesues opinionem sequitur, distinctione adhibita. Dicit enim si in vniuerso corpore, partibusque superioribus & inferioribus sit multa repletio, materiæque superius ascendat, secandam esse saphenam oppositi lateris, quod scripserat Mesues; si enim tundatur saphena lateris affecti, etsi sanguinem auertat, materiam tamen quæ multa est, corpore adeò redundante agitat, vt ad superiores partes adhuc magis inclinet; ex quo tuncendum sit, ne moueatur ad locum, qui inflammatione tentatur: secta autem saphena oppositi lateris, nihil tale timendum. At quoniam videbatur hæc sententia aduersari generali præceptioni, non esse molendam auersionem per duos diametros, respondit Gentilis id esse intelligendum de materia, quæ iam fluit; at ratione materiæ de cuius fluxione suspicio est, fieri possit diuersionem per duos diametros, qui tamen diametri duo sunt ratione partis affectæ, non verò duo ratione partium ex quibus suspicamur fluere posse materiam. Si autem materia non sit adeò insigni copia, nec partes tum inferiores, tum superiores ita repletæ, saphenam eiusdem lateris secat Gentilis, iuxta Auicennæ dictum. Arnaldus Villanouanus, qui ante trecentos annos, atque eo plus in Gallia medicinam fecit, libro quarto breuiarij, basilicam aperit, loco Hippocratis adducto ex libro de ratione victus in acutis, intelligit autem basilicam oppositi lateris, quippe ita Gentilis ex Hippocrate dicit, per hæc verba, *Fiat phlebotomia de basilica, quousque sanguis in contrarium dolorem mutetur, vt saluetur dictum Hippocratis, dicens in regimine acutorum, & si materia est in fluxu, fiat ipsa minuto per partem oppositam, & si materia fuerit multa, & virtus fortis, vsque ad defectionem ducas.* Sanè corruptè citantur ex his plurima, nam is de ratione victus in acutis, secandam quidem internam cubiti venam dicit: sed vtro latere haud exprimit, sanguinem autem copiosè, & donec illius mutetur color, educendum; quarto autem eorundem librorum, manifestè affecti lateris, non oppositi in cubito venam aperit, & vsque ad animi defectionem ducit, vt verum appareat, quod diximus, male conuersa de Græcis penitus ab hisce Auctoribus fuisse intellecta. Bernardus Gordonius Gallus & ipse, qui que per eadem tempora apud Monspessullanos medicinam professus est, non discedit ab Auicennæ proposita opinione; initio enim morbi, corporeque plethorico, tundenda

dum dicit basilicam lateris oppositam, aut saphenam eiusdem partis, tum verò eiusdem partis basilicam. Addit autem eius rei, quam putabat rationem; si enim morbi initio, corpore pleno, tenditur partis affecta basilica, incommodum sequi dicit; nam venæ capillares quæ nutriunt costas superiores, cœunt cum venis capillari-
bus, quæ procedunt à basilica: quare si per morbi initia, corpore pleno, de eodem latere mittatur sanguis, fieri tractum per venas capillares ad locum, ex quo inflammatio augetur; quod si ægritudine confirmata, & corpore non pleno, mittatur de parte opposita, fieri tractum materiæ corruptæ ad membra nobilia; ita mittendum sicuti antea proposuit. Valesius Tarentinus libro tertio iisdem vestigijs insistens, oppositi lateris basilicam secant initio morbi, ad reuellendum antecedentem materiam à loco ubi inflammatio incipit, tertia autem, aut quarta die secant basilicam eiusdem partis, ut pars coniunctæ materiæ euacuetur. Petrus Aponensis libro cui titulus est Conciliator, differentia exij. si corpus est plethoricum, & materia etiamnum fluit, mittit ex latere opposito, si non fluit, ex eodem: intelligit utrum, ut puro, seu eiusdem, seu oppositi lateris brachia, non erant: si autem fuerit inflammatio in pinnulo pectus distinguente, id est in mediastino (mediastinum enim per hæc intelligo, non diaphragma, sicut Nicolaus) utrumque latus posse secari, magis tamen dextrum. At quoniam, subiicit Aponensis, plerumque medici aduocantur materia iam collecta, eiusdem lateris aperire venam sæpius contingit. Nicolaus Florentinus primus verbis illico Aucennæ sententiam proponit, & laudat, secandam esse saphenam: quinimo in eandem sententiam Galeni dicta trahit, quæ legantur secundo de ratione victus in acutis x. quæ de purgatione à Galeno dicuntur, quum dolor inferiorem thoracis partem occupat, ad saphenæ sectionem perperam trahens. Post hæc autem cum multas alias ea de re opiniones proponat, nullo interposito iudicio, alienam potius, quam propriam videretur aperire sententiam. Extitisse etiam dicit, qui nihil interesse arbitrantur, vtro in latere secaretur vena, cum utraque basilica æqualiter à vena magna ascendente procedat, nec aliquid hauriat à ramis venarum partes pectoris nutrientibus, quoniam supra ipsos oriuntur, nec aliquam cum illis communionem habent, ideo fieri ut vtrius secta æquale contingat iuuamentum, saltem materia collecta. His autem responderet Nicolaus, experientia sic inuentum esse, ut docuerunt auctores, & ab experientia superari rationem; sed nos quæ supersunt prosequimur. Non recedunt igitur ab eadem ferme opinione eiusdem sectæ alij, Gradius Mediolanensis, Guainerius, & Gattinaria Ticinenses, omnes enim oppositam partem initio secant, vel brachium, vel crus eligentes. Guainerius tempus definit, id est antequam sputum fluere incipiat: Gradius
super

super nonum Rhafis ad Almanforem, opinionem Auicennæ non solum approbat; sed verò & eandem Galeni etiam fuisse vult libro de curandi ratione per sanguinis missionem, Galeni verba in sensum omnino contrarium detorquendo; quod enim Galenus dicit, missionem sanguinis in pleuritide ex brachio opposito, vilitatem afferre aut omnino obscuram, aut post temporis intervallum, interpretatur ille ex brachio opposito, id est, è directo lateris dolentis, sicuti quod paulò antè dixerat Galenus, è directo adhibitam clarissimam sæpe vilitatem attulisse, pro eo accipit, ac si diceret, ex parte aut latere opposito parti dolenti. Alfert deinceps Gradius opinionem Mesues de sectione saphenæ oppositæ, cui etiam locum suum tribuit; sed & ad id postremum venit, quod antea proposuerat, ut sectionem basilicæ lateris affecti sufficere fortasse aliquando dicat: nimirum cum exigua alimodum est plenitudo, & ita intelligendum Hippocratis locum ex secundo de ratione victus in acutis. Quamvis autem ex eodem latere missionem sanguinis potissimum valere dicat ad evacuandum sanguinem, qui in particula inflammata continetur, ad quam instituitur ab Hippocrate, reuulsionem tamen ab eadem præstari, licet rarò, concedit idem Gradius. Sic igitur de tota hac re scripsere clarissimi viri, qui ad proposita usque tempora extiterunt: à quorum sententia ferme non recessisse video, qui per quinquaginta deinceps annos subsequuti sunt; in pleuritidis initio vel saphenam, vel basilicam oppositi lateris tundentes. Ita per annos quinquaginta supra quadringentos, qui ab Auicennæ & Mesues temporibus ad superius proposita tempora intercessere, eam sanguinis detractionem in pleuritide executi sunt. Alexander enim Benedictus Veronenfis, qui circiter annum Domini M. D. de medicina scripsit, tali venam secat, eligens latus dolentis partis, si humorum copia adfuerit, aut etiam ex aliorum sententia, lateris oppositi, vti vehementius materia auertatur, alioquin faciliè sursum impetum factura. Id autem maxime salutare existimat, si diaphragmatis costæ pungantur, tunc enim frustra à cubito rolli sanguinem putat ex Galeni sententia, iuxta anatomes rationem: cum vena, qua inferior pectoris pars alitur, ex aduersa parte de vena magna ortum habeat, quæ binis riuulis collas utrinque omnes nutriet: ex genu etiam alios demere dicit. Si autem inflammatio, & dolor sunt supra septum transuersum, oppositi lateris in cubito venam secat, iecorariam quidem si appareat, sin minus communem, aut mediam. Interdum in maxima sanguinis redundantia ab utroque lato, atque etiam ex aduerso cubito non inutiliter auferri dicit; quòd si materia iam sub costis collecta fuerit, ex cubito partis affectæ detractionem molitur, vbi vitæ sanguis ebulliens eadem via tollatur; quoniam autem sæpe nisi collecta materia, præsertim à pauperibus vix non aduocantur medici,

ideo in illis sæpe vñu venire dicit, vt ex dolente latere in cubito vena seecetur. Ita sensit hic auctor: sed quæ de origine illarum venarum ex Galeni sententia putat se afferre, illa sanè Galenica non sunt, neclibro quarto de ratione victus in acutis, quem locum puto ab eo significari, hæc ita habentur; nec verò etiam colligatur saphenam tundendam, quod Benedictus colligere vult. Ioannes Arculanus ex eadem Arabum familia medicus, quamquam distinctionibus adhibitis, de venæ sectione dogma illud Arabum omnino retinere velle minime vitus sit, retinet tamen: saphenam enim quatuor calibus aperiendam dicit; cum valde repletum corpus est, viciatæque materia plurima: eum materia venenata est, aut veneno proxima, seu corrupta, aut corruptioni proxima; tertio, eum timemus ne materia ad caput, & membra maxime nobiliter decurrat: postremum, si eo tempore fortè coningat consuetam aliquam excretionem, aut menstruorum, aut mariscarum retineri: sin horum nihil est, saphenam omittit, nihil enim prodesse dicit, vbi vel materia fluens & inflammationem mouens, ab iecinore proueniret, aut à locis, quæ supra iecur sunt, inferioribus autem locis nulla esset materia peccans, cum saphenæ sectio hæc tantum inaniat loca, ex Auicennæ sententia, aut vbi materia esset exigua, corpusque inanitum; tunc enim præstantius ex brachio sanguinem mittere, cum ex pedibus etiam missio, vt ille quidem ait, multò plus debilitet. Igitur solis propositis casibus aperienda saphena, modò hæc, modò illa: eiusdem enim partis aperiendam dicit, nisi immodica sit repletio: sic enim ex Mesuæ sententia oppositam secandam, aut quod melius esse dicit, aperiendas vtrasque, initio facto ab ea quæ affectæ parti est opposita; postea aperiendam basilicam oppositi lateris, nisi inflammatione existente in latere dextro, & materia venenosa, ita enim monet Arculanus, ne ipsa trahatur versùs cor, vnde eiusdem lateris basilicam hoc casu aperit: tum ex Auicennæ opinione proponit sectionem basilicæ eiusdem lateris. At verò quoniam toties repetitas detractiones timet, hæc conclusione, & distinctione vitur, vt præterquam in casibus propositis, initio morbi, id est, intra primos tres dies, si corpus est insigniter repletum, basilicam oppositam aperiendam dicat, sic tamen vt prima, & secunda die melius sit ex manu, tertia autem ex brachio; & denuum si expedit, ex basilica eiusdem lateris sanguinem mittere; si autem exigua est repletio, aut iam tertius transisset dies, melius esse dicit, basilicam partis affectæ secare. Sanè ex dictis ab hoc Auctore alia omitto: at si saphenam, aut saphenas insigni plenitudine tundendas proposuisti paulò antè, Arculane, cur deinde à basilica opposita initium sectionis facis? tum autem quæ illa prima, & altera die manus sectio? & quomodo à brachio distinguitur; sanè enim cum τὴν ἀνωθεν, id est, à manu, dicit Galenus, brachij venas vult accipi. An fortasse saluatellam intelligis? Sanè, & qui hanc è directo lateris affecti initio pleuritidis incideret, fuit etiam

etiam per illa tempora Bartholomæus Montragnana, in consilio quosdam mittens sanguinis uncias quatuor aut quinque. Quod si post eam missionem, adhuc magnæ pleuritidis notæ apparerent, optimum esse dicit venam tondere lateris affecti. Ita per hæc Arabum tempora, primo pleuritidis initio, nimirum ante quartum diem morbi (hoc enim termino ipsi satis indistinctè initium illud definiiebant) qui absolute, & simpliciter affecti lateris in cubito venam secaret, erat nemo, sed omnes aut saphenam, aut basilicam oppositi lateris per primos illos dies aperiebant; vtra autem exhibere, variatum sententiis videas, per factiones propemodum, aut ciuitates. Venetiis enim circiter annum Domini M. D. xxi. medicos omnes in pleuritidis initio saphenam aperire solitos legi qui adnotaret, & anno M. D. xxv. i. Cæsar Optatus Neapolitanus, qui tamen Venetiis multa cum fama medicinam faceret, & hanc quæstionem de loco missionis sanguinis in pleuritide non inutiliter pertractauit; vt Venetiis vulgò consueuisse medicos eo tempore saphenam tondere, ita Florentiæ, & Bononiæ basilicam lateris inflammationi oppositi scindi solitam, scribit. Adiecit autem idem Optatus, Ticinenses medicos è contrario, iam statim inter initia affecti lateris in cubito venam secuisse; hic autem, vt puto, potissimum indicatum voluit Curtium Ticinensem. Per isthæc enim tempora bonis literis renascentibus, medicorumque Græcorum libris aut primum, aut melius quàm antea in Latinum conuersis, Arabum pleraque dogmata, quæ tanquam rata antea omnium animis constanter inhierebant, in dubium à nonnullis verti, & immutari cœperunt, inter quæ præcipuum hoc fuit de loco venæ sectionis in pleuritide. Hic autem Matthæus Curtius, dem eo tempore Ticini proficeretur, ad auditores suos disceptationem ea de re habuit, atque in pleuritidis initio affecti lateris venam in cubito semper tundendam esse existimauit, quam disceptationem postea Leonardus Fuchsius, qui eam à quodam Curtii auditore exceptam habuerat, in lucem edidit. Petrus etiam Brissotus, Ticinensis medicus, eundem locum fusissimè tractans, eandem opinionem secutus est, edito volumine anno M. D. xxv. aduersus quendam medicum, quem fuisse Hieremiam Thriuerum ex Fuchsiij responsione patet: subsecutus enim Fuchsius Brissoti sententiam aduersus Thriuerum in primis laudauit, Thriuerumque ipsum, quod ex opposito latere in pleuritide mittendum sanguinem existimauiisset, magnopere arguit, in libro quem edidit anno M. D. xxxiv. Ipse enim Fuchsius lateris affecti statim, & per initia venam in cubito anteriorem tundendam existimat, siquidem pleuritis in dextro latere sit, vt pluribus eo libro persequitur, alioquin maximum subsequi detrimentum, viriosum enim sanguinem ei permisceri qui purus est, sinistramque pleuritidem frequenter inuehit: si autem in sinistro latere, aliam esse rationem scribit libro 2. Institutionum medicarum, alibi ab ipso explicatur. Explicatur autem in commentario libri de curandi ratione per sanguinis missionem cap. 26. vbi Vessalij ea de re opinionem proponit, &

approbat: quam nos afferemus, vbi aliorum quorundam opiniones antè attulerimus. Martinus Acachias Bissoti discipulus, vt ipsemet affirmat, magistri opinionè ex toto sequitur, de fibrarum tractione ea proponens, & approbans, quæ Bissoti anrea fuerunt. At Leonardus sacchinus Emporicensis, etli Græcorum medicinæ maximus & ipse eo tempore instaurator, Græcorumque medicorum libris maximè addictus esset, hæc tamen in re, Arabum sententiæ adherere videtur. Ille quippe morbi initio, à saphena mitti sanguinem vult reuulsionis causatum verò affecti lateris in cubito venam secat. Andreas Thurinus Piscienfis, qui per eadem tempora Arabum doctrinam maximè extollebat, aduersus Curtium libellum edidit anno M.D. xxvij. quo Curtij rationes omnes diluere conatus, ab opposito latere initio morbi mittendum esse sanguinem existimat; at eidem Thurino non multò post, quo Curtij opinionem defenderet, respondit Ioânes Manardus epistola prima xvj. libri anno M.D. xxxj. cū duos annos antea, etiam de eadem re ad Pharasium scripta epistola, quæ est quinta libri xij. venæ sectionem in cubito eiusdem lateris approbasset, sic tamen, vt dari etiam casus concessisset, sub quibus oppositi lateris vena esset secanda, reuulsionis causa, aut etiam malleoli, vel tali, vt si menses essent suppressi, aut mariscæ. Benedictus Victorius Fauentinus volumine non ita exiguo, scripto anno M.D. xxxij. cum eo tempore medicinâ, quæ theoricâ dicitur, in Bononienti gymnasio profiteretur, ex Hippocratis & Galeni sententiâ, materia fluente ad partem affectam, firmare rationibus, & auctoritatibus conatus est, sanguinem mittendum esse non ex eodem, sed ex latere contrario affectæ particulæ. Per eadem autem illa tempora, Andreas Vesalius Bruxelensis, peritissimus anatomicus, cum admodum iuuenis esset, nouū dogma de hac venæ in pleuritide sectione inuicere conatus est; Epistola enim ad Nicolaū Florenatem scripta, post multa ex anatomies rationes desumpta, ita orationem cōcludit, vt siue in dextra, siue in sinistra pleuritide, sanguinem semper mittendum esse diceret ex interna brachij dextri vena, præterquam affectis tribus sinistri lateris costis; tunc enim ex sinistro latere in cubito detrahendum sanguinem; ita enim commode ex vna & eadem vena, etli non eodem tempore, reuulsionem ac detractionem fieri posse; ita etiam fibrarum rectitudinem, quam per κατ' ἑξῆς intellexit Hippocrates seruari, vena enim ἀξυγις, id est, sine pari, à caua exorta prope cor, per latus dextrum excurrent, eiusdem lateris costas octo inferiores nutrit, atque sinistri easdem inferiores octo, ad quas propagines nutrit, & ad diaphragma. ac mediastinum, ex quo fiat, vt materia quæ in sinistro latere inflammationem committit, ad illas octo inferiores costas, ex dextro brachio ad quod magis pertinet ἀξυγις, detrahatur, quàm ex sinistro. Si autem eiusdem sinistri superiores costas inflammantur, quæ haudquaquā à propaginibus illis venæ sine pari nutrantur, sed ab aliis, quæ à caua statim exoriuntur, ideo sinistram brachium eo casu tūdendum esse dicit. Hæc sententiâ fuit ab aliquibus omnino recepta, sicuti à Fualtis,

vti diximus; sed ab alijs refutata, & rationi anatomicæ responsum, sicuti postea ostendemus. Iulius Cæsar Scaliger, vir non solum humanioribus literis, & philosophia apprime eruditus; sed medicus etiam non ignobilis, quid sentiret de celebri per ea tempora questione, prolarum & ipse voluit, commentario ad Hippocratis librum de somniis, edito anno Domini M. D. xxxix. Existimauit autem ad prohibendam sanguinis multitudinem, ne ad affectum locum concurreret, ab opposita parte sanguinem esse detrahendum, quod geometrica ratione eo lib. o colligit. Dolore igitur in latere sinistro existente, aperta indidem vena, plus trahi à dextro in sinistrum, quàm dextra iuncta in sinistrum, plus enim humoris esse inter circumferentiam dextram, & doloris locum, quàm inter eundem locum, & circumferentiam sinistram: venam autem eiusdem lateris, non solum non auferre, sed etiam trahere ad locum male affectum: concedit tamen & ipse, postquam totius materię cessauit fluxus, eadem parte mittendum esse sanguinem, vti quod fluxit detrahat; tunc igitur necessariam, vt appellant colligantiam, initio non esse. Proponit experientiam aduersariorum, quippe duodeuiginti annorum spatio, nisi vnum vidisse, qui ex eadem parte incisa vena euaserit à morbo, cumque corpore athletico, quod magis esset mirandum, at plus octoginta redegit in commentarium per quinque annos, qui omnes eo curandi genere essent extincti, cum plus quingenti duodecim annis euasissent, quibus in aduerso cubito vena aperta fuerat. Ioannes Fernelius secundo Therapeutices capite quinto à Fuchij opinione non videtur omnino dissentire: hic enim cum in inflammatione vtendum esse reuulsione existimet, reuulsionemque esse tractum humoris illabentis in contrarium, non tamen dextra sinistris, aut interna externis, aut alia quæ nomine opposita sunt, existimet esse contraria, nisi in fibrarum etiam, ac venarum recto cursu collocentur; quare pleuritidi dextræ nequaquàm esse contrariū latus sinistrum, inflammato tamē cruri dextro sinistrum esse contrarium; hic enim communem, & directam esse venarum societatem, non itidem illis: idcirco pleuritide dextrum latus accupante, sinistri cubiti venam sectam eam haudquaquam tollere, sed potius noxium humorem, vel in inflammata parte relinquere, vel puro sanguini permiscere, vel, quod frequentissimè accidit, sinistram pleuritidem inuhere. Ioannes Baptista Montanus cōmentario ad Aphor. lxxj. libri primi, euacuationem auersiuam, vt ipse loquitur, fieri dicit ad partem oppositam, & ad longinquam, deriuatiuam autem per idem latus, & per eundem situm, vt si in dextro latere affectus est, eodem deriuamus. Hic autem Montanus, vt manifestè apparet, nomine auersionis, seu euacuationis auersiuæ, intelligit quæ aliter reuulsio vulgò dicitur, & est auersionis species, confundens sine dubio genus cum specie. Auersio enim, vt alibi hoc eodem libro docuimus ex Galeno, genus est tum reuulsionem, tum deriuationem complexens; sed

Montanus auersionem quam dicit, proponit fieri ad partem oppositam, & ad lóingquam, in ea autem non requiri situs rectitudinem, quam dixerat antea esse dextrorum eum dextris, & sinistorum eum sinistris, sed rectitudinem, quæ est inter extremas differentias terminorum localiu; ut si locus affectus sursum est, trahatur materia deorsum; si antè, retrò; si dextrorsum, sinistrorsum; & semper integram diametrum seruari; non duas; his autem differentiis non obseruatis, diuersuam euacuationem haudquaquam fieri, situs autem rectitudinem non requiri, quod per hanc potissimum distinguatur deriuatio à diuersione: ex his appareat, cum in pleuritide maximè competat reuulsio, concludi à Montano eligendam venam lateris oppositi, at subiicit copulatim aliquando isthæ duo, deriuationem, & diuersionem, sicuti in morbis acutis, in quibus utroque remedio statim opus est. In simplici igitur reuulsione, id est, quæ nil aliud, quam reuulsionem præstat, differentias oppositas seruandas esse, ut in præseruatione; cum autem locum euacuamus morbo aliquo affectum, propinqua esse eligenda: sic enim, & deriuatio & auersio fiet, ut ipse dicit. Ex his profectò, quæ non admodò paucis protulit Montanus, vix appareat quam velit in pleuritide venam aperire, adeò confusè, qui aliis confusionem ea in re obijcit, loquitur ipse, videtur tamen eiusdem lateris potius quam oppositi venam tundendam existimasse. In quam sententiam iussit etiam video Guglielmum Rondeletium, hic enim libro de curandis morbis capite decimo quarto, basilicam vel mediam affecti lateris aperiendam esse dicit, sanguinemque ad magnam quantitatem esse mittendum; at si dolor non remittat, iterandam sanguinis missionem: subsequenti etiam cap. xv. pluribus eandem rem persecutus, Valsali opinionem refutat, auctore tamen haud nominato, aliæque non inutilia addit; sed præstat Rondeletij verba proponere, quæ ea de re ita leguntur: *Si autem sanguinem mittere oportet quacunque hora dies vel noctis, vel anni tempore, modo magnitudo morbi, & virium robur illam indicent: facienda verò à parte quæ è directo est parui affecta, & à maiori vena, ut basilica, & una vice, si vires id ferre possint, ad sanguinis mutationem, & doloris aliquam mitigationem extrahere oportet: quod si ob virium imbecillitatem, vel egrotantis difficultatem, illam euacuationem ferre non possit, in duas diuidere oportet, sed quæ eadem die, vel paruo intervallo fiant, vel si videatur, per episuram faciendæ est, & nisi magna fiat missio sanguinis ab ea parte, plus damni euenit, quam utilitatis. Nam illa pars sanguinis missione commouetur magis, sanguis, & vena parum inaniuntur, per quæ agitur sanguis facilius ad partem affectam fluu: faciendæ verò est à vena magna, quia facilius fit ex ea euacuatio, & è directo parui, ut fiat rectè iij, quæ reuulsio non ob villos reclus, sed qui a rimis andæ est natura, quæ solet facere suas excretiones secundum relictu iterum: sicut enim partes dextra in dextras sua excrementa mittere, sinistra in sinistras. Hæc autem sanguinis missio diuersio est, quæ ob materiam fluentem, non ob corruptionem fit, nisi cum post aliquos dies fit, in qua inflammatione aliqua materia impaet a egratione cuius diuersio faciendæ est, quæ si ad mutationem coloris sanguinis fit,*

erit derivatio, & diuersio. Sanguinis missio qua à parte opposita fit, non potest esse utilis, nisi in principio, in quo nulla, aut pauca materia collecta est; & coninetur in magna vena, quæ reliquidinem habet cum parte dextra, & sinistra. Neque audiēdis finit, qui docent semper esse faciendam in parte dextra, quod vena æzygos magis ad partem illam vergat, quam in aliam. Hoc tamen faciendum ad derivationem existimamus; ut primum ex parte opposita trahantur, deinde secunda missione sanguinis materiam in aliam euacua tentabāt. Verum frustra fit per plura, quod per pauciora fieri potest. Quare ab eadem parte trahendus est sanguis, cum per illam partē & diuersio, & derivatio fieri possit. Hæc Rondeletius. At Hollerius Stempnus lib. 1. de morbis internis cap. xxvj. cū ē basilica eiusdem lateris mittendum in pleuritude sanguinem dicat, aliquibus tamen calibus venas cruris eiusdem lateris secandas esse proponit, ut si suppressa aliqua per partes inferiores vacuatione, inde malum ortum sit: in insigni plenitudine; in materia virulenta, cūque statim initio materia in caput rapitur, ac mentem commouet; quæ videtur ferē Arculani sententia, à nobis antea proposito. In scholiis eiusdem capituli, ille idem Auctor rationem reddit illius sectionis; ē dextro enim brachio in dextri lateris pleuritide, ob venam æzygos, aut sine pari, quæ ē directo est: ē sinistro in sinistro, tum ob intercostalem, quæ osculis ramorum venæ æzygos in sinistrum latus perreptantem copuletur, tum ob naturæ conatum quæ sese ita exonerare solet, numquam ē directo. Dehinc autem proposita Vesalii opinione, quam nos superius adduximus, semper siue dextrum, siue sinistrum latus afficiatur, mittendum esse sanguinem ex dextro, præterquam si in tribus, aut quatuor superioribus sinistra partis costis inflammatio sit, tunc enim ex sinistra axillari; hanc opinionem refutat, ostenditque anatomicam rationem à Vesalio propositam, nullius esse momenti: non enim ratione venæ æzygos, aut sine pari dictæ, in dextra parte reptantis, quā transire dabeat sanguis in sinistra parte inflammatus, ibi tundendam esse venam, cum eadem vena æzygos, quem recipit à caua vena sanguinem, non amplius ad eam remittat, ita enim suis osculis venæ cauæ coniunctis fabricata cernitur, ut ei illud eueniat, quod vesicæ vrinariæ, aut cordis vasorum orificiis: id autem ita esse experimento probat, nam si venam cauam in parte superiori quispiam secet, & fistula in eam intromissa, inferiorem versùs partem sufflauerit, tota ipsa caua vena in parte inferiori simul cum vena sine pari inflatur, ac tumida euadit; at si venam eandem æzygos parte inferiori secemus, immisissaque fistula, ore ventum sursum propellamus, sanè vena caua non inflatur, nec tumida euadit, quòd aër in venâ sine pari còtentus exire non possit. Si autem aër à vena sine pari ad cauam non deriuatur, multò nuniùs sanguis aëre compulsiore refluere nò poterit. Igitur eiusdem lateris secandam venam dicit: cuius rei aliâ etiam subucir anatomicam rationem; nam inter axillarem, & cephalicam venas, quæ à caua ascendente exoriuntur, prope iugulum ab utroque latere venam quandam mediam esse ex axillari ferē enascentem, quæ inde obrepens

in multas finditur venulas, quæ in vniuersum cum ramusculis, & venulis sine pari copulentur nutrientibus octo costas inferiores; Ita cum iecoraria in pleuritide pertunditur, sanguinem non tantum in vena caua contentum educi sed illum potissimum, qui in inflammatione continetur, aut est prope inflammationem; præcipue quidem si morbus octo costas inferiores occupet, sed multo magis si quatuor superiores, quod cum his magnam habeat axillaris vena communionem. Hæc eadem propè omnia habentur apud Amatum Lusitanum centuria prima curationum medicinalium in scholiis curationis, sic iisdem ad eod sententiis, & verbis, ut alterum ab altero desumpsisse certo appateat. Hic igitur Amatus, etsi lateris affecti venam tundendam existimet, sicuti Brissotus, & alij, illam tamen villorum aut fibrarum rectitudinem, quam ad sanguinis attractionem, dum aperitur vena, maximè facit, & Brissotus, & Fuchsius, & alij, ipse deridet, & nihil conferre existimat. Tum Vesalij opinionem refutat, eadem à nobis paulò antè ex Hollerio allata responsione, quod ob ostiola apposita venæ sine pari, quæ caux coniungitur, aperta quidem ad sanguinem recipiendum à caua, clausa ad eum remittendum ad cauam, ut in vesicæ vinariz, aut cordis vasorum orificiis apparet, regressus hic fieri non possit; appellat autem illa, & ostiola, & opercula: nihil tamen ita nominat Hollerius, licet eandem rem dicat; ita autem se reperisse scribit Amatus in duodecim cadaueribus anno M. D. x l v j. Ferrariz dissectis, magna doctorum hominum spectante concione, idque etiam adnotatum fuisse à Ioanne Baptista Canano insigni anatomico. Tum quæ de vena illa media inter axillarem & cephalicam ab axillari ferè enascentem, ex Hollerio proposuimus, hic etiam omnia habentur, quibus ad indicandam huius venæ cum vena sine pari communionem, addit præterea experimentum Amatus. Si enim venam hanc inter axillarem, & cephalicam in iugulo enascentem quispiam secuerit, & cannula, siue fistula sufflauerit, non solum ipsam attolli, & inflari, sed simul etiam ramulos eius, atque ramulos venæ sine pari, costas octo inferiores alentes, quod etiam eueniat cum iecoraria secatur, & fistula hæc quoque inflatur. ut pleuritis omnino causa videatur à natura media hæc vena fuisse fabricata: talem autem venam Vesalio fuisse quidem antea ignoram, quò de pleuritide dogma illud inuexit, deinde autem in laboriosissimo, & admirando de anatomia libro depictam, sic ut quodammodo à prima opinione deflexerit. Cæterum hic ipse Amatus post aliquot annos eundem locum tractans, centurie quintæ curatione septuagesima, cum eandem de loco missionis sanguinis retineret sententiam, quædam tamen immutauit: ramos enim venæ sine pari coniungi, & copulari osculis venarum propagatarum à vena axillari nutrientium inernas thoracis alias partes, quod antea simpliciter proutulerat, iam ita se rem habere dicit; quod per eum modum in vno vel altero corpore ab eo dissecto, euenire obseruauerit, variis autè aliis in corporibus aliter accidere, venæ enim sine

pari ramos nō omnino iungi, & copulari propaginibus venæ axillaris in thoracis interna alta patte, sed ita oſcula oſculis eſſe propinqua, vt nō difficilis ſit tranſitus humorū, & ſanguinis ab his ad illas, vt ſi non copulatur, copulari tamen, & coniungi videantur, quā rem in omnibus ſerē coſpicere liceat, & ad id conſtituendum autoritatē etiam ac teſtimoniū adducit literarū Bartholomæi Euaſtachij; quod verò facit ad priorē opinionē de loco miſſionis ſanguinis in pleuritide, illam præterea rationibus aliis anatomicis conſtituat, proponens adhuc alios conſenſus ramorum venæ ſine pari cum axillaris, vt apud ipſum videre eſt. Verū illa Amari oſtiola, aut opercula, quibus prohiberi dieit, ne à vena ſine pari reueet ſanguis in cauam, irridet Gabriel Fallopius in obſervationibus anatomicis, neque à Canano viro ſolidæ doctrinæ, fieri poſſe vt talia oſtenſa ſint, quæ nulla ſunt, niſi ſottaſſe per iocum, vt Amatum, & qui cum Amato erant deluderet, pro tempore à Canano illa ſint prodita; coſenſum tamen venæ ſine pari cum axillari concedit, ab axilla enim prodire venam ab Amato propoſitam, cuius tres, vel ad ſummum quatuor aliquando rami iungantur cum tribus, aut quatuor propaginibus venæ ſine pari, nimirum inter tertiam, & quartam, quartam, & quintam, quintam & ſextam, & inter ſextam, & ſeptimam: infra autem ſeptimam, aut ſupra tertiam, ſe taleſem connexionem nunquam reperiſſe, ſæpe autem vnum tantum, aut duos omnino. Proponit autem idem Fallopius in eiſdem obſervationibus maximum per varias propagines conſenſum venæ ſine pari cum venis, quæ infra vmbilicum ſunt, vt colligi facile velit, maximum ſectam venam in poplite, in pleuritidis curatione aſſerre adiuumentum. Viſtor Trincauellius non eandem perpetuò initio huiuſce morbi tundendam eſſe venam exiſtimat, ſed pro vario corporis habitu, & conditione, quæ varias medico offerunt indicationes, modò hanc, modò illam magis, quippe nō ſolam particulā, quæ inflammatione tentatur, ſed illas poriffimum à quibus fluxio fit, vnde inflammatio pendet, conſiderare neceſſe eſſe: hæ enim euacuandæ ſunt, quo fluxio ſerri deſinat, & ita reuulſionem fieri, quæ in inflammationum initiis maxime præcipitur: ſi igitur vniuerſum corpus ſit repletum, aut præcipue eius partes, ab iſque ad locum aliquem fluxione decumbente, gigni incipiat inflammatio, corpus ſanè vniuerſum, præcipueque partes tanquam morbi cauſa, primū omnium ſunt exinaniendæ: tunc igitur non venam quæ inflammatam partem præcipue reſpicit, primū eligendam; ſed quæ vniuerſum corpus, aut partes quæ repleta ſunt, ita pro ratione multitudinis, & locorum, quæ repleta ſunt, atque inde ratione magnitudinis inflammationis, quæ ex redundantia humorum, qui fluere poſſunt, dependet, modò hanc, modò illam venā ſecat; concludit igitur, vbi maxima eſt plenitudo in toto, & in partibus inferioribus, quæ maximam reuulſionem poſtulant, quæ ad maxime longinqua, & maxime contraria ſit, venas pedis ex eadē parte incidēdas eſſe, ſi mediocris plenitudo, aut totius,

ut plenum, & maxime præcipuarum partium, venam cubiti oppositis; si autem nulla, aut exigua sit corporis vniuersi plenitudo, ex qua nec timeamus inflammationem euasuram in magnam, quæ fontem solū habeat à vicinis partibus, satis esse secare venam in cubito eiusdem lateris: illam quippe satis posse euacuare particulam inflammata, & proximam à quibus inflammatio pender. Si igitur ex suppressis mensibus, aut retentis puerperis, aut cohibitis maricis, fiat pleuritis, inferiores venas eligit Trincavellius. Vnde in sententiam Auicennæ, & Arabum cum magis concedere video; & si ille existimet, non dissidere Galenum, aut Græcos alios, sed ab Arabibus rem magis distinctè propositam, cum Græci locum tantum inflammatione affectum considerent, Arabes loca etiam ex quibus lata fluxione augetur inflammatio. Quod autem ad *κατ' ἴσιν*, seu ad rectitudinem pertinet, fibras aut villos nunquam memorat; solam lineam rectam, aut diametrum, ut Auicenna loquitur, in medium adducit. Franciscus Vallesius commentario ad quartum librum de ratione victus in acutis, proponit, Auicennam & alios ferè omnes Arabes ex contraria parte secuisse venam, multis autem agitata questione, iam ferè omnibus ventum in sententiam Græcorum, secarique iam vbique in brachio lateris affectu; de suo nihil aliud assert. Argentarius commentario ad Aphorism. vigesimum primum primi libri, ex eiusdem lateris brachio mittit sanguinem, idque reuulsioni verticis, & præcipue causæ hanc enim esse solam veram reuulsionem, non oppositum secare, cum hæc sit rectitudo, nimirum dextrarum partium cum dextris, & sinistrarum cum sinistris, nullo autem pacto dextrarum cum sinistris, & sinistrarum cum dextris. Hieronymus Capiuaccius cum Auicenna omnino sentit, cuius hæc de re sententiam pluribus etiam explicat, dicit enim, ab Auicenna ideo proponi illas venas secandas, quia sanguinis simplicem subsistentiam, ut loquitur Capiuaccius, considerat. Accidere enim interdum, ut corpus vniuersum sanguine sit repletum, quare cum sanguis in partibus inferioribus contineatur, & infra iecur, merito probari sectionem saphenæ, & cum sanguis contineatur etiam in partibus superioribus circa iecur, ad partem tum dextram, tum sinistram, rectè secari venam vtriusque brachij: ideo autem prius saphenam tundi, tum brachij oppositi, & postremum eiusdem lateris, non sanè quod ita perpetuò sit agendum, sed cum vel huius, vel illius auxilij indicatio apparet: si enim materiam quæ fluxit, & pleuritidem concitauit, est exigua, quæ autem adhuc fluit & fluxura conicitur, copiosa, tunc ab hoc sanguine indicatione sumpta, quæ magis viget, non eiusdem sanè lateris debuisse ab Auicenna secari venam, sed alias; cum igitur hæc duplices sint, altera brachij oppositi, altera saphena; cum repletum est corpus, & dolor exiguus, ad maiorem & efficacioram reuulsionem, saphenam secat, cuius sectio sufficiat aliquando, ut alia non sit opus; at si dolor persequatur, oppositi lateris secundendam, ut ab

Alio latere fiat reuulsio; quod si adhuc perseverat, tertiam venam id est, eiusdem lateris, aperiendam. Huic sententiae non aduertari Galenum, licet scriptum reliquerit, sectionem venae ab opposito latere, vel nihil, vel tardè iuuare: respexisse enim Galenum scopum qui magis vrgeret, ubi enim dolor sit vehemens, qui fomentis non cedat, sed angeatur, vel etiam ante fomenta vehemens sit, quia hinc significatur sanguinem qui fluxit, & in parte inflammata continetur, vehementem esse, maximèque posse; ideo quamprimum venam eiusdem lateris aperiendam: ex saphena enim, aut vena oppositi brachij, qui fluxit, sanguinem non ita euacuari posse, vnde in eodem inflammationis loco relicto sanguine, vel nullum, vel tardum est auxilium, quod dicebat Galenus. Ioannes Iacobus Vvecherus iinternam fecit cubiti oppositi, si adsit phlethora, & fluxio valenter irruat, aut venam tali è directo laborantis lateris, praesertim ubi hemorrhoides, vel menses detenti fuerint, si non plethoricum sit corpus, venam è directo laborantis lateris; etsi quidem oppositi brachij antea, aut tali secetur vena, quia corpus plethoricum sit, statim eodem die post propositam ex brachio opposito, aut vena tali, hanc etiam ex eodem latere aperiri vult. Vidus Vidius iunior primùm quidem reuulsione causa fecit, vel saphenam eiusdem lateris, vel iinternam, aut communem brachij oppositi, tum deriuationis ergo, internam aut mediam eiusdem lateris. Hieronymus Mercutialis tres conclusiones hac de re proponit. Prima, ubi tota materia iam influxit, si copia sanguinis adsit coaceruata ob aliquam sanguinis suppressiorem, nimirum hemorrhoides, vel menstruas purgationes, sanguinem mittendum à partibus infernis, id est, à saphena. Altera, si morbus est in initio, vt nihil materiae fluxerit, & in corpore sanguis copiosus sit sponte coaceruatus, lateris oppositi venam incidendam; quia sola reuulsione opus est, atque ita intelligendos Archigenem, Aretæam, & Arabes. Postrema conclusio, si morbus non sit in principio, sed in progressu, atque adsit plenitudo sanguinis, vel etiam si non sit insignis plenitudo, sanguinem mittere oportet ab eodem latere, sicut Hippocrates 4. acutorum, lxxij. tunc enim non solum reuellere fluentes humores opus est, sed sanguinem etiam qui influxit, & distendendo dolorem facit, euacuare. Haec postrema, quae vulgaris omnium est sententia, vera est. Prima patitur difficultatem maximam; si enim tota materia influxit, cur inferiores venae secandae, quarum sectio magis facit ad reuellendam aut deriuandam materiam, quae fluit, nihil autem euacuat ex inflammato loco, quod tunc maxime est necessarium? Quod enim ex suppressis mensibus, aut hemorrhoidibus adsit sanguinis copia, iam non tollat superioris venae sectionem, quae à repleto inflammationis loco indicatur, vt eadem copia indicat, quod concedimus inferiorum sectionum, vt utrarumque sectio fuerit proponenda. Altera autè conclusio est penitus inutilis in curationis negotio:

quis

quis enim, ubi nihil metetur influxit, medicum aduocant aut quale initium morbi illud est, ubi nulla sunt inflammationis vestigia & præseruationis gratia inde mittendum esse, & omnes dicunt, & rectè, & utilis præceptio est. Salceus Sclanus com. ad Aphorif. xxi. primi libri, fibrarum illam rectitudinem à Brissoro & Fuchio, & Vesalio valde æstimatam, nihil in sanguinis euacuatione cõferre existimat, & per κατ' ἰσχύ κατ' ἐξουσίαν solā vasorum continuationem, & societatem intelligendam putat, refellitque Vesalii opinionē, & ostendit, quomodo sanguis qui in parte inflammata continetur, secta vena in brachio, qui è directo respõdet lateri dolenti, siue sit dexter, siue sinister, (ita enim ille faciendum existimat) tum reuellatur, tum deriuetur, tandem proponens obseruationem anatomicam, de ramo illo venæ qui ab axillari prodiens, disseminatur ad musculos thoracis, & mammas per externas partes, quam venam non negari etiam à Vesalio, & dicit Sclanus, & dixit superius Lusitanus; qui ramus per anastomatum à Græcis dictam, iungitur & copulatur cum extremitatibus venæ sine pari, ita vt secta vena axillari, siue dextra, siue sinistra, euacuetur etiam sanguis à ramo, quem diximus ab axillari vtraque produci; & ratione societatis propositæ, à propaginibus illis venæ sine pari addit Sclanus, & confirmat quæ de ostiolis, aut membranulis appositis ad initia germinationis venæ sine pari à vena caua, illis similibus quæ sunt in cordis ventriculis, ratione quorum prohibetur, ne sanguis, qui à caua fluxit ad venam sine pari, possit ad cauam remeare. Hæc autem quamquam irrita à Fallopio, vt antea proposuimus, obseruata tamē non solum ab Amato, & alio peritissimo anatomico, sed ab eodem Sclano oculis percepta in anatomicis administrationibus, dum in gymnasio Neapolitano corpora dissecarentur, additque rationem Sclanus: metiri enim factum, ne sanguis qui in vena sine pari continetur, ad cauam remeare possit; quippe aliter futurum, vt perpetuo constrictionis motu, quem obit thorax, sanguis perpetuò à vena sine pari expelleretur ad cauam, & ita suo alimento destituerentur partes illæ, sicuti ad redundantiam, aut vitium eiusdem sanguinis in vena sine pari, quo posset sanguis euacuari, societate aut communiōne illa prouidit Natura, quæ illi est cum propaginibus venæ ortæ ab axillari, quarum beneficio secta vena in brachio, siue dextro, siue sinistro, euacuatur sanguis etiam qui in vena sine pari confinetur: secandam igitur in pleuritide venam existimat Sclanus, quæ è directo dolenti lateri respondet, atque ita tum reuulsionem à nobis præstari, dum prohibemus ne à vena caua redundans sanguis fluat ad partem affectam, tum deriuationem, dum euacuamus quod ad partem fluxit, & nondum ibidem finitè hæret, ratione societatis propositæ, quam habet axillaris, tum dextra, tum sinistra cum ramis venæ sine pari, qui ad nutriendas partes internas thoracis, & dextras, & sinistras sunt distributi. Hæc Sclanus. Ab eadem sententia non discedit Alexander Massaria, qui ex brachio lateris laborantis sanguinem mittit: ita enim simul, tum reuelli, tum deriuari, quod opus

sit necessarium, non simpliciter reuelli, quod fiat sectis venis in partibus oppositis & distantibus. In eandem sententiam ire quoque video Ludouicum Mercatum, qui eiusdem lateris venas statim per initia secandas esse existimat, sic enim & reuulsionem & deriuationem fieri. Anne verò alias adhuc recentiorum sententias memoro? propositæ sanè sunt, mihi quidem notæ, eorum qui illustriores sunt, nec alias inquirere necesse habeo, quæ fortasse non pauca sunt, sed obscuriorum auctorum, qui vel his, vel illis rationibus magis persuasi, vel huic, vel illi opinioni adhæserunt. Ex propositis autem pateat, non esse fortasse in tota medicina locum magis controuersum, quum tamen ita frequens, ac alius quilibet, pleuriticus morbus sit, ut per annorum sæcula potuerint saltem experimenta, ratione adhibita rei fidem facere. Atqui, & hi & illi, ad propriam opinionem adstruendam, sua iactant experimenta, ut aliter aliis effectus omnino respondisse appareat, artis incertitudinis non leue argumentum; cum illi qui per tot sæcula, varia atque adeò contraria medendi ratione hoc in morbo vti sint, celebres admodum & in scribendo, & in medicina facienda viri extiterint. Egone autem ex hac quæstione a symbolis discedam? non sanè; nec tamen sigillatim argumenta omnia persequar, refutabo, aut confirmabo: ingentis enim voluminis res esset: sed breuiter quædam tantum proponam, haud inutilia fortasse, haud ex toto obseruata fortasse. Illud primum esto, missum sanguinem ex opposito latere, haud vnquam pleuritico detrimento esse, nec alteri lateri inflammationem asferre, quod Fuchsius & alij scribunt. Cum enim per tot annorum sæcula quot antea proposui, eo modo sanguis missus sit, haud credibile, eiusmodi agtorum detrimentum ex malè adhibita curatione, diligentes, & non imperitos medicos latuisse? qui enim possit alterius semper lateris ita secta vena, suborta inflammatio non apparere? sed & Galenus libro de curandi ratione per sanguinis missionem, in pleuriticis non detrimentum, sed vtilitatem, licet omnino obscuram, aut post temporis intervallum asferre scribit. Sed quoniam, non quod minimè lædat quærimus, aut quod serò prosit, verum quod celeriter adiuuet, quod pleuritico est necessarium; ideo quis pleuritico aptus ad celerem salutem, missionis sanguinis in corpore locus est? Id sanè ex eo pendere puto, quo consilio mittatur sanguis; licet enim in pleuritide, ut in cæteris inflammationibus mittere sanguinem è vena, tum reuulsionis causa, tum deriuationis, quod in illis morbis peccans sanguis duobus in locis continetur, vel enim in loco qui est origo fluxionis, & vnde fluit, quo nomine intelligi etiam volo totum spatium, & totam viam, qua decurrit sanguis; vel continetur in loco, qui inflammatione tentatur, ad quem iam defluxit, hic autem vel sunt venæ exiguæ, ad quas de maioribus decurrit, vel spatia intermedia muscutorum, aut etiam continetur vtrobique, tum in loco originis, tum in loco inflammationis, siue sit venæ, siue spatia intermedia; qui est in spatiis intermediis, non

emittitur venæ sectione, de qua loquimur, sed scarificatione, idcirco hunc præterimus: at si secetur vena, uti emittatur qui est in parte inflammata, hæc dicitur derivatio; quemadmodum si secatur, uti emittatur qui est in loco originis, aut in cursu, vel via intermedia, quo reuocatus, & de medio itinere retractus, ad locum inflammatione reuertatum fluere prohibeatur, dicitur reuulsio: si utrobique contineatur, utrumque auxilium est necessarium. Debet autem utraque euacuatio, tum cuius beneficio derivamus, tum cuius reuellimus, fieri, ut Hippocrates loquitur, κατ' ἄνω, quod Galenus interpretatur κατ' εἶδος, id est, è directo, seu è regione, aut recto tramite: hic autem rectus trames, non aliud est quam consensus partium, & venarum sibi inuicem respondentium, cuius beneficio secta altera parte, altera etiam euacuatur cuius inauitionem querimus: fibrarum rectitudinem haud nomino, non enim puto necessariam; consensum simpliciter dico. Hic igitur partium, seu venarum consensus seu rectitudo, aliter in derivatione, aliter in reuulsione consideratur, & accipitur; nam in derivatione consideratur inter locum, aut venas loci inflammatione affecti, ac locum seu venam proximam quæ aperitur; in reuulsione autem, inter locum unde fluxionis est initium, aut loca illi proxima, & locum qui secta vena aperitur: non enim, nec in derivatione ipsimet inflammatione obfessus locus semper aperitur (quod per scarificationem facimus) nec in reuulsione ipsimet originis locus, quia non licet sepeuenero, non enim ubique licet secare venam. Ex his igitur quæ secari solent, illa eligenda quæ consensum, & societatem habeant, aut è directo respondeant; in reuulsione quidem locis unde initium est fluxionis; in derivatione, loco qui inflammatione obfessus est. Initium autem fluxionis latius accipitur, nam & ipse humoris fons, & totum spatium, aut via, quæ decurrit humor, eo nomine intelligimus. Conferat igitur ad reuellendum, tum euacuare fontem ipsum, si quis est, tum vias quæ ex ipso humore deducunt; sicuti autem fons longius distat, ita viæ propius absunt à loco inflammatione tentato: vera autem, & propria reuulsio à fonte, est ibidem secta vena, minus propriè quo magis à fonte recedimus, & ad locum inflammatarum appropinquamus: hæc enim iam derivatio esse incipit, quæ à vena proxima, & socia fit. & reuulsio quædam minus propriè dici potest. His positus, quæ & Galenica, & rationi consentanea sunt, non difficile est videre, quo loco tum in pleuritide, tum in aliis inflammationibus, seu reuulsionis, seu derivationis gratia sit secanda vena: semper enim reuulsionis gratia, origo & fluxionis iuxta querenda sunt, eaq; vena apertenda, quæ ex illis detrahatur, ita enim in contrariâ partē auertitur sanguis, quâ origo, & initium contrariū sit fonti seu termino, & morui, quo ex initio fertur humor: in derivatione autē queritur vena proxima colatens, & socia loco inflammato, uti materia inflammata qua ibidem euacuatur.

euacuetur. Igitur reuulsionis gratia, si initia fluxionis sunt in partibus superioribus ad inferiores, superiora secabimus, originis locū euacuantes, aut saltem vias, & ductus origini quidem subditos, sed inflammato loco ratione fluxionis superiores: si è dextris decurrat sanguis ad sinistras partes, dextra vbi est initium aperienda est, aut vix paulò subius initium, ita in aliis quæ opponuntur: quò autem magis prope initium aperitur, eò melior fit reuulsio, quia longius retrahitur. Tunc autem huiusce reuulsionis occasio maximè est, cum materia maximè fluit, quod solet esse per initia morbi, sicuti progresso morbo, multa que materia in loco inflammationis recepta, deriuatio maximè conducit. Igitur dum in pleuritide, quæ est inflammatio lateris, aut membranæ succingentis costas, quarimus quæ vena aperienda, primum videndum, quod aërea proposui, vtrum reuellere, an deriuare nobis consilium sit: si igitur reuellere, id est, prohibere ne sanguis ad latus fluat, initia fluxionis consideranda sunt, & locus quæ fluit, vt inde per euacuationem reuocetur; quare si à capite ad latus, seu membranam succingentem costas, per iugulares, & alias deinceps decurrat sanguis, ex capite & iugularibus detrahendus sanguis, & quoniam frontis vena non est opportuna, & iugulares cum periculo secantur, idcirco exterior in brachio, quæ & cephalica dicitur, commodè scindetur è directo lateris affectu, quoniam maximè putandum ex respondente parte capitis ire fluxionem ad latus, inde autem auferendus è capite est, vbi peccat: quamquæ reuulsionis à capite gratia, nò multū fortasse intersit, vtrasecetur, cephalica dextra an sinistra, cum ex iugularibus in caua vena admisceatur sanguis, ex qua deinde exoriuntur cephalicæ vtræque: si autè in partibus inferioribus humorum multitudo sit, ab iisq; digressus sanguis, ad latus aut membranam succingentem resiliat, quod affecto vtero per mensium suppressionem contingere solet, aut recentis hemorrhoidibus, eo casu reuulsionis nomine venæ in pedibus erunt scindendæ, ex ea parte qua fuerit dolor in latere, vti de capite diximus, ibidem enim similiter in vtero esse affectionem coniectandum est, indidem autem euacuandum; alioquin etiam vtriusvis ex cruribus sectum, vterum possit exinanire, & initia fluxionis euacuare, & reuellere à latere, & partibus superioribus: sunt autem, vt ab vtero euacuemus, hæ venæ opportunæ, nec ad exhauriendam illam partem aliæ nobis dantur: hæc tamen euacuatio, ratione vteri ipsius est deriuatio, & ita à Galeno appellatur; ratione lateris est reuulsio. Si autè vtròque, id est, tum in superioribus, tum inferioribus partibus, aderit multitudo, & vtrinque materia decurrat, vtròque scindetur vena. Quòd si in superiori parte venæ caux ad iugulū, & inferius etiā ad eandē venā, & locis proximis sanguis redundet, vnde impetu factò, siue ad dextrū, siue ad latus leuū declinet, oppositæ partē secabimus, contrariū motum opponētes; etsi enim nò multū fortasse referre videatur ad reuellendū, vtrasecetur, cum ibidem in vena caua mixtus, & per totum

confusus videatur sanguis, trahere tamen quo plus fieri possit ad contrarium, & aduersum motum opponere, prodesse aliquid possit: itaque si ad læuas moueatur sanguis, & vel per venam à caua proximè enatam, nutriendem tres aut quatuor superiores costas, in superna hac lateris parte ibidem inflammationem concitaturus, aut aucturus excipitur, vel per axillarem & eius ramum, aut ramos, qui copulantur cum propaginibus ramorū venæ ἀξίλων, aut sine pari, à dextra parte prodeuntium ad alias octo aut nouem costas inferiores decumbit, quam defluxionis viam considerabilem, cūm haud consideraret Vesalius, nouum dogma antea propositum inuexit; si sanè ad læuam, vel hanc, vel illac mouetur sanguis, basilicam dextram apericiemus, longissimè ad contraria fluxionis initia retrahentes; etsi utilis etiam admodum esse possit sinistra sectio, cūm hinc etiam origo sit fluxionis, & ad inferiorem adhuc longè partem materia decubitura; sed quoniam, tum in tribus, aut quatuor superioribus eiusdem lateris costis, tum in reliquis eiusdem octo vel nouem fieri posset inflammatio, si in superioribus, reuulsionis gratia maximè prætulerim propositæ sectionem, quoniam fluxionis motus hanc viâ est concitator, cūm aditus à caua ad hanc sit paratior: non ita si inferiores octo aut nouem tententur, quoniam hanc non potest sanguis multum concitatè ferri, reuulsio autem quam in praesentia quaerimus, concitati motus maximè gratia quaeritur. Itidem si ad dextram partem à vena caua proposita mouetur sanguis, vel per parem venam nutriendem tres, aut quatuor costas superiores eiusdem dextri lateris, vel per eam quæ est sine pari, nutriendem reliquas octo aut nouem, reuulsionis gratia sinistra basilica erit aperienda, eadem ratione maiorique adeò utilitate, quòd utrobique ad excipiendam faciliè fluxionem aditus pateat; etsi dextræ etiam apertio non parum conferat, quod, uti diximus, hanc etiam moueatur sanguis, & reuulsio itidem hæc sit, licet non adeò perfectæ. In hac autem sanguinis emissionem, coloris mutatio minimè est expectanda, quippe non assatum sanguinem, qui inflammationi hæret, euacuare nobis consilium est, sed qui extra inflammarum locum in fluxionis origine est, reuellere, id est, prohibere ne fluat: huius verò mutari colorem non est necesse; quare qui reprehendunt oppositi brachij sectionem, quòd sanguis bonus euacuatur, viciato in inflammatione relicto, cūm vera dicant, malè colligunt, hac quidem ratione eiusdem lateris venam esse rescindendam, non enim vitiosum in parte inflammata collectum ea sectione auferre, sed fortasse bonum sola quantitate peccantem, ex locis haud affectis euacuare, ne fluat. Ita igitur, ut puto, reuulsionis nomine mittendus est sanguis in pleuritide. At deriuationis gratia, id est, ut materia iam in loco inflammationis recepta, vndeunque fluat, euacuetur, quod spectare solemus iam progressio morbo, vicinam partem & sociam, ac inflammationi communicantem eligentes, secabimus internam brachij ex illa parte, qua dolor affligit;

affligit; non enim alia datur proximior & consentiens, quæ secari possit, cuius beneficio inflammatus sanguis euacuari possit. Id spectauit Hippocrates secundo de ratione victus in acutis text. decimo; euacuari enim voluisse sanguinem in inflammatione contentum, ex eo apparet, quod copiosè euacuari voluit, donec color immutaretur, sic vt rubidior multum, vel pro puro rubido liuidus fluere, nam vt in contrario scribit Galenus, sanguis qui in phlegmone continetur, caloris abundantia permutatur, si enim qui in totum spargitur corpus, pituiosior existat, rubicundior erit qui in inflammatione continetur; si autem rubidus qui in totum corpus est diffusus, sanè qui ad phlegmonem est, adustus & assarus, in nigrum permutabitur; liuidus autem, in ea transmutatione quæ fit à rubido ad nigrum, medium locum obtinet. Si autem reuellere, aut retrahere fluenter, & nondum inflammatum sanguinem voluisset, non erat cur coloris mutationem expectaret Hippocrates, cuius sententiam cum sequatur Galenus, idem similiter propositum habuisse existimandum est libro de curandi ratione per sanguinis missionem capite decimo quinto, quo affecti lateris in brachio venam secuit: deriuant igitur, & Hippocrates, & Galenus, cum ex affecti lateris brachio sanguinem mittunt, est enim societas venis nutrientibus costas dextras cum ramis basilicæ dextræ, & nutrientibus costas sinistras cum ramis sinistræ, neque proximior datur vena, cuius sectione ex inflammata parte educi sanguis possit. Quamquam autem deriuatio dicatur, & sit, quod sanguinem euacuet, non qui mouetur, & fluit, sed qui in parte receptus est, non tamen impactus, cui deberet scarificatio, reuulsio tamen hæc, euacuatio appellatur etiam aliquando à Galeno, reuulsionis nomine latius sumpto; cum enim secta interna brachij, euacuetur sanguis qui continetur in vena caua, & faciliè semper fluit ad latus, hoc nomine dicitur reuulsio, quod etiam paulò antè attigimus. Reuulsionem ita appellauit Galenus secundo de ratione victus in acutis, text. decimo, scribens de pleuritide, vbi superiorum partium condolentia indicauerit, venam in cubito illam esse secandam, quæ sanguinem ab affecta parte, & magis, & velocius, tum reuellere, tum euacuare possit; sed & supposuit fortè hoc loco Galenus, originem morbi & initia fluxionis esse ad illas venas; reuulsio igitur non propriè est, vt puto, sed mixtum quoddam ex reuulsione, & deruatione, sicuti etiam reuulsionem appellauit Galenus, in doloribus capitis posterioribus, sectionem rectæ in fronte venæ, quam præcipit Hippocrates quinto Aphorismorum; & missionem sanguinis in occipite cum cucurbitula in oculorum diuturnis fluxionibus; cuius vsu cum sanatas diuturnas illas fluxiones dicat, sintque hæc localia auxilia minimè approbanda initio morbi, reuulsiones propriè dicendæ non sunt. Liquidius etiam secundo in sextum Epid. particula xxxij. reuulsionem latius accepit, cum

diuersionem ab oculis ad palatum, reuulsionem dicit per hæc verba: *Auxiliorum reuellentium hæc una quedam species est, ipso nobis consilient, diuersionem oculorum fluxione traducere ad fauces, videlicet per acra medicamenta reuellentibus, quibus palatum iungere, atque gargarizare iubere conueniet.* Reuulsionis igitur gratia, aliquando in pleuritidis initio ex affectu lateris brachio mittitur sanguis, deriuationis autem ex eodem frequentissimè, sicuti mixti etiam operis ratione interdum. Contingit autem aliquando, ut licet reuellentium usus præcedere debeat, deriuantibus, adcoque ex distant, & opposita parte venæ sectio, in pleuritide prius in usum reuocari debeat, cum à distant parte initium fluxionis est; omnia tamen hac deriuationem molimur ex affectu lateris brachio, cum dolor vehementius urget; quod ex Hippocratis præcepto fit vj. Epidemiorum, per illa *καταχρῆταις ὑποζώων, ἀντιστῶν ἀπὸ τοῦ ἀντιπλευρῶντος ὑποζώει*, hoc est, deriuare cedentem, retrahere statim, renitenti cedere; in quorum explanauone hæc habet Galenus: *Negue enim semper in retrahentibus auxilium permanendum est, sed aliquod tempus, quod retrahentibus vacet, interponere oportet, ut succum qui in affectu membro prius inhaeserit, excerni permittamus: in membro enim remanens ipsum bisariam coarctabit, & multitudine distendens, & qualitate discrucians. At si humores in particulam prius illam exire permiserit, ipsam dolore liberabis, faciliusque reuulsi: auxilium aliquod proficies, non amplius in se ipsum membro propter dolorem succo proripiente, ultra eam quam à principio non rectè acceperant, inclinationem. Quauquam autem hæc verba Galenus reuellentia in dolorum curatione præire manifestò significet; cum tamen irruentibus adhuc humoribus deriuationem adhibendam suadeat, tanquam auxilium præuertendum, ut reuulsio magis proficua deinde sit, cui non appareat, etiam non præteritis reuulsorij auxiliis, ob eandem rationem deriuationi locum esse? Vbi igitur in pleuritide maximus erit dolor, argumento membranam esse repletam, & à morbofo humore vexatam, statim à lateris affectu brachio deriuationis gratia mitti sanguis debet, quacumque à parte ad eandem membranam sanguis fluat. Idem etiam colligatur ex illis eiusdem sexti Epidemiorum verbis, *ὁ δὲ πρῶτον τῆς ὑγγίστης κοιλίας καθίρει, αὐμαρτὸς τε κοιλίας διακίρει*, id est, in doloribus proximum ventrem purgare oportet, sanguinis ventrem rescindere, ad eum scilicet finem, ut dolor qui ex sanguinis multitudine distendente, & qualitate affligente creatur, humore eodem exhausto, & extra corpus emissio sedetur. Nec verò commendū est, quod nonnulli scribunt, secta vena in brachio lateris affectu, illuc sanguinè trahi, illis enim generatim respondet Celsus lib. 2. cap. 9. de sanguinis missione, per hæc verba: *Admitti vero his sanguis debet, si minus corporis eam sit, ex brachio, si partis alicuius, ex ea ipsa parte, aut certe quā proxima, quia non ubique mitti potest, sed in temporibus, in brachio, iuxta talos.* Neque ignoro quosdam dicere, quā longissimè sanguinem inde ubi laedit esse mutandum: sic*

enim averti materia cursum : at illo modo in id ipsum quod gravat evocari : sed id ipsum falsum est : proximum enim locum primò exhaustit , ex ulterioribus autem eantis sanguis sequitur , quatenus emittitur ; ubi ie suppressus est , quia non trahitur , ne venit quidem . Particulatim autem de pleuritide illud adiici possit ; non lateris dextri , aut sinistri ipsum affectum locum esse qui scindatur , quem scarificari prohibet Galenus libro artis medicinalis , ne plus sit quod ratione doloris attrahitur , quàm illud quod euacuatur , sed leuiter aperiri partem , sociam quidem , nec longè distitam ; sed tamen aded , vt reuulsionis nomen euacuatio illa etiam merere possit , aut mixti operis sit , vt per initia illi locus aliquando , atque etiam sæpe esse possit , quemadmodum etiam aliquando oppositam , & valde procul distitam à latere affecto partem , necessarium scate esse diximus .

De causis paralyseos suspectus Galeni locus perpensus , & declaratus , ac Auicennæ non dissentire ostensus . Paralyseos causa à recentioribus quibusdam adducta , refutata .

CAPVT XXIV.

CUM proximam , & continentem causam ¶ *Galēus* , quæ Latine resolutio dicitur , & nihil aliud est , quàm priuatio sensus , aut motus , aut vtriusque in aliqua , aut aliquibus corporis partibus , inquireret Galenus libro primo de symptom. causis capite quinto , ita scribebat , vt quidem vult Linacer : *Ac continens quidem , siue consentia , siue proxima , siue quomodocunque alio vocabulo libeat appellare , huius symptomatis causa , est talis quispian in verno affectus , cuius occasione à principio ad ipsum virtus transmitti prohibetur . Porro prohibetur , siquidem meatum aliquem nervus habet , qualem qui ad oculos descendunt manifestè habere cernuntur , vel ex obstructione , vel compressione ; si autem non habet , ex constipatione , vel frigore , vel compressione .* Quod hic dicit Linacer constipationem , & Græcè est *πύκνσις* , melius fortasse dicatur coactio , aut densatio , aut etiam crassificatio : sed consideremus locum Galeni ; si nervus cauitatem habet , proponere videtur Galenus causas duas , seu duos affectus , obstructionem , & compressionem , ex quorū alterutro angustia facta , impeditur transitus animalis facultatis ; si autem non habet , tres , stipationem , (quam nos coactionem , densationem ; seu etiam crassificationem dici melius putamus) compressionem , quæ similiter nervo meatum habente propoita fuit , & est vtriue communis , atque etiam frigus . Obstructio igitur tantum recipiendi , ubi nervus cauitatem habere intelligatur , compressio , siue habeat , siue non habeat ,

habeat, coactio ac frigus priuatim, vbi nō habeat. Sanē autem non video, quare duę hę causę; densatio. & frigus, separati & distincti, alteręque ab altera proponantur, cū à frigore densatio sit, illudque huius causę; vt qui à densatione, seu coactione, aut stipatione paralytum fieri dicit, ille à frigore eandem fieri, non habeat necesse dicere, nisi eiusdem densationis particulares magis causas explicet, quod etiam apparere possit ex eiusdem Galeni verbis, declarans enim quomodo ex illa densatione, quara *πλησυν* dixit, fiat paralytis, scribit id contingere, cū nervus crassiores, & duriores quā pro sua natura, habitum seu conditionem suscepit: id verò contingere duplici ratione, vel quia nutritus sit viscidis, & crassis succis, vel quia sit coactus à violento frigore; quomodo igitur duas illas causas tanquam ex æquo ponit? Profecto si locus non est corruptus, quod tamen vt suspicor facit antiqua tralatio, quę manifestē hic mendum continet, frigoris autem vestigia nulla) dixerim coactionem, seu densationem, & frigus esse posita tanquam synonyma, vt posterius prioris esset explicatio. Igitur causę tres ponuntur à Galeno affectionis nervi, ex quibus impediri virtus possit ne feratur, obstructio, compressio & densatio, quarum aliqua necessariò interuenire debeat, vbi paralytis gignitur. Ceterum Auicennas, haud dicam, an dissentiens à Galeno, an imperfecta absolvens, an sensa illius non percipiens, paralyticos causas aliter distinxit, & eum morbum fieri dixit, vel quia facultas non fertur ad membra, vel quia licet feratur, membrorum vitio non suscipitur, id autem hisce verbis ipse protulit. *Destructio sensus, & motus fit, quoniam spiritus sensibilis, aut motuus, aut retineitur à penetratione ad membra, aut penetrat, sed membra non suscipiunt eius impressionem propter complexionis corruptionem.* Sanē autem cur prohibeatur ferri spiritus, causas fere affert quas Galenus, oppilationem, constrictionem, & compressionem: ac videatur fortasse in Galeni dictis alterum membrum desiderari, quum fertur quidem spiritus, sed ob deprauatum temperamentum spiritus efficacitas non suscipitur à membro. Dicimus, quòd Auicennas pluribus & distinctius exprimere voluit, fortē vt euidētius faceret, minūs subtiliter proposuisse, & fortasse obscurasse magis, cū ipsum idem totum oratione sua liquidò comprehendat Galenus. Nam quod ait, paralytum fieri eo quòd prohibeatur facultati trāsitus, prohiberi autem ob nervi affectionem, quę est, vel obstructio, vel compressio, vel densatio, eo sanē omnia continentur ab Auicenna proposita: si enim spiritus penetrat, vt ipse loquitur, aut eius interpret, membra autem non suscipiunt eius impressionem, propter complexionis corruptionem, profectò hæc corruptio temperamenti membri, potissimū pertinere ad nervos illius membri, qui nervi spiritum illum erant recepturi, vnde membro fiat sentiendi, aut mouendi facultas; hæc autem temperamenti corruptio, non est aliud quā ille affectus à Galeno propositus, obstructio, compressio, & densatio, etiam ex Auicennę dictis, qui corrupti affumat temperamentum ab intemperie non calida, aut sicca, sed frigida,

aut

aut humida; obstructio quippe à Galieno propofita est ab humore frigido, nec minùs compressio, & densatio à frigore, seu frigida intemperie: membri autem temperamentum corrumpi, paralyfimque inde gigni nimimè corrupto nerui temperamento, ex iis est quæ fieri non poffe credam. Igitur affectus propofiti funt, qui femper paralyfim gignunt, modò tamen pertinent ad neruos iuxta eorum initia, cerebrum, aut spinam, modò ad eorundem portiones seu exiliores propagines, quæ mufculis inferuntur, & ad cutim etiam diffunduntur, fic vt nomine nerui intelligamus etiam neruofa corpora, quæ nimirum tenuiffimos neruos habent, ficuti cutis est, cuius nullam rermè lumere partem est, quæ exiguis neruis careat: cum igitur exiles hi nerui, seu neruofa corpora, propter obstructionem, compressionem, aut densationem, facultatis sentientis aut mouēis vim fufcipere non poffunt, fenfu, aut motu priuatur membrum; id autem est quod dixit Auicennas, membrum propter complexionis corruptionem fpiritus penetrationem fufcipere non poffe: illæ enim caufæ, membri cuiusque neruofum temperamentum, frigore aut humore corrumpūt, vt diximus, atq; ita ad easdem caufas reuoluimur, nec in Galeni dictis quicquam defideratur, quinimo proximius cauffas affectus propofuiffe dicendus est. At verò alia adhuc ratione paralyfim gigni poffe, auctores nonnulli funt qui proponāt, nimirum fonte fpiritus defecto, quod contingat ob aliquam cerebri intemperiem, aut alios morbos: aut fi in fe ipfa contrahatur facultas, quod in cerebri vulneribus ex contufionibus accidere fcribit Galenus vij. Aphorifm. lviij. Dicimus, vbi fpirituum fons, id est, cerebri ventriculi fpiritus careant, non paralyfim, fed apoplexiam gigni, quippe qui nulli funt, non poffunt ad aliquod ex membris mitti, indeque totius corporis refolutio, & mors fubita fequitur. Porro autem fi fortè exigua adfit fpirituum copia, rationem non video, cur ad hanc partem magis, ad illam minùs mitti debeant, vnde huius, non illius partis contingat paralyfis; nifi id fortè loci distantie ratione fiat, quo cafu pedes aut crura id pati poffent, vt in proximis morti accidere videmus. Cæterum fpirituum penuria in cerebro, ftuporem magis in toto corpore, quàm paralyfim alicuius partis efficiat, defectus autem ex toto, paralyfim totius, quæ mihi quidem est fortiffima apoplexia, ex qua fubita mors. Cerebri igitur morbi fimplici-ter, non magis hanc quàm illam corporis partem lædent, nifi origines ipfæ, seu initia neruorum particulatim afficiantur, tunc enim partes læduntur, ad quas & initio nerui descendunt; ita verò ad neruum res pertinet, & ad Galeni opinionem reuoluimur. Hippocratis Aphorifmus non de paralyfi, fed de apoplexia intelligitur, quod ex Galeni commentario patet, qui nomine aphoniz, seu vocis carentie, intelligi dicit amiffionem etiam fenfus, & motus in vniuerfo corpore, quæ est apoplexia, eam fieri ex cerebri concuffionibus manifeflum est.

Varia ex Galeno febris definitiones aut descriptiones: febris naturam caloris non quantitate, sed qualitate constare. Tralliani de eadem re opinio. Ad Galeni definitiones adnotata quedam, cuiusdámque loci tentata correctio. Alexandri Aphrodisiensis & Auicenna febris definitio allata.

CAPVT XXV.



CVM Galenus ad naturam febris explicandam, variis locis varias eius definitiones, aut descriptiones attulerit, semper quidem naturam attingit, at ex toto, quantum medico vsui sit, absolutam semel eius definitionem, aut descriptionem minimè proposuit; quod tamen fecisse Auicennas existimatur initio quarti libri. Nos porro tum Auicennicam illam, quam multò antiquiorem esse ostendimus, tum Galeni loca plurima, quibus febrem definire, aut describere conatus est, hoc capite afferemus, & ad singula quedam adnotabimus, ex quibus febris natura maximè dilucidabitur. Igitur ad hanc rem pertinentia obseruavi apud Galenum loca nouem, quæ deinceps sigillatim referam. Primus est libro secundo methodi capite ultimo: *Febris est calor adeò auctus, ut occasione eius corpus labores, nec probe fungi actione possit.* Alter, libro de causis morborum capite secundo: *Febris est quodam totius corporis immoderata caliditas.* Tercius, primo de differentia febriū capite tertio: *Febris est quando in corde quodam præter naturam caliditas generatur.* Quartus, in librū Hippocratis de fracturis commentario tertio: *Febris naturam nihil aliud est quam igneus calor.* Quintus, octauo methodi capite primo: *Febris est calor adeò immodicè auctus, ut & hominem offendant, & actionem ledat.* Sextus, primo de ratione victus in acutis particula xvij. *Febris ortus est conuersio natui caloris ad igneam naturam.* Octauus, primo Aphorismorum xvj. *Febris est conuersio natui caliditatis ad igneam.* Nonus, secundo de naturalibus facultatibus viij. *Febris est caloris naturalis immodica quantitas.* Singulæ igitur hæ definitiones expriment formam aut naturam febris, qui est calor nature alienus: sed aliæ exprimūt nomine qualitatis, sicuti cum dicitur, calor igneus, calor præter naturam, aliæ nomine quantitatis, sicuti calor acutus, totius corporis caliditas *αυετος*, id est, immoderata, seu mensuram excedens: auctio enim propriè pertinet ad quantitatem, & mensura propriè de quantitate dicitur: Veruntamen quod in ea definitione proponitur de calore haud naturali, illud propriè ad qualitatem, non ad quantitatem pertinet, notiaque

noxiâque & infesta caloris qualitate, non eiusdem quantitate modum excedente febris natura constat; libro enim tertio de praesagione ex pulsibus capite secundo, cum duplicem statuat speciem calorem, alterum à putredine humorum genitum, cuius qualitas sit actis & fumosa, alterum cum humiditate suavi, quantitate sola à naturali statu discretum, quorum ille quidem constans, & agrè solubilis sit, hic non diuturnus, ac sequi solet balneas, exercitationes, cibum calidum, vini potum, animique affectus, iram, & verecundiam: in hoc altero caloris genere, utrum febres aliquæ sint, ut illæ quas lassitudo, vel feruor, vel frigus, vel bubo, vel ira committit, controversum esse dicit: hæc porro febres sunt ex diariarum genere; tanquam de aliis minimè controversum sit: sed & commentario quarto in sextum Epidemiorum particula x v. asseuerantiùs etiam idem affirmasse visus est; ibi enim duplici similiter calore proposito ex Hippocratis sententia, quorum alterum ingenitum ipse vocaret, essentiam in sanguine, & sanguineis visceribus repositam habentem, alterum verò genus acte, mordax, & igneum, quod sæpius diceretur acquisitum, interdum non naturale, nonnunquam & præter naturam, sub quo genere febris etiam comprehenderetur; qui hoc affluerent scribit Galenus, illos statim ac densata cutis esset, febrî vexari solitos, eos autem, qui altero calido vberimè abundarent, suppressa distillatione pleniores quidem fieri, sed in febrim non incidere, ea scilicet occasione; idcirco quæ suprâ recitata sunt de febrî, aut de calore illo, non inuibus ad quantitatein propriè pertinentibus, illa per abusionem dicta esse existimare licet, sicuti & alibi contingit. Quod ipse etiam Galenus adnotauit libro primo Aphorismorum xiv. cum enim dicimus febrim magnam, aut paruam, intelligimus vehementem, aut mitem, quæ nomina qualitati explicanda magis propria essent: & hoc modo etiam, licet durius videatur, quod tamen non est, accipiendum est quod vltimo loco fuit propositum ex secundo de naturalibus facultatibus, febrim esse caloris naturalis immodicam quantitatem: non enim intelligit natiui caloris vbertatem & affluentiam esse febrim, quod negauit locis recitatis, sed caloris natiui *πλεονεξίαν*, hac enim voce vtitur Galenus, quam commodiùs hoc loco, ut existimo, vertamus, excessum, aut exsuperantiam, quàm immodicam quantitatem, ut facit Linacer; quum autem dicimus excessum, aut exsuperantiam, ita de qualitate, ac de quantitate intelligere licet: profectò si caloris tantum dixisset Galenus, non addito naturalis, res omni caretet difficultate, idem enim esset, ac cum dixit calorem auctum; sed tantundem est: qui enim augeri dicitur calor, ille semper naturalis est, sed cum ita augetur, ut immutetur, & deficiat à natura sua, illa febris est: patet illa ex Galeni verbis eodem loco: proximè enim superiùs scriptis, cum de eadem affectione loqueretur, appellauit eam *ἡ θερμαντικὴ πλεονεξία*, caloris excessum, aut exsuperantiam, non addita voce, naturalis; Et paulò post, eandem appellat

dispositio, & res facta, ac ex numero permanentium, non in fluxu naturam sortitus, qualis motus est, ut ex Galeno secundo methodi, & alibi: Vidius libro primo de febribus, cum Galenus febrem definiuit, conuersionem innati calidi in igneum, ab usum esse nomine conuersionis dicit, significare volens, quod mutatum est, non verò mutationem: gigni igitur per motum febrem, nimirum per conuersionem innati caloris in igneum, mutationem ipsam non esse: melius igitur locutum eundem Galenum primo Aphorismorum xiiij. vbi non conuersionem definit febrem, sed accendi dixit ob conuersionem natiui caloris ad igneum, sicuti etiam primo de ratione victus in acutis, febris ortum esse conuersionem natiui caloris ad igneum, quippe initium, & causam illinc ostendi, formam non item. Hæc bona omnino, & vera, quippe viri, meo quidem sensu, post antiquissimos Medicinæ patres, nostri & aiorum memoria medicorum omnium faciliè Principis: sed & aduiciam quod occurrit, posse recitatum locum ex Aphorismo xvj. leni immutatione ad posteriorem commodè transferri, si enim quod est *πρὸν* accentu graui, sit accentu circumflexo, & iota subscripto sic, *πρὸν*, erit tertius casus, & sensus idem decimo quarto Aphorismo, ex conuersione natiui calidi esse febrem, quod similiter dicitur de Tralliani loco, vbi eodem modo definitur. At Cæsalpinus conuersionem adhuc defendit, quippe omne quod fit, habere aliquid facti, conuersionem igitur aliquid iam conuersum, ratione cuius est febris, nimirum caloris conuersi, qui est res permanens. Atque hæc ab Galenicis febri definitiones aut descriptiones sint allata. Quæ verò ab Auicenna proponitur initio quarti libri, eam dixi antiquioris auctoris esse, quod & faciliè comprobabo: is verò est Alexander Aphrodisæus, cuius de febribus libellus extrat Latine editus interprete Georgio Valla. Non putem sanè tam faciliè, hunc Alexandrum esse Aphrodisæum illum insignem Peripateticum, qui quæstionum naturalium, & moralium libros illos duos pulcherrimos conscripsit, & alios in Aristotelem commentarios insignes, sed ex eadem Aphrodisio patria fortasse alium medicum, eundemque fortè qui problematum libros duos scripsit, qui à nonnullis Alexandro Tralliano, nullo tamen argumento attribuantur, cum huic, quæ nunc dicimus, quod ex illa patria fuerit, ratione saltem aliqua à nobis adscribantur. Is igitur Alexander, illius libri capite primo, ex sententia Empedoclis, & Zenonis, & plurium ex Hippocrateis, ut ipse asserit, febrem esse definit *calorem contra naturam, à corde sumenient principium, ex coque per arterias, ac venas in corpus uniuersum progredientem, naturalis que sensus offendentem actionem*. Hæc autè definitio mihi eadem videtur illi quæ ab Auicenna proposita legitur initio quarti libri in hæc verba: *Febris est calor ex irascens accensus in corde, & procedens ab eo mediantibus spiritu & sanguine per arterias, & venas in totum corpus, & inflammatur in eo, inflammatione quæ mouet operationibus naturalibus, non sicut caliditas ira, & laboris, quum*

non ultimatur, & impedit operationem, ita ut retineatur. Nam quòd ab Auicenna dicatur calor extraneus, ab Alexandro contra naturam, nihil est discriminis; quippe iam antea Galeni verba recitata sunt, appellantis eundem acquisititium, non naturalem, & præter naturam; qua voce utatur, seu Auicennas, seu Alexander mihi ignotum: Arabicæ etenim linguæ penitus ignarus sum; Alexandri autem codice Græco destitutor: scio tamen quòd Græcè est, *μηδὲ πύον*, verti rum præter naturam, tum à nonnullis contra naturam, nec immeritò, vel enim idem sunt, vel saltem si differunt, quum id quod est præter naturam latius pateat, quod est contra naturam veluti sub eo comprehensum, pro eo sumi poterit; sanè enim quod est contra naturæ leges, illud etiam præter eiusdem leges erit. Scio fuisse hæc duo à Fernelio distincta, nec malè eo loco, quippe vitia quædam cutim sædantia præter naturam quidem dici voluit, non tamen contra naturam, nec morborum nomine dignari; verum, ut alibi distinguatur, hic iam non distinguuntur. Dixerim sanè Alexandræam definitionem esse perfectiorem Auicennicæ, quippe Auicennicæ multa superflue adiecta sunt, quid enim illa *& inflammatur in eo inflammatur*, si iam proposuit calorem esse in corde accensum; nisi fortasse Arabicæ linguæ idiotissimus ille sit; & illa etiam nonne manifestò superflua; *non sicut caliditas ira, & laboris, quum non ultimatur, & impedit operationem, ita ut retineatur*, quum enim nihil aliud quàm excludant calorem exiguo durante spatio, ut qui ex ira, & labore, quum hic firmatus non est, nec affectio morbosa, tunc enim iam sit ille etiam febris; hæc profectò omnia superflua sunt, iam enim propositum est febrilem calorem operationes lædere, non igitur febrilis nisi lædat; at ex ira, & labore simpliciter non lædit, non igitur febrilis; non igitur necesse illa adici: si autem lædit, quum in vniuersum corpus sit diffusus, iam ex dictis in eadem definitione febrilis est, quare illa superuacaneè addita sunt, alia verò quæ in utraque leguntur, eam complent, & perfectam reddunt, & rem totam liquidò declarant; quod enim dicitur esse calorem præter naturam lædentem actiones, id genus est à forma sumptum, quæ enim vno verbo exprimi non potest formæ pluribus explicatur, quod additur esse in corde, & inde in vniuerso corpore, differentia est sumpta à materia, seu subiecto, in quo is calor residet, ita enim in accidentium definitione genus, & differentia constituuntur ex Aristotelis doctrina; & hæc ad cõstituendâ definitionem possint esse satis; verum ad rem totâ liquidius declarandam, proximiora adhuc, & magis particularia subiecta proposuisse, & vias, per quas plurimus ille calor deferri solet, non sit Alexandro, aut Auicennæ fraudis; doctrinæ utilitatē, & ut semel tota illa addiscentium memoriæ mandaretur, quærentibus; sunt autē subiecta quæ diximus, spiritus, & sanguis, quo nomine alij etiam humores comprehenduntur, viæ autem, arteriæ, ac venæ. Inter definitiones autem ex Galeno à ipse ad initium huius capitis allatas, dux

dux equidem sunt quæ genus illud, & differentiam, seu formam, & subiectum continent, & perfectæ existimari possunt, ut quæ ex secundo libro methodi capite ultimo recitata est, *Febris est calor adeò auctus, ut occasione eius corpus laboret, nec probe fungi actione possit*; & quæ ex octavo methodi capite primo: *Febris est calor adeò immodicè auctus, ut & hominem offendat, & actionem laedat*. Calor enim auctus, & lædens actiones, genus & forma est; corpus autem, seu homo, id est, hominis corpus, differentia, & subiectum, uti diximus: in cæteris autem Galenicis definitionibus, conditio illa generis, seu formæ quæ calorem præter naturam ad febrem coarctat, nimiorum actionis ex calore læsa, desideratur, sicuti etiam cum in aliquibus apponatur materia, aut subiectum cor, vel corpus, in aliquibus ea desideratur, nisi implicatè, cum dicitur nativa caliditas, eiusdem extranei caloris subiectum designari dicamus: sed cum explicatè in Auicennica illa, & Alexandræ definitione omnia habeantur, hanc meritò nos amplexabimur, & ad singulas particulas aliquid adnotabimus in sequenti capite.

Diluuntur argumenta aduersus febrem calorem proposita, & febris definitio Alexandræ, seu Auicennica explicatur.

CAPUT XXVI.

FEBRIM esse calorem, cum vel iudicio vulgi evidentissimum sit, oppugnant tamen aliqui, ingenij ostentandi causa; nos vtilem doctrinam querentes, quædam tantum, rei naturam magis explicantia proponemus. In accessionibus intermittentiū febriū cum maximum appareat frigus, calor nullus, quomodo sub calore poterit collocari febris illa? iidem in febribus lypitiis, vniuersum corpus exterius sentitur frigidum, quod etiam in aliquo ardentium perniciosarum genere contingit, ut scribit Galenus libro de inæquali intemperie capite octauo, sicuti etiam in hepialis, eo discrimine à lypitiis quod ibi à Galeno proponitur. Præterea qui ex febribus, præsertim colliquantibus proximi sunt morti, frigidum expirant, ne dum igitur totum corpus, sed neque cor illud videatur calidum. Ad primum responsio est, in accessionibus febrium rigentes, aut perfrigeratos omnino, dum perfrictio sola durat, non febrile, datur enim rigor absque febre, licet vulgus inter febris tempora rigorem illum numeret, febrem frigidam appellans; potest tamen & hoc aliquando contingere, quod non raro obseruare licet, ut dum rigor adhuc durat; caloris excessus in visceribus sentiat cum intensio sit, & systoles celeritate; hi autem non solum rigent eo tempore, sed febriunt etiam, cuiusque affectus tunc compositus, & intemperies constat

autem à membro illo,quin priùs calefiat cor,non sanè contingit:à membro autem ad cor ascendit calor,tum per arterias ascendentibus putridis fuliginibus,tum etiam absque fuligine interdum, vt in diaria ex bubone, proxima parte calefacta, semper enim contingens pars, atque continua ipsa quidem primum caliditatem assumit,deinceps verò, & partem vicinam afficit,& hæc deinceps sibi proximam; atque ita vsque ad principium insiti caloris vbi petuenerit intemperies, totum celeriter corpus principij sentit affectum, quæ habentur ex Galeno libro de causis morborum capite secundo.Ex corde autem postea cum reflectitur calor, commoda & aperta via per arterias id fit, quæ à corde vnicuique parti distribuuntur, ac per venas etiam, quoniam arteriis sociæ,& iunctæ, ora habent communia, quibus calor, spiritus, & sanguis inuicem communicantur. Satis autem constat, non illum, & eundemet calorem, qui cordis corpori hærebat, ipsummet per arterias delatum, ad alias corporis partes demigrare, non enim potest cum sit accidens, nec verò etiam sanguis, qui in cordis sinibus continetur, ad alias partes remeare potest, impredientibus valvulis, quas obseruant Anatomici. Sed sicuti ex alio membro cordi communicatur, vel per fuligines, vel proxima parte subinde incalescente,vt diximus, ita ex corde, tum artiarum corpora eidem continua excalfacta, partibus quibus adiacent & inferuntur,calorem communicant, tum sanguis in corde existens, proximum qui est in vena caua excalfacit, vnde reliques in corpore incalescit, tum verò maximè, quod caput est, spiritus in corde genti, & ex ipso exeuntes extraneo calore infecti, quem susceperunt in corde impertiunt sanguini qui in arteriis est, & qui in venis ob societatem propositam, & inde facilè ad singula membra ille influit, & distribuitur. Hic autem defluens calor alij vnitur calori, qui membro fixus ab initio est, eumque similiter afficit, vade tertius quidam gignitur, extaneus & ipse, qui febris est, sic vt vnus tantum calor febris sit, ex immutato tum fluente à corde, tum etiam infixò partis calore conflat. Et hæc per singula febrium genera, seu diariæ, seu putridæ, seu etiam hæctica accipienda sunt; ita enim hæctica calor febrilis dependet à corde, vt aliarum, cum priùs in solidis cordis, quàm aliarum partium sit accensa caliditas. Nomine autem actionum naturalium quas lædi proponit definitio, intelliguntur actiones omnes à natura generatim comprehensa prodeuntes, quomodo eam accepit Galenus libro secundo de symptomatum causis capite primo, qui hoc nomine intelligere se dicit. omnè qua animal regitur facultatè, vt animales etiam, ac vitales omnes facultates cõprehendantur: læduntur enim omnes in febris, licet non semper omnes, sed vel hæ, vel illæ, alixque alius magis aliquando, & interdum omnes. Galenus autem secundo methodi capite vltimo, non actiones naturales lædi ab eo calore dixit, sed occasione eius corpus laborare, nec probè fungi actione

posse, & octauo methodi capite primo, hominem offendi, & actionem lēdi, intelligens propriē, vt puto, actiones, & munera vitæ, quæ quisque pro consuetudine obire solet, arare, texere, ambulare, & similia, sed cum harum vsus & firmitas, à superiorum firmitate pendeat, illisque læsis hæc quoque lædantur, has etiam sub illis comprehendī satis constat; & hæc rursus quoniam firmitatem superiorum supponunt, qui hæc lædi dicit, superiores etiam illas lædi necessariō adstruit, ita alterutrius læsio apponi merito potuit: huiusce autem læsionis iudex est sensus, quæ erat vltima definitionis particula, sicuti alius cuiuslibet morbi: operationum enim læsio sensui euident, morbum determinat apud Galenum libro artis medicæ capite vij. & secundo de temperamentis capite quarto: hoc tamen postremo loco non sensum nominat, sed actionem dicit manifestē læsam, Est autem manifestē læsa tum in febre, tum in quolibet alio morbo, quum sensu ipso talis apparet.

*Febris diuisio in febrem morbum, & febrem symptoma consideratur:
Galeni, & Auicennæ de ea opiniones. Febris ex obstructione,
vtrum febris accidens, an febris morbus dicenda sit.
Capiuaccij opinio laudatur, & adstruitur. Fe-
brem morbum, & febrem accidens
non distare natura.*

C A P V T X X V I I.



FEBRIS diuisio illa, qua alia morbus, alia symptoma seu accidens esse dicitur, quamquam non est deducta à rei substantia, nec essentialis haberi debet; quippe nec constituit nouam aliquam speciem præter illas tres, diariam, putridam, & hecticam, est tamen maximi momenti, & magnopere attendenda, vti in morborum appellationibus turpiter non erremus, & multo magis ne in eorundem curationibus cum agrorum vitæ discrimine imprudenter labamur. Videntur igitur de hac diuisione: & quæ ac qualis sit hæc febris symptoma, illiusque momenta consideranda; ne quod accidentalis febris dicatur à nonnullis, aut symptomatica, putet aliquis eam esse negligendam, cum non secus, atque essentialis, cuius naturæ & ipsa verè est, magna diligentia sit procuranda. Galenus de hoc febrium genere variis in locis tractauit, quorum insigniores non pigebit huc afferre. Igitur quarto Aphorismorum lxxij. ita scribit: *A febris molestari dicebant antiqui, illos qui abique inflammatione, vel abscessu, vel dolore, vel erysipelate, vel (vs simpliciter dixerim)*

xerim) absque aliquo membro præcipue affecto agitant; quod si, vel propter lateris inflammationem, vel pulmonis, vel talis partis alterius febricitareus, non febricitantes: et sic nominabant; neque à febribus molestari dicebant, sed pleuriticos, aut peripneumonicos, & alius similibus nominibus, velut hepaticos & lienosos appellabant. Non dissimiliter tertio in primum Epidemiorum quarto: Caterum morbus est ubi veterum, ubi de febribus disputantes audis cognoscendus. Nam si iccno-
ris inflammationem, aut lateris, aliisque partis febris insensatur, pleuritum, vel peripneumoniam, vel hepatism nominant morbum, non febrilem, qui verò circa inflammationem febricitat, febrim hunc dicunt laborare. In eadem sententiam libro secundo de crisi- bus capite septimo scribit, differentia membra propria singula febrem accendere, ut exempli gratia lienem, & iccur; subdeus aliam esse formam febris phreniticæ, & peripneumonice, & pleuriticæ, & hepaticæ, item & aliarum omnium febrium, quæ ex inflammatis quibusdam particulis accenduntur. Quibus etiam consona illa sunt quæ leguntur commentario primo in sextum Epidemiorum xxvix. ubi hæc habentur: *Quidam autem veteres à diversis membris accensas febres, ab illis cognominabant, lateralem febrem aliquam vocantes, & iccorariam, & lienem, alias verò à symptomate soporifico, somnolentiam, lethargicam, phreniticam, auriginosam; sed & septimo Aphorismorum xlij. ita scribit: Non tamen ubi inflammatio aliqua, aut absque inflammatione humores putredine igneum calorem accendunt, balnea vitales sunt, antequam noxi humores enacati fuerint, aut coacti. Verum tales morbi, aut laterum inflammationes, aut pulmonis, aut hepatis, aut lienis, antiqui nominabant, symptoma statuentes ipsam febrem, non ipsum pathos. In quibus autem si e parvis inflammatione putrescentes in venis humores febrem accendunt, in illis solis dicebant hominem à febre molestari, & ipsum à febre haberi, atque in ipsis febrium scribere differentias, hepaticam, & typhicam, elodem, & typhodem, pestilentem, & causam nominantes; hepaticam autem febrem, vel lienosam, aut pulmoniam, aut lateralem nemo dixit. Porro autem antequam ultro citius progrediar euellendus scrupulus est ex locorum verbis, quæ postremum recitata sunt enatus: primum enim in sextum Epidemiorum xxix. & secundo de crisi- bus septimo, febrem lateralem seu pleuriticam, iccorariam seu hepaticam, lienarem etiam, phreniticam, & peripneumoniam nominasse dixit antiquos, & ipse nominat, atque approbat; septimo autem Aphorismorum xlij. hepaticam febrem, aut lienarem, aut pulmoniam, aut lateralem neminem dixisse scribit. Puto autem difficultatis momentum possum esse in verbis, quæ apud Galenū Græcè scribentem non eadem utrobique sunt, eadem autem apud Latinū interpretem. Sensus igitur verborum ex commentario ad Aphorismū hic est; hepatis inflammationis, aut lateris, aut pulmonis, aut lienis dicuntur hepatitides, pleuritides, pulmonix, & splenitides, ita morbum ipsum quæ est inflammatio nominabant veteres, non febrem, quam habebat loco symptomatis; igitur nemo febrem illam dixit absolute splenitē, peripneu-*

monitem, aut pleuritim, sicuti dicebant hepialem, lypiriam, helodem, typhodeni, pestilentem, & caustum: id tamen non prohibet, quin si ex aliquo membro accendatur febris, possit illa dici hepatica, splenetica, & pleuritica, quod & secundo de crisisibus, & primo in sextum Epidemiorum affirmat, non tamen febris illa dicitur absolute hepatitis, aut splenius, quo nomine significatur primarius morbus, id est, inflammatio, non autem febris quæ est symptoma; hoc enim significare voluit septimo Aphorismorum Galenus; & hac ratione etiam diuersitatem ostendere febris, quæ est symptoma, ab aliis; vbi igitur Latina translatio habet in commentario Galeni ad Aphor. xij, hepaticam autem febrem, vel lienosam, aut pulmoniam, aut lateralem nemo dixit, Græcè est *ἡπατιαν δὲ τὴν πυρίαν, & πνευμονίαν, & πλευρίτιν ἢ πλευρίτιν ὡς ἐκ τῆς* hoc est, ad verbum, *hepatitem autem febrem & splenicam, & peripneumonitem, aut pleuritim nemo dixit.* Secundo autem de crisisibus, & primo in sextum Epidemiorum, *πνευμονίαν, πνευμονίαν, πνευμονίαν, πνευμονίαν, πνευμονίαν*, id est, *febrem pulmonariam, lateralem, & lienosam* dixit. His itaque de horum locorum conciliatione adductis, reliqua profi quamur. Eandem igitur febris diuisionem habemus denuò apud Galenum primo ad Glauconem capite recto, vbi scribit, febres nonnullas ex inflammationibus, nonnullas ex humoribus accendi, & quæ ex inflammationibus sunt, esse veluti quædam symptomata partium phlegmone laborantium, & morbum magna ex parte ab instrumeto partiente denominari, phrenitidem, aut peripneumoniam, aut pleuritidem, aut aliquid tales; adhuc lib. 2. de crisisibus c. 8. scribitur, quædam febres ex loco in passione, quædam sine illa consistere: sunt autem ex loco in passione febres, quæ partium inflammationes, aut alias etiam affectiones febrem gignentes sequuntur. Vltimus apud Galenum locus proponitur ex libro de differentiis morborum cap. 5. quo tamè dubiū esse possit, vtrum à Galeno approbetur, aut improbetur illi diuisio, nam cum illam ex aliorum mente proponat, qui dicebant, vbi febris sensibilis in alicuius partis affectum sequatur, symptoma esse dicendum, alioquin morbum, & pathema, subiiciatque hos esse accusandos, quod non expectantes vt ab aliis confutentur, ipsi se ipsos incurrunt, non liquet vtrum reprehendendos dicat merito huiusce diuisionis, an alterius erroris, seu inconsistentiæ: Illi enim quos reprehendit, existimabant morbos esse functionum læsiones, quæ Galenus symptomata esse vult, iidemque dicebant, si ex phlegmone nascatur conuulsio, ipsam esse phlegmones accidens, & symptoma, si verò ex sola intemperie, esse morbum, itidè de febre, inodò esse symptoma, quum sensibilè alicuius partis affectū sequitur inodò morbum, & pathema, cum nullū talem. Sic dicit Galenus, *αὐτοὶ ἑαυτοὺς περιπλέκουσι*, ipsi se ipsos reuinciunt, vertit Leonicens melius, in se ipsos incurrunt, hoc est, sibi ipsis contrarij sunt, & dicunt secum pugnantia, hoc enim valet, etiam apud alios verbum *περιπλέκειν*. Hi igitur sibi ipsis erant contrarij, & in omnibus hypothesim suam non seruabant, quum conuulsionem, quæ est laxa actio, & illis idcirco morbus

modò dicerent morbum, & modò symptoma; & febrem similiter, modò morbum, & modò symptoma; non video autem ex hisce, eiusdem instantiæ, quam in aliis reprehendit Galenus, non posse etiam ipsum damnari, aut minus valere reprehensionem aduersùs Galenum de febris inflammationem afferentem, atque aduersùs illos; etsi functionum læsiones, non morbos, sed symptomata dicat Galenus, distinguit enim & ille morbos à symptomatibus, & symptomata à morbis. Dicimus igitur, nec illos, nec Galenum malè febrem ita diuisisse, & illam appellasse morbum, hanc symptoma, nihil enim vetat, quin si aliquis affectus ratione propria est morbus, possit alia dici symptoma, & è contrario: pendente enim morbi ab aliis morbis, vt febris ab inflammatione, quorum dici possunt symptomata, & ex symptomaticis morbi, vt febris à dolore, cuius si dicatur symptoma, quia eum sequitur, non peccetur: cum hoc tamen, symptomatici, & morbo suus vniciue est terminus, natura, & propria definitio: est enim morbus affectio, quæ actiones primò lædit, & symptoma affectio morbum sequens, ipsa que interim actionis læsio. Febris igitur qualibet, si actiones primò lædit, qualibet etiam morbus est; talis autem perfectò est qualibet, nam etiam quæ ex lateris inflammatione est, illa veluti febris, & ex febris natura, seu ex caliditate ignea actiones lædit, ideo per se, & primò lædit, quia tamen inflammatio lateris, hoc est, sanguis in illa parte impactus sibi eam illam genuit, ideo febris dicitur symptoma inflammationis, sed symptomatici nil aliud obtrinet quàm nomen: non enim est propriè symptoma, quia nec actio læsa, nec affectio corporis, nisi vt qualibet alia febris, nec exiens immutatum; quare & merito Galenus primo ad Glauconem tertio, non dixit absolutè tales febres esse symptomata, sed velut symptomata partium inflammatione laborantium, tanquam ipsis negaret veram symptomaticam naturam; quomodo etiam accipiendus est locus qui sequitur quarto deinceps capite. *At quæ ex humorum putredine febres accenduntur, hoc ipso nominantur febres, & sunt non accidentia morborum, sed ipsa morbi;* & septimo Aphorismorum xlii. illa quæ ex veteribus adducuntur, quæ volebant febrem non esse morbum ipsum, sed symptoma morbi, quæ cum Græcè ita legantur, *συμπτωμα πηλικος τῶν πυρετῶν αὐτῶν, ἢ αὐτῶν πάθος*, meliùs fortasse ita vertantur, sicuti & nos superius conuertimus, *symptoma statuentes febrem ipsam, non ipsum pathos*, hoc est, antiqui febres sequentes inflammationes propositas, non statuebant illas esse ipsum morbum, quo sub inflammatione aliquis laboraret, hunc enim volebant esse inflammationem, sed statuebant febres illas esse symptomata, morbum esse inflammationem, hoc est, febrem ad inflammationem sequi, vt ad morbos sequuntur symptomata, vnde febr̃i sua & propria natura haud denegetur. Si quis igitur febrem symptoma propriè esse putat, eique proinde morbi naturā propriam aufert, nã ille fallit vehementer, idque reprehendit Galenus; symptoma autem quo modo diximus, potest qui est propriè morbus esse: ita consona sunt, quæ hac de re scripsit

Galenus, nec necesse est immutare terminos, quod facit Capiuaccius, qui Galeni loca illa conciliare studens, dicit febres esse vel principales, vel non principales, & principales esse, quando in corpore nullus est morbus à quo febris originem trahat, veluti in pleuritide inflammatio est febris origo; dicitur igitur Capiuaccius admittere quidem Galenum hanc diuisionem, ut febris dicatur principalis, & non principalis, qui tamen morbus sit, & non symptoma; dari autem febres quæ sint symptomata, non morbi, id non admittere Galenum. Atqui Galenus nusquam febres principales, & non principales nominat, nominat tamen alicubi quasdam symptomata, cuius vocis reddenda aliqua ratio erat Capiuaccio, quod nos fecimus; sed iam quæ de eadem diuisione ab Auicenna proponuntur consideremus. Igitur apud hunc autorem habemus eandem, quamquam ex aliorum mente scriptam illustri maximè loco, post ipsam statim febris definitionem ad initium quarti libri, ubi dicitur, nonnullos esse qui proxima diuisione statim febrem ita diuiderent, ut alia esset febris ægritudo, & alia febris accidens, qualis est febris apostematum: exilius autem declarans earundem naturam, adiicit, febrem ægritudinalem esse illam, inter quam, & causam quæ non est ægritudo, nullum intercedit medium, qualis est febris quæ oritur à putredine, quæ putredo absque medio aliquo est causa febris; ipsa autem non est ægritudo, sed ægritudinis causa: febrem autem accidens esse, quæ sequitur alium morbum, ex quo orta est, sicuti febris ex apostemate, quæ ipsum sequitur, & donec ille est, febris est, eo abeunte, & illa abit, atque etiam apostema ægritudo est, quæ à sua causa dependet. Oppugnari tamen posse hanc diuisionem dicit Auicennas, & proponit argumentum, sed admodum facile: si enim febris ex apostemate dicitur febris accidens, inquit Auicennas, quia sequatur calorem aut dolorem apostematis, iam plurimæ ex ephemeris erunt febres accidentia, quod ponit nemo; plurimæ enim ex ipsis, ex calore, aut dolore fiunt; si autem dicatur easdem sequi putredinem apostematis, tunc apostema non erit causa illarum prima, sed hæc erit putredo, sicuti est causa aliarum febrium, quæ dicuntur morbi; unde hæc ab illis non differunt nisi per accidens, quare nus ea putredo est in apostemate. Respondemus ad primum, febren accidens sequi tum calorem, tum dolorem apostematis; igitur plurimæ ephemeræ sunt febres accidentia, falsa est consecutio, nam dolor, & calor, quæ sequitur febris, sunt in inflammatione, seu in apostemate, veluti partes, & naturam illius veluti complent, unde febris sequitur quidem illa, nimirum dolorem & calorem: sed magis propriè dicitur sequi inflammationem, qui morbus est: at dolor, & calor, ex quibus fit ephemeræ, non sunt morbi, sed causæ tantummodo, unde non sequuntur morbos alios, sed absque medio propriam causam, ephemeræ autem, quæ sequuntur apostemata, ut quæ sequuntur bubones, illas esse febres accidentia concedimus. Ad alterum de putredine quæ est in apostemate, eodem modo liceat dicere: est enim

est enim putredo illa veluti pars apostematis, vnde ab apostemate dicitur esse febris, quæ à putredine illius est: nec omnino est idem modus generationis febris accidentis à putredine, ac generationis febris morbi ab eadem putredine: nam in illa intercedit apostema, quæ est aggritudo alicuius partis, vnde illa dicitur fieri ex passione loci, in hac nullius loci, aut membri est passio, quod autem inde colligebatur, non differre illas nisi per accidens, seu accidentaliter, id verò vltiò concedimus; & diuisionem hanc accidentalem, non autem essentialem esse, iam ab initio diximus: forma enim, natura, seu essentia morbi est eadem in vtraque febre, siue diaria, siue putrida, siue hectica sit, in singulis enim hisce, aut differentiis, aut generibus febres accidentia, & febres morbi sunt, qua de re quardam etiam ad finem capitis dicemus. Igitur eiusdem est natura febris accedens ab apostemate exorta, ac febris putrida ex putrescente humore in venis, si modò ex apostemate sit putrida: potest enim non putrida esse, sed ephemera ex Galeno primo de differentiis febrium septimo, quod contingit in bubone ex causa manifesta, tunc enim, ut ibidem explicatur, minime ascendit ad cor putrida fuligo, quæ in loco bubonis manet circumscripta, sed calor tantummodo, subinde continuis partibus excelsa factis eordi communicatur: si autem ad cor non solus calor ex bubone perueniat, sed putrida etiã fuligo, sicut in bubonibus contingit, qui sunt absque vlcere manifesto, tunc putrida febris est; talis igitur febris licet accedens dicatur, aut symptoma, quia bubonem sequitur, est tamen forma & natura illius eadem aliis putridis, vnde & crises, & periodi, si quæ aliquando sequuntur, eandem retinent naturam: commodè igitur distinguatur Dinus, & ex eo Herculanus, & post hos Costæus neutro tamen nominato subiecto considerari, vel ratione ipsius naturæ febrilis [in se dicit Dinus] & sic esse morbum, neque diuidi posse in febrem morbum, & febrem accedens, vel ratione cognitionis, & curationis earundem febrium [in relatione ad cognitionem, & operationem Medici dicit Dinus] & sic commodè fuisse eò modo diuisam: cum enim possit sequi, & non sequi alios morbos; cognoscendum id in primis esse, ac si alium morbum sequatur, huius curationi, tanquam causæ primum esse attendendū; nihil autem tale opus esse, cum ab alio morbo non dependet: & ob id, opinor, primā febris diuisionem fuisse hanc appellatam ab Auicenna, atque à Galeno lib. 2. de crilibus, tanquam primo loco ponendam, & maximè obseruandam. Porro autem de hac eadem diuisione alia ex Auicennæ verbis oritur difficultas. Dicit enim Auicennas, febres obstructionum esse febres accidentia; ex hoc autem sequitur, omnes serè putridas esse febres accidentia, quum obstructionem sequantur: & ex ephemeris tum synochas absque putredine, tum alias quæ ex obstructione fiunt apud Galenum lib. 8. methodi cap. 4. quod nullo pacto est concedendum. Galenus enim febres accensas ab humoribus putrescentibus in venis absque loci inflammatione, quæque

quæque ab obstructione etiam sunt, distinguit ab aliis quæ ex inflammatione sunt, quæque sunt febres accidentia. Auicennæ interpretes auctoris sententiam illam facili, & absque ullo scrupulo retinent: Costæus & ipse admittit, febres ex obstructione symptomata esse, cum quo tamen morbos esse vult, ea ratione & modo, quo nos paulò antè de illis, quæ ex inflammatione sunt, dicendum esse existimauimus; sed nos de his quæ ex putrescentibus humoribus in venis absque inflammatione sunt, id nullo pacto concedimus. Massaria reicit Auicennæ dictum tanquam falsum, & Galeni doctrinæ aduersum, de conciliatione nihil sollicitus. Capiuaccius obstructionem dicit bifariam accipi posse, vno modo, vt pertinet ad vasa existentia extra viscus, altero ad vasa existentia intra viscus, vt si obstruantur vasa existentia, vel in liene, vel in hepate: hoc igitur modo esse febrem accidentalem, & ita intellexisse Auicennam, cum ex obstructione febres dixit accidentia, altero esse febres principales, & ita intellexisse Galenum. Arridet hæc opinio, & hæc distinctio, & febres principales intelligimus, quas febres morbos dicit Galenus, vt antea proposuimus: eandem igitur ratione aliqua nos confirmabimus, quod non fecit Capiuaccius, valet tamen multum ad sententiam adstruendam. Igitur Galenus, vbi de hoc secundo febrium genere locis recitatis verba facit, eas semper ex affectione membri, aut partis, aut particulæ, aut locorum oriri dicit, sicuti cum de priore illis, humorum putredinem in vasis semper causatur. Cum igitur in obstructione intra viscus, membrum, aut pars, aut particula potissimum afficiatur, extra autem non itidem, iure febris illa morbus, non hæc itidem dicetur, in eo autem rationem positam esse ai bitror, quoniam ex obstructione in viscere actiones manifestè læduntur, veluti ab obstructione, quum grauitates, pondera, motus impedimenta, & fædi colores, vel in parte, vel in toto corpore appareant, ex attractione, expulsionem, & reliquis naturalibus actionibus, quæ ritè haud obeuntur, at in febribus ex obstructionibus in vasis magnis extra viscus, quæ læduntur actiones, illæ ad febrem propriè, & quatenus febris est, referuntur: ita quod molestat, quod vrget, & vnde incommoda ac impedimenta sentiunt homines, inde ægotare se dicunt, & illum medici morbum appellant. Quamquam autem in febre morbo, pars etiam aliqua præcipuè videatur interdum affici, vt in tertiana partes ad iecur, in quartana ad lienem, in quotidiana ad ventriculum attinentes, non parum tamen interest; nam in his per multa febris tempora obstructiones sunt in vasis magnis extra viscus, non in viscere, affectio autem partium quæ proposita est, febrem sequi solet, non illam parere, at obstructio in viscere. Contingit tamen aliquando procedere adeò febrem illam primariam, vt exilis etiam visceris venæ occupentur, & præterea visceris corpus obstruatur, quo tempore febris etiam pariat, sed alia à priore, & actiones tunc alia ratione, quàm antea læduntur, scilicet ab obstructione manifestè, &

infirmitati

insignit, & tunc abſt ulio morbus erit, febris erit acida, quæ nimirum ex illiſ. foras diſtina affectuum præter naturam rationes mutantur; & quæ hæc eſt cauſa, ille morbus erit, & eſt contratio. Fernellius, quod ad eandem febrem ex obſtuctione pertinet, non videtur diſſentire, libro enim quarto pathologiæ appellat illam ſymptomaticam; duo quippe aut potius tria ſymptomaticæ febris generaproponit, ex inflammatione, quæ poteſt eſſe diſtina, & putrida, ex latente obſtuctione, & putredine, quæ viſceri contumaciter adhæreſcit, impactaque eſt, ſub qua putredinis etiam portionem nonnunquam in venas effuſam, ſanguini permixcere ſcribit; hæc autem erit ſemper putrida: verum ſi portio illa putredinis, quam dicit Fernellius, ad venas effundatur, lane, quod ille non adiecit, vnâ cum ſymptomatica aderit etiam febris primaria, vt eam Fernellius appellat: huiusce autem febris ex latente obſtuctione, & putredine, non item eſſe in ventriculo ſæpe, aut iecore, interdum in liene, aut meſenterio, nonnunquam etiam in pulmonibus, ſingulis enim hiſce locis cuiusvis humoris ſemimalam portionem cumulatam, eam febrem excitare. Tertium genus eiſdem ſymptomaticæ, quæ multo periculoſior eſt, fieri dicit Fernellius, non ſolum ex impactu humoris, verum etiâ ex viſceris cui inſidet, corruptione & putredine, vnde iecoris, pulmonis, cerebri, ac lienis, interdum etiam reſis, diſtantiumque partium corruptelam, & ſimplicem putredinem, nullo etiam putri humore comite, quoniam expiratione graui cor aſſiduè laeſſit, continuâ febrem non aliter quàm putridum humorem ſuſcitare, eamque ſymptomaticam, ac omnino lentam, ſicuti febris eſt quæ phthiſim comitatur: item autem febrem, quæ ſanè, vt exiſtimo, non tarò ab iis qui medicinam faciunt, obſeruari & poteſt, & debet, contendit Fernellius non eſſe dicendam hecticam, ſicuti à nonnullis dicitur, ſed putridam ex putreſcente pulmonum, aut alius viſceris ſubſtantia. At verò ſi in ea vnâ cum febrili calore, natui & primigenij humidi conſumptio, corporis extenuatio & marcor eſt, quid hecticam iuxta vetuſtiſſimorum medicorum placita appellare eam prohibeat? Erit tamen hectica ſymptomatica, vnde in qualibet febris aut differentia, aut ſpecie ſymptomaticam obſeruare liceat: in diſtina, quæ ex bubone à cauſa manifeſta, in putrida ex inflammatione, & ex obſtuctione viſceris, in hectica ex vlcere, aut corruptione pulmonis, aut aliâ partis præcipis. De propoſita igitur febris diuiſione ſatis multa diximus; quibus ſi pauca adhuc quædam de natura ſymptomaticarum non inutilia addeceros, ſinem capiti faciam: non enim quod accidentales, aut accidentia, ſymptomata, aut ſymptomaticæ dicantur, non eſſentiales ideo non ſunt, quod quidam vulgè neminis errore ſeducti exiſtinant, ſed quod ad initium capitis diximus, eſſentiales ſunt, vt aliæ, & eandem naturam habent, quippe actiones, vt illæ lædunt, & periculum inuehunt eodem quo aliæ modè vnicuique enim generi ſua ſimilis eſt, ſi enim diſtina ſunt, periculo vacant, vt primariæ, ſeu morbi ſimpliciter dictæ; ſi putrida, iuxta affectus

inagnitudinem æstimanda; quamquam verè eam in hisce partibus, sit in valis minoribus, & partim etiam extra vasa in spatii manibus, non possit illinc adeo præceps impendere periculum ac ex aliis, quibus in maioribus vasis, & maximè propinquis cordi viget putredo, aut etiam in ipso corde est tamen & illa periculi plena, cum præsertim sit continua. Si hæc ita sunt, pessima, vt alia. Hippocrates in Coacis. & Auctor Prothiericoi, ex hypochondriorum dolotibus malignas febres esse dicit; sunt autem illæ symptomaticæ, quamquam Galenus non absolutè sententiam illam accipiat, sed cum distinctione, vt quod ipsum videre est: horridæ dicuntur eadem symptomaticæ in Coacis: at valde prauas esse horridicæ ex Galeno constat.

Febris nomen aliquando morbum, & dispositionem febrilem, aliquando eius symptoma significat. Hippocratis loca duo ea de re illustrata.

CAPVT XXVIII.

DVO adnotabimus hoc capite, alterum de febris nomine simpliciter, alterum de nomine febris hæcticæ, posibile quidem, non tamen omnino inutilia, licet ab aliis prætermissa. Igitur febris nomine significari habitum, & dispositionem febrilem, quæ actiones lædit, & morbum esse ex intemperierum calidarum numero, notum valuerit vel medicinam adulescentibus, & scriptum apud auctores qui febris naturam definitione explanant. Eandem febrem aliquando accipere pro symptomate, aut veluti symptomate, quum alios morbos sequitur, quo tempore tamen propriè etiam morbus sit, diximus vberimè superius capite, in præsentia verò aliud adnotamus, hoc autem est, febrem sumi aliquando propriè pro symptomate, & pertinere ad genus symptomaticum, quod possumus est in qualitate mutata. Valuit autem hæc observatio, ad emendandum alicui fortasse scrupulum in verbis Hippocratis, ex quibus hæc observatio est collecta. Igitur non dispositionem febrilem, quæ, vt plurimum latens, actiones lædit, siue illa primaria sit ex putredine venis, siue accidens ex inflammatione alicuius partis, aut alio modo, febris nomen semper significat, sed aliquando calor etiam illum, æstum aut incedendum, quod ab ægrotante, siue percipitur interioris, siue exterioris etiam in corpore tactu apparet, est quæ is non morbus, non enim propriè definitio, qualis febris primaria, aut quæ sequitur inflammationes, aut alios morbos quæ sub primo genere categoriæ qualitatis reponitur, continet habitum

hanc non & dispositio, sed & symptoma est, ut diximus in qualitate nut-
 rita, & patitur, hic ad eundem genus categoriz qualitatis, continens pas-
 siones & passiones qualitates, & erit mo bi lignum, ut alia symptoma-
 ta, unde potest & le paor, etiam non variata dispositione, variari: hoc
 modo sumitur febris, prout Hippocratem libro quarto acutorum parti-
 cula secunda, ubi loquens de cauto, siue febris ardenti, eiusque acciden-
 tia proponens scribat *ἡ πυρετός μοῖρος ἰσχυρὸς*, hoc est, febris quoque
 multa habet; morbum autem, seu dispositionem febilem habere, qui
 causo laborat, evidens ita est, ut apponi haud debeat, sed in eodem
 apparere, & percipi multum calorem, multumque incendium, cum
 hoc non semper fiat, apponi verò potuit, & debuit. Idem Hippocra-
 tes tertio in tertium Epidemiorum xxxvj. de eodem cauto ita scribit:
febris non acuta; At verò quomodo in cauto febris non acuta? quæ ve-
 rò acutior cauto febris est? nimirum appellat Hippocrates febrem,
 eum qui apparet calorem, & qui ægotantis sensum maximè contristat,
 qualitatem nimirum immutatam, talis autem non semper est in cauto,
 cum dentur febres parvæ, id est, quæ exiguum calorem præ se ferunt,
 intus etiam viscera non multum perurentes, valde tamen magnæ, ar-
 que malignæ, sicuti scribitur à Galeno tertio de crisis iv. suntque hæ
 de genere ardentium. Contrà dantur etiam multæ, calidæ admodum, &
 incendentes, sic ut stomacho angustiam, calorem, & sitim intolerabilem
 afferant, nihil tamen habent nonnunquam periculosum, ut eodem loco à
 Galeno scribitur: hæc igitur multam febrem esse, scilicet calorem, & incen-
 dium, dicere liceat, morbum autem, id est, febilem dispositionem exiguum:
 Non adduco pestilentes, de quibus Galenus primo in sextum Epidemio-
 rum xxix. quæ exterius mediocres, intus perurebant, ex Thicidis etiā sen-
 tentia, non enim febrilis dispositio harum exigua dici possit, sicuti earum
 quæ ex eodem Galeno superius fuit comprehensa. Posteriori igitur modo à
 me proposito, nimirum pro accidente, & qualitate mutata, fortè sumpta
 fuit febris ab Erasistrato, ut scribitur in libro, cui titulus est *εἰσαγωγὴ*, id est,
 introductio, & ab aliis qui Erasistrati doctrinam sequebantur, cum dice-
 rent febrem non esse affectum per se, sed *συνήθεια*, id est, accessorium, seu
 consuetudinem, vel accidens, id est, consequens alios morbos, sicuti inflama-
 tiones, calorem enim illum potissimum eos attendisse putamus: nos tamen hoc
 loco, non aliorum morborum symptoma, ex recitatis Hippocratis verbis
 febrem constitutumus, sed ipsiusmet febrilis dispositionis quæ morbus est.
 Nō omiserim locum, quem supra ex Hippocrate attuli ex tertio Epidemio-
 rum xxxvi. *febris non acuta*, haud ignorare me, ex aliquorum sententia legi,
 etiā absq; negatione sic, *πυρετός ὁ ζῷον, febris acuta*; atq; ita accipi, & exponi a
 Vallesio. Veritatem quòd alterutro modo legatur locus, observatio haud
 rollatur, de ea nō disquiremus: si enim absque negatione legatur illa ver-
 ba, eadem proponimus, quæ ad priorē locum ex quarto de ratione victus
 in acutis particula secunda allata sunt, ubi similiter legitur, febris acuta;

Atque hoc quidem primum est, de febribus nomine quod adnotavimus ab initio propositum: alterum de febre hectica breviter apponimus. Vulgo igitur hectica febris illa tantummodo appellari solet, quæ solidas animalis partes aggressa, earum humiditates absumit, ex quarum etiam absumptione, tres eiusdem hecticæ gradus constituuntur: ac puto hecticas febres posse etiam appellari aliquas, quæ in humoribus solis consistunt, sed difficile admodum solui possunt: id autem manifestè apparere possit ex illis quæ habet Galenus octavo methodi capite primo, ubi febrium illam proponebat differentiam, quod altera earum est hectica, altera, ut aliquis diceret, schetica; nemo autem putet, hecticæ nomine eam intelligi speciem quæ suprâ comprehensa est, & diarisi ac putridis distincta; in præsentia enim non ab illis, sed à scheticis distinguitur; sed & apparet ex illis quæ subicit Galenus, scribens, quoniam ceteri affectus qui facile discutiantur, dicantur *schetici*, & qui non tales, *hectici*, de febribus dicendum eodem modo; ex quo febrium ipsarum eas quæ ægrè discutuntur, hecticas; quæ faciliè, scheticas esse appellandas; quæ febrium alias esse facile solubili effectu, perinde ut calefactum in sole lignum, aliis difficile solubili, veluti quod igni eam ex calefactum est, ut iam accendatur, & fumum edat; nam cum putridæ sint quæ calefactis lignis affimiles, fumum edant, merito ad hecticarum genus illud hæc pertineant. Igitur calefactum in sole lignum, ut puto, diarias ex accensis spiritibus, & synochas ex feruenti sanguine, & alias ex tenui humore constantes, repræsentat maximè accensum autem lignum alias, quinimo hectica nonnullæ quæ ab initio statim in aduentu, sicuti ephemere ex tristitia, aut ira, aut lassitudine nimia, una cum solis fervore contracta, ad scheticarum genus referri debent, cum facile solubili affectu consent. Quippe dicit eodem loco Galenus, hæc febres non esse admodum difficile curare; sed cum ex putridis, & quæ sint, quæ difficillimè discutiri possunt, hecticæ merito hac ratione appellabuntur. Meminisse igitur debemus ex eodem Galeno primum de differentis febrium capite septimo, hecticas febres duplici ratione ita appellari, vel quoniam fixæ ac soluti difficiles sunt, quemadmodum habitus, vel quoniam ipsi corporis habitum comprehendunt, id est, corporis partes solidas, quæ humidis ex adverso distinguuntur: igitur febris hectica alterutro modo talis dici potest, & utroque simul; nam quæ solidas animalis partes aggressa, difficile solui potest, hectica utraque ratione dicitur; quæ autem ab initio statim invadentes, sicuti ephemere, non difficile curantur, ea tantum ratione qua solidas partes, aut habitum comprehendunt; quæ autem putridæ in humoribus constantes, sed difficili affectu, hac una tantummodo similiter ratione hecticæ appellabuntur. Non igitur hecticum acta illa significatione timendum, qua aliquando venit Galenus, ut remota ex toto immutatam intelligamus, quasi altera natura sit effecta, sicuti improprie hecticis febribus contingere ille idem dicit, & licet hecticam temperaturam appellat, in refrigeratione absoluta

omnium.

animum corporis partium sexti in sextum Epidemiorum quinto, & hæticam affectionem phrenitidis, primo in primum Prothetorum xxxij. in qua procedente tempore, simile quippiam contrahi dicit sanis, quæ à tinctoribus appellatis tincturam accipientes, vix eluibiles redduntur, non secus quàm quæ proprium ab initio colorem habent: sed latiore & magis comuni notione, ex Galeni tamen doctrina recitato loco, sumentes illud nomen, febribus iis accommodari dicimus, quæ ex crassiore, duriore, & sicciore materia accensæ, contumaces admodum sunt, & longo tempore perdurant, sicuti ex melancholiæ, & pituitæ generibus nonnullis tales sunt, cum obstructionibus ut plurimum, & prava partis intemperie, quæ dispositionem illam subiude fouet. Sunt autem ex his febribus tum continuæ, tum intermittentes: continuæ autem quum sunt, symptomaticæ sunt, & multos non solum menses, sed annos perdurant, nec tamen hæticæ propriè sunt, cum signis illis careant, quæ hæticæ ex solidarum partium siccitate habere ab auctoribus proponuntur.

Vtrum febres ex humoribus tantum putridis oriantur, an verò etiam sine putredine illis solum exalfectis. Tralliani, Auerrois, Gentilis, Valesii, Herculani, & Valesij opinio, posteriorem partem adfruentium: Galeni placitis eam non aduersari. Tralliani locus in Latina versione correctus. Iouerti paradoxus, febres nullas ex putrescentibus humoribus fieri, confutata.

CAPVT XXIX.

PX humoribus putrefactis accendi febres, & scriptum est ab omnibus fere de medicina auctoribus, qui de febribus scripserunt, & est in ore medicorum frequentissimum. Vtrum autem ex eisdem non putrefactis, sed tantum inflammatis, effervescentibus, aut adustis, sanguine excepto, de quo dubitat nemo, eadem contingant, controuersum est. Franciscus Valesius in controuersis libro quinto, putat se primum fuisse qui hanc questionem mouerit. Scribit enim, tam omnium consensu comprobatum fuisse, alios humores à sanguine non nisi putrescentes posse fieri febrium causas, ut in eum usque diem à nullo in controuersiam vocatum sit. Ille verò, ut apparet, eorum non meminerat, quæ de hac re non ita paucis verbis, proposita sunt à Tralliano libro duodecimo, aut ab Auerroë tercio Collectaneorum, nec illa viderat quæ inter recentiores vberissime scripta sunt à Gentili in libro variarum questionum, quæ ipse

extrauagantes inscripfit; qui etiam de eadem re opinionem tenuit Dini,
& Antonij, qui hunc locum similiter tractauerant; nec etiam qua ha-
bentur apud Vallesium de Taranto libro septimo capite viij. qui la-
tis non generatim, particulatim tamen quaestionem mouet, verum feb-
ris aedens fieri possit ex bile vehementer aucta, non tamen putrefacta? & quae
post hos etiam Hericlanus scripsit in commentario ad Auicennae libros
de febribus capite septimo, vbi harum febrium mentionem facit, si-
cuti scribens, vt ex caliditate accensa in aliis etiam humoribus à san-
guine, oriatur febris humoralis absque putredine, & iterum cap. xij.
de febre ardenti particulatim, dari huius febris alterum genus, quod à
humore non putrido, sed solummodo ebulliente absque putredine con-
tingat. De hac igitur febre quaedam adnotemus. In primis illud propo-
nere libet, apud Hippocratem nusquam, quod ego quidem obteu-
rim, febris putridae mentionem fieri, neque etiam cum de febrium mate-
ria, & exortu scribit, sicuti libro de natura humana ad finem: fieri enim
plurimas à bile dixit, quarum nomina essent, continens, quotidiana, ter-
tiana, & quartana; quarto etiam de ratione victus in acutis, febrem ar-
dentem gigni, cum reficcata venula hora aestiua acres, & biliosos ichores
in se ipsos attraxissent; & libro de locis, in homine febres propterea fieri,
quoniam corpore superinflammato carnes intumuisse, & pituita, ac
bilis conclusa quieuisset, & neque refrigeraretur quicquam, neque esce-
ret, neque moueretur, neq; aliud quid subiret: haec igitur de febrium cau-
sis, & generatione; putredinis nusquam mentio. Sed & Cornelius Celsus,
cum libro tertio capite tertio procatarticas febris causas proponeret, vi-
tricam, inflammationem, & vlcus, easque euidenter diceret, alias oras
appellauit generatim abditas, nominatim nullam expressit. Similiter ca-
pite quinto, ex inguine, ex lassitudine, ex aestu, aliave simili, nimirum
externa, febres fieri proponit, intelligens diarias, in aliis dicit co-
lorem ex alto venire, id est, ex corporis partibus, & causis internis, ac quae
apparere quid corpus confuderit, sicuti nimirum apparet in superioribus,
quae ex causa manifesta ortum ducunt. Sed & capite quarto, cum indica-
tiones veluti proponeret ex antiquorum sententia febrium curanda-
rum, in medium affert coctionem, & materiae subtractionem per medi-
cametorum vsum, nec verò coctio illa dirigebatur aduersus putredinem
propriam, sed aduersus cruditatem quaecunque esset, vt ex verbis apparet,
igitur de putredine nulla mentio: Ex quibus suspicio esse possit, aliter quae
putredine concepta, existimasse antiquos illos medicos in humoribus ac-
cedi posse febri, quod etià coniecere licet ex Aristotele hic enim prima
problematum sectione, problemate sexto, febre fieri dixit ex *πυρρός*, id
est, efferuescentia, aut re flammescence, & problemate duodecimo *ὑπερθερμότητι*, id est, ex supercalefactis succis: & vigesimo, *πλεονεξία*, id est, ex
superabundantia, hoc est, plurimam cruditate, & ex calefactis suc-
cos febrem parere, putredine nunquam nominata. Nec minus idē suspicari
licet

liceat ex opinione, quam de febris ortu habuit Erasistratus celeberrimus, & antiquissimus medicus, & Aristotelis ex filia nepos; existimauit enim tunc febrem gigni, cum sanguis transfunderetur in arterias, & spiritum à corde delatum perturbaret, eiusque morui resisteret, quod fieret ubi è directo, atque prope principem partem sanguis confluisset. Antiqua ramen extitit illa de febribus ex putredine ortis opinio; si quidem Praxagoras Cous, Erasistrato antiquior, febrium omnium causam putauit esse putrefactionem humorum in vena cava, sicuti scribit Galenus secundo de differentiis febrium capite ultimo, què innuisse putò eundem Galenum primo de differentiis febrium cap. v. cum scripsit, antiquum extitisse dogma, omnem febrem ex humorum putredine fieri, cuius sententiae periclitaretur esse omnis ab Atheniensi clitorus, sed & facit eò contrario alij, ut initio proposui ex Tralliano libro xij. qui superioribus omnino aduersantes, in vniuersum febrem nunquam à putredine fieri pronunciauerunt, sed humores in venis exardescere aut vri, non peruere; illi verò qui fuerint, aut quo tempore, mihi haud constar. Porro autem quibus rationibus ad eam opinionem adstruendam illi vterentur, videre est apud Trallianum: nos ad finem capitis ea de re argumentum ipsorum proponemus, & diluemus; interim concedentes ex putridis humoribus fieri febres, quatinus verum eisdem non putridis, sed tantummodo super-excalsactis, aut vltis, illæ etiam fieri possint; & de sanguine quidem mirum est dubium, sit enim eo inflammato synochus absque putredine, sed de aliis humoribus: ex Hippocratis sanè mente, aut potius illius Auctoris, qui librum quartum scripsit de ratione victus in acutis, id videatur concedendum, sicuti ex illis apparet, quæ paulò autè recitauimus de ortu febris ardentis ex ichoribus acutis, & biliosis, quos resiccatæ venulæ in se ipsas tempore æstatis attraxerint: si enim hæc ortum omnem illius febris continent, iam putredo nulla sit necessaria. Aueroeris etiam tertio Collect. capite quarto, hanc febrem ex adustione videtur concedere, nominatim proponens causam, quippe omnem calorem extraneum non esse putredinalem ex Aristotele; sed assautionem etiam, aut combustionem illius generis esse: Ex Tralliano quæ occurrebant de illorum opinione, qui ex putredine nunquam, ex vltione semper febres accendi putabāt, superius comprehensa sunt. Galenus omnino contrarium sentire videtur, libro enim secundo de diff. febrium capite quinto, satis manifestè neque humorem melancholicum, neque biliosum, neque pituitosum, quantumvis in corpore abundent, accendere posse febrem dicit, nisi putrescant. Gentilis, quod ab initio proposui, hunc locum vberimè tractauit in libro variarum questionum, ac opiniones recitat, & Dini, & Antonij, qui cum Galeno existimabant ex humoribus aliis à sanguine, nisi putrescerent, non fieri febres, cuius vii rationes, & argumenta Gentilis proponit; mihi verò huc afferenda omnia non sunt: ipse autem Gentilis aliter existi-

existimat, & duo dicit: primum, alium à sanguine humorem ex sola adustione posse efficere febrem; alterum, non reperi in actu humorem efficientem febrem absque putrefactione, qui sit alius a sanguine: ratio primi est, quia cum bilis vitellina ex Galeni opinione talis fiat ex adustione, sicuti etiam alia bilis genera, ex eadem potest generari calor febrilis: adustionem denique ex comburente calore in corpore nostro fieri, ut in ulcere combusti, in quo fit elchara, ex eodem igitur fieri febrem absque putredine: sed ramen (quæ est ratio alterius) quoniam adustus ille humor non amplius regitur, aut gubernatur à natura, necesse est, ut propterea corrumpatur, hoc est, putrescat, & eidem febri ex adustione iungi putredinem, & sic putridam esse febrem: putrescere autem dicit Gentilis eum humorem, licet adustum, quia humiditatem adhuc continet: de sanguine porro non eandem rationem adduci possi, illum enim posse diutius absque putredine conservari, & sine putredine diu conservare febrem, quod naturæ amicior sit, unde diligentius à natura custodiat, & integer conservetur. Præterea sanguis, tum multitudine ratione, tum vicinitatis, & magis & celerius afficere cor potest, bilis enim, & alij humores; sed bilis quæ ad vitionem, & ad talem febrem progignendam videtur magis accommodata, minor quantitate, & remotior est cordi, unde sanguinis caliditas potest celerim cor afficere, & in eo procreare febrem, non ita bilis: interim igitur putrescit, quare sit febris putrida. si autem ea copia ponatur bilis, ut febrem antea gignat, iam prius animal intereat. Igitur cum re ipsa, nisi fortasse exiguo admodum tempore durans, ex vitione febris illa reperiatur, & prætera sit idem cura rationis modus, dixisse medicos scribit Gentilis, nullum aliud à sanguine humorem efficere febrem posse, nisi putrescat; alterumque genus illud febrium minimè proposuerunt, sub putridis eas comprehendentes. Ex hoc autem febris genere, nimium ex vitione, statim initio capitis proponit Gentilis eam fuisse qua laboravit iuuenis ille vigesimum quintum annum agens, temperatura calidus, & siccus, qui ex ira, & labore, & inedia febricitauerat, cuius historiam recitat Galenus decimo methodi capite tertio; sed in hac Gentilis opinione duo mihi molesta sunt. Primum, quomodo adustioni superueniat putredo, idque semper, unde febris semper fiat putrida: nam cum adustio identidem exsiccat, impediri identidem magis putredinem, quæ humiditate constat, ratio non consentaneum est; nec satis apparere potest, cum initio nulla fuerint putredinis exordia, quomodo procedente motu suboriantur. Nam desecti à natura, corruptionem quidem illius quod subicitur, efficit, putredinem ex humiditate non efficit. Molestum alterum, est exemplum illius febris ex Galeno adductum; si enim re ipsa nisi exiguo fortasse tempore durans, non reperitur illa febris, quomodo talis sit quæ à Galeno proponitur, quum ad decimum non vique diem peruenierit? Hæc de Gentilis opinione. Valefcus de Taranto, quem diu proponere quæstionem de febre

de febre addita existimant, sed hanc necesse est cessitate putrefactio, non
 solum superius, sed: Nam tamen Gari partum alio existimantem:
 mouit vero & putrefactio in de sanguine, qui natura calida, & hu-
 midas, magis et aptus putrefactio, unde si ex sanguine sit febris absque pu-
 tredine, multo magis ex aliis humoribus. Respondet, ut Antonius ille
 apud Gentili, quod magis ratione qualitatū magis videatur aptus pu-
 tredini sanguine ratione non in custodiz, quam de ipso habet natura, om-
 niam minime illi putrefactio expositum: defendit enim, & tuetur ipsum
 natura quo plus fieri possit. Herodani opinio fuit etiam superius co-
 mprehensa, exillantis sicuti constitit ex iis quæ dicta sunt, etiam
 absque putredine in aliis humoribus à sanguine accendi posse febrem.
 Adhuc tamen, licet fieri possit, ut ex caliditate accensis aliis humo-
 ribus fiat febris absque putredine, medicos tamen non fecisse de illa
 mentionem, veluti de febre ex sanguine minime putrefactio, eo
 quod hæc frequenter contragat, quum natura magis sit sollicita de
 sanguine, quam de aliis humoribus, cumque magis à putredine præ-
 seruet. Franciscus Vallesius omnino existimat ex bile vita, sicuti ex pu-
 trefacta, accendi posse febres, loquitur autem de flaua, nam de atra illud
 negat, & de pituita omittit) ex flaua igitur bile vita accendi posse fe-
 bres, sicuti ex putrefacta, duos quippe esse corruptionis modos, viti-
 onem, & putrefactionem: alia autem magis ad vitionem, ut quæ sunt cali-
 dissima natura, adiuncta potissimum siccitate, & partium tenuitate, alia
 ad putredinem est paratiora, ut quæ humore abundans, aut non sunt
 multo calore. Vtitur autem & Vallesius ad hocce febris genus ad-
 struendum, eodem exemplo à Galeno proposito illius uicinis an-
 num agentis vigesima quintum, quod superius etiam à Gentili adduci
 commemorauit. Dicit autem Vallesius, febrem illam fuisse tertianam,
 quod ex accessionibus à Galeno propositis, ut puro, colligat, & licet etiam
 colligere ex Tralliano, qui libro xij. cap. vj. loquens de curatione ter-
 tianæ, & concedens in accessione cibum aliquando dari posse, videretur
 innuere historiam à Galeno propositam, & adolefcentem illum tertiana
 febre ita esse, unde ab eadem opinione non abhorruisse Trallianum existi-
 mare possumus. Galenus tamen eam febre nunquam nominat tertianam;
 putridam autem non fuisse ex Galeni verbis expressè patet capite v. eius-
 dem libri, ubi facta denuo illius ægri mentione, quem descripsit
 cap. iij. ita scribit: Quippe æger is, quem antea descripsimus, exemplo omnibus est,
 qui propter siccitatem à principio cibo indigent, etsi febricitare iam incipiant:
 nam cum accenditur in his febris, propter modicam acrimoniam exalefactis, at-
 tenuarique ex sole & inedia, & laboribus succi, maximum eius remedium est humi-
 dum nutritiuum, sicuti è diverso, ubi ob copiam, vel obstructionem, vel phlegmonem, vel
 ut sine! dicam, humoris alicuius putredinem febris est orta, maximum malo est cibus.
 Et voluit tamē Mercurialis hanc febre extitisse putridam: quippe Galenum

nequaquã dixisse eam febrem ortam esse ex humoribus inflammatis, sed hoc tantum, in illo iuvene ob aestuationem aeris, succos intestinales os ventriculi absque putredine, unde dici possit, licet affirmaverit Galenus non adfuisse putredinem, nec obstructionem circa ventriculum, non negasse tamen quin putredo in aliqua alia parte fuerit, quæ febrem pepererit. Mirandum sanè viros doctos, ac tantæ exillimationis, ita antiquorum virorum, & qui omnium professorum assidue in manibus fuit, insignes libros, & insignia loca ita supinè legere, & prodicere: potest enim studiosus quisque illum Galeni locum, & historiam sine labore percurrere satis facillè cognoscere, nec ventriculi, nec obstructionum circa illum fieri mentionem ullam: id verò aperte dici, febrem propositi iuuenis ortam fuisse ex succis calefactis, & attenuatis à sole, media, & laboribus, id verò est dicere, factam ex inflammatis humoribus. Præterea si in eo iuvene fuit putredo in aliqua parte, quæ febrem illam peperisset, quomodo in accessione eibus non læsit illum? sed redeamus ad Valsellum. Hic igitur exillimans, ex inflammatis aut vitis humoribus fieri etiam febrem, mouet difficultatem ex Galeno, qui omnem in humoribus febrem, denipso synocho, absque putredine, putridâ pathin appellat, sicuti tertianâ centies dicit nasci ex putribile; soluit licet res ita habeat sicuti proposuit, scilicet ex bile vitâ fieri febrem, raro tamen synceram bilem redundare, vt sine putredine febrem faciat, ita omnes febres, siue ex succorum putredine, siue vltione, sub putridarum non me esse comprehendis: confirmat solutionem quoniâ quæ putrescunt, & quæ vrantur, quodammodo in symptomatis paucumq; similes affectiones, quam rem comprobat ex Galeno v. de simplicium medicamentis, et omnium facultatibus; atque etiam quoniâ ad curationem illa distinguere utiliterat necesse. Hæc Valsellus. At verò quid ad illa, quæ expressis verbis scribuntur libro secundo de differentiis febrium de singulis humoribus, in iis accendi non posse febrem nisi putrescant? si quidem de melancholico humore hæc habet: *Si igitur neque putrescat, neque v. hementer per partes sentientes desinatur atra bilis humor, nunquam efficitur quatrduana exquisita circumum*; quæ verba referunt etiam superiora pertinentia ad flauam bilem; quippe dictum erat, alia omnia proportionem respondere iis febribus, quæ ex amara bile accenduntur; inde fieri, vt nisi putrescat, non efficiat quatrduanæ exquisitæ circumum, sicuti nimum de bili voluerat intelligi: liquidius tamen adhuc rem declarat ex morborum natura, qui ex duobus illis humoribus oriuntur, sibi iuxta proportionem respondentium, scribens: *Et quidem regij morbi passimibus, diuturna & melancholica splenis imbecillitate, & colores in toto corpore fixi correspondent: herpesibus etiam aque & dissipatis, quæ ex flaua bile consistunt, eandem & phagedena.* Tum subiicit: *Neque in bi. verò, neque in melancholia necessario febriunt, nisi prius atra bilis putrescat,* quæ de flaua etiam intelligenda esse, orationis series ostendit, sicuti etiam

etiam quæ in morbo, sic enim in morbo regio, atque atra bilis p^{er}iculis inest, quoniam biliosi humores superabundantes diutius corpora obiderint, febres superveniunt nimium ubi putret. Et fuerint, ad quam rem iam temporis satis habuerunt. De humore pituitoso eadem quoque proponuntur per hæc: Eadem quoque ratione, & in pituitoso humore redundante non accendatur febris, nisi prius putrescat. Hic profecto non illud tantum de humoribus dicitur, eis putrefactis, fieri febres, sed expressè negatur absque putredine in illis accendi posse febrem, ad idque nulla alia ratione quam ex putredine. An eodem propemodum redundum? nominèque putredinis intelligi etiam vitionem; & duplex putredinis modus proponendus est? ita videtur cum Galeni locum accipere Gentilis, qui dicit icterico non accendi febrem, nisi bilis sit vel putrida, vel adusta. Hanc opinionem, quia aridet, confirmamus ex Tralliano, qui ex aliorum quidem sententia quam tamen ipse approbat, duplicem putrefactionis modum proponit; aliam enim fieri ex calido, & humido, id est, humiditate; aliam ex siccitate, seu potius ex adustione, ita enim convertenda sunt illa Tralliani verba: *ἡ πυρρὰ καὶ θερμὴ διαφύεται ὡς ὁ πυρρὸς καὶ ὁ θερμὸς*; non, ut vertit Andernacus; *fieri quoque nonnunquam etiam putredinem ex siccitate, magis autem adustione*, quæ videntur sonare, fieri quidem putredinem ex siccitate, sed fieri magis ex adustione, cum tamen hic sensus sit; fieri putredinem ex humiditate, & fieri etiam nonnunquam ex siccitate, seu potius ex adustione, quæ scilicet non est aliud, quam siccitas iuncta caliditati. Fortasse verò, & liceat adhuc eandem rem confirmare ex putredinis definitione, à Galeno allata vnde primo methodi cap. 8. qua putredinis naturam esse dicit mutationem rotius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam à calido externo; quid enim est huius definitionis quod humorum vitioni etiam non conveniat? sanè enim & tota substantia inmutatur, & ad corruptionem tendit, idque à calido externo, cuius merito contingit vitiatio: hæc tantum differunt; quòd cum humiditas in putredine paulatim extrahatur à calore externo, in vitione celeriter absorbitur, vnde putrescentia humescunt, non humescunt vitiata: ad extremum tamen, & putrescentia siccescunt, & tandem fiunt fæces & cinis, ut scribit Aristoteles. Sed & eodem loco Galenus, cum ex rei aut putredinis ibi propositæ natura, sanationem febris ostenderet, illà in eo sità esse dicebat, ut evacuaretur quod erat putrefactum aut corruptum, reliquum moderatis motibus (ita enim vertunt *ἀποχρίσεις*, quamquam non est par) & refrigerantibus perspirationibus, ad exactā symmetriam reduceretur, nulla igitur mentio exsiccationis, quæ omnino necessaria erat, si humiditate semper constaret quælibet putredo, cum indicationes consideraret Galenus, non quæ ex morbo, id est, febre, sed quæ ex putredine sunt: frequenter tamen paulatim putrescere, potius quam viti contingit. Nam, ut suprà comprehendebamus, pituita & melancholia sunt frigidiæ naturæ,

ut spatio egeant ad calefaciendum, & excitandum febri. Inter ea quæ
 tem antea uocit putredodibis autem per temperaturas non autem reddunt
 re solet, ut accēla absque putredine febrili gignere valeat: Cōtinuū tē-
 men aliquando, ut multis concurrentibus recaloribus, quæ magnum il-
 lius copiam acceruent, & actiorem reddant, exuri possit, & extra putredine-
 nem febri accendere, ut iam duplici ratione in bili accendatur febris
 & putredine & viſione. Atqui nec reticentiam hoc loco, inter recet-
 tes exiſſe Laurentium Ioubertum, qui ex putrescentibus humoribus fe-
 bres nullas gigni præſectim salubres, sed se uescientibus solum, vel viſi-
 nem patientibus scriptum reliquit. Fuit autem hæc veterum quorundam
 medicorum opinio, quam nos etiam supra ex Galieno retulimus; illa
 verò a Iouberto renouata, non ita firmis rationibus adstruitur, ut Ga-
 lenica & communis euertatur: quamquam enim multis solis rem tra-
 æt, duas tantum aut tres video asserit rationes, easque satis fugiles
 quarum prima hæc est. Totus sanguis, ut ex quatuor humoribus
 constat, in vasis non putret, multo igitur minus seorsim quisque ex
 dictis humoribus id patietur. Altera, humores extra vasa minime
 putrescunt, igitur multo minus in vasis; non putrescere extra appa-
 ret, quia œdema, herpes, & scirrhus, quum ex puris humoribus sunt
 ad suppuratorem non tendunt, sicuti phlegmonis consecutio autem co-
 batur, nam vasa, seu conceptacula humorum, propria loca sunt, in pro-
 prio autem loco quodlibet conseruatur; iterum: in vasis humores non
 crientur & fluunt, quod autem mouetur, minus putrescit; tertio, multum
 putrescit minus quam paucum, in vasis autem maior humor ex p a
 est quam in particula tumorem patiente. Non est difficile refutatio.
 Ad primam enim rationem, falsum est quod assumitur, quia nulla san-
 guinis quæ dicitur, in vasis putrescat aliquando, ut per syphilas vi-
 catas febres: igitur poterit id pati etiam seorsim quilibet ex aliis hu-
 moribus. Ad alteram: falsa similiter est assumptio: nam extra vasa putre-
 ſcit & pituita, & alij humores, in œdinate, cæterisque tumores,
 ut expresse dicit Hippocrates, & Galenus libro primo Prognosticorum
 contextu xxxv. cum enim eo libro supra, nimirum contextu xxxj.
 tractasset de inflammatione, id est, fluxione calida; licet sub nomine
 œdematis morte antiquiorum, cuius suppuratorem terminum posue-
 rat diem vigesimum, deinceps particula xxxv. de vero œdema tu-
 ſcepto sermone, id est, de tumore ex frigida fluxione, suppuratorem
 eiusdem terminum ponit diem sexagesimum. Quod si dicat Ioubertus
 hoc Hippocratis œdema non esse ex pura & sincera pituita, sed pitui-
 tum habere aliquid sanguinis; idem porro cur non liceat nobis dicere de
 pituita, ex qua accenditur febris? nec tamen necesse ita dicere: pituita
 enim & lixus melancholicus, frigidi quidem sunt ex sua natura, non ta-
 men tales, ut tractu temporis non possint incallescere in corpore animan-

Quibus omnia consentiunt quæ de hac eadem re scripta sunt libro 1.
de simplicium medicamentorum facultatibus cap. cvj. in hunc modum.
*Et cum in utrisque animalium corpore fiant alterationes, una plane secundum naturam est, cum videlicet in venire cibis coquitur; aut in visceribus & vasis, qui inibi generatur succus, unde rursum pars unaquaque nutritur. Altera contra plane præter naturam, nempe in putrescentibus omnibus atque hæc quodammodo invicem sibi contraria sunt. Tertia ex utriusque mixta, & media est, partim quidquam obtinens primæ, ac secundum naturam, partim huius contrariæ, quæ est præter naturam: si quidem alterationi secundum naturam duo hæc insunt, ut & ex familiari animantis materia fiat alteratio, & ab ingenio cal. re planè superatur: ei verò quæ præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio provenit, & ad nihil vile. At media eorum, quæ scilicet suppurationes committitur, ab ingenio quidem fit calore, sed non planè vincente, neque enim ex materia peragitur, quæ prorsum benigna sit, neque tamen ex omnino aliena. Hæc omnia ex Galeno: quæ à me ideo sunt adducta, ut appareat quis putredinis modus in febribus sit attendendus: nam cum humorum putredo, quæ in vasis fit, similis sit ei quæ in inflammationibus atque abscessibus reperitur, ut scribitur primo de differentiis febrium vj. & hæc sit varia, aliquando vincente, aliquando victa natura, aliquando etiam mixtim se habent, ut eodem primo de differentiis febrium recitato loco habet Galenus, non audimus febres fieri ex humorum putredine, non statim intelligere, debemus, fieri ex ipsis omnino putrefactis, & ex necessitate comite febre: quod cum non adinveniret Ioubertus, in paradoxam medicæ opinionem propositam, febres salubres ex putrescentibus humoribus nunquam accendi, sed lethales tantummodo: dicimus enim illam, quam quædam dicitur putredo, plus habere coctionis aliquando, ut ex dictis liquido apparet, unde & salubres febres esse nihil verat. Quædam tubidem intrudit eodem paradoxo Ioubertus, ad eandem rem pertinentia à propriis, & veris sensis detorta, uti suam adstruat opinionem, quod tamen non potest, sed non sunt mihi omnia illius viri somnia huc addenda, & refellenda: vnum tantummodo proponam, tum capiti finis erit. Dicit igitur Ioubertus, sanguinem tantum in venis putrescere, quod tamen non facile, nec sæpe, seu quæ de causa, sed in putrida atque pestilenti cæli constitutione accidat, inde fieri morbos lethales, in quibus scilicet putris est sanguis: illud ex Galeno probabat Ioubertus, nam primo in vj. Epidemiorum xxix. ita habet, ut quidem citat Ioubertus: *Præsentis diuturnis febrium catalogus à caliditate sumitur differentia, in qua pestilenti febri contineri potest, quod putrem habeat humorem. Et deinceps: Pestilens si latè significatur, quæ ex eo ab aliis differt, quod omnino vitiosa, id est, putrescentem habeat caliditatem.* Ex his à Iouberto adductis (quod obiter dixerim) colligebat Hieronymus Mercurialis, argumentum proponi à Iouberto tale. Galenus discrimen constituens febrium pestilentium ab aliis, dicit pestilentes differre ab aliis putredine; si differunt putredine, igitur ter-*

tu, alias febres originem non habere ab humoribus in vasis putrescentibus. Ita bene Iouberti verba hæc acceperit Mercurialis, ac alias rationes, quas ex ipso de eodem argumento refert, quæ enim erant principes Iouberti rationes, quas nos attulimus, eas omisit Mercurialis, quæ autem probationes alie vius ex assumptionibus, illas tanquam principes rationes ex Iouberto adduxit: sed omittamus alia. Dicimus modò proposita Iouberti verba cò tendere, ut doceat quomodo fiat febris pestilens, scilicet ex sanguinis putredine, & hanc vnam agnoscit ex putredine febrem, eamque lethalem, præterea nullam, nullos enim alios putrescere humores, sed fallitur Ioubertus, & ex Galeno adducta verba, id non probant. Et quod attinet ad primum, corrumpit extrema verba, non enim scribit Galenus, *in qua pestilens febris contineri non potest, quòd putrem haberet humorem*, sed quòd putrem habeat τὸ θύον, id est, calorem: est autem humor leui manifestus hic sensus: cùm febrium enumeratio in presenti sermone proposita à caloris differentia accipiat, sub ea contineri etiam pestilentem febrem, quia σπυδαία, id est, putridum habeat calorem, unde & hanc febrem speciem superiori adnumerari vult, quia in caloris differentia conuenit; est enim & illic putris, licet hæc se aliis excellat, quod paulò post subdit. At verò, nec si etiam humorem legamus, quomodo locum corrumpit Ioubertus, nec ab ipso stat: non enim neque hoc modo discrimen pestilentium ab aliis, sed communitatem potius ostendat. Qui sequitur alter loquens eisdem verbis scriptus, nil aliud ostendit, quàm pestilentem febrem cùm ex calore putrido & ipsa constet, hoc tamen genere excellere; & ita locum acceperit Cruferius interpres, qui vertit, *sola pestilens febris derivatur, cuius ab aliis calor per putredinis excellentiam differt*. Nec tamen existimandum, vocem σπυδαία insignem significare putredinem, quod satis planè accipit Mercurialis, addens ea voce putredinem insignem semper ab Hippocrate appellari, cùm ex Galeno manifestè constet, idem valere ac σφύζον, nimirum simpliciter putredinem: hic enim auctor primo de diffier. febrium capite quinto, probans febres ephemeræ non esse putridas, scribit, τὸ γυμνασκήσαντων θάνατον διαμαρτίας ἀνθρώπων παρὰ τὴν ἀνάσταναν χυμῶν, id est, ei qui se exercuerit, vehementem præter naturam caliditatem absque succorum putredine [σφύζον] accensam esse; & de eadem ephemeræ paulò post, ἐνέμεινεν ἀνὸρ σπυδαίον χυμῶν, id est, febriscauit absque putredine [σπυδαίον] succorum. Rursus de putrida fuligine quæ ex bubone ascendit, dicit ἡ σπυδαία καὶ λευκή, nec tamen nisi putridam simpliciter fuliginem intelligit, iterum eodem capite, δὴ ὅτι τὸς κατὰ τὴν σπυδαίαν, & τὸν λευκὸν ὅς ἐστιν ἀγρίων σπυδαίον, & ὅτι καὶ σπυδαίον χυμῶν, id est, sed in ea quæ in visceribus, & magni vasi, sit putredo, [σπυδαία] veluti sumus ex putrescentibus succis. vbi simpliciter putredo etiam intelligitur, sicuti etiam in his quæ sequuntur, σπυδαίον ἀνάσταναν θύον, putridum accendere calorem, nulla insigni conditione: his similia de eadem voce, loca plurima alia adducere liceat facilè, sed superuacaneum omnino existimo. Non

tamen

tamen non est putredinis, sed ad Hippocratem ad significandam pestilentem putredinem, quia & ipsa putredinis est, sed id ad eam ea significari, hoc verò negis; putredinis porro excellentia quæ posteriori loco comprehenditur illam designat verbum *diagnosiv*: profecto enim illud verissimū est, putredinis excellentia putredinis aliis antestare nec tamen, non etiam ex minori putredine dantur aliæ febres non pestilentes, nec lethales, sed salubres. At verò quod apud Trallianum obiiciebant illi medici de vermibus, qui non gignuntur in venis, quod fieret, si ibi esset putredo, quomodo diluuntur? facile ennuero: non enim ex cuiuslibet rei putredine fiunt vermes, aut animalia, nec quolibet eius gradu, videtur putredines fructus, vestes, & ligna sæpenumero absque vermibus, sed & in cadaveribus ipsis non statim illi exoriantur, nam & materialis & efficientis causæ necessaria est ad eandem rem opportunitas, sine qua eorum generatio non constat.

Declaratur Galeni sententia de duplici februm genere, quæ per bubones oriuntur, & Argenterej argumenta aduersus eum diluuntur.

C A P V T X X X.

DICTUM fuit superiori capite, ex bubone duplex esse februm genus, ephemerarum, & putridarum, ephemerarum, siquidem bubo esset à causa procatartica & manifesta, putridas, si absque ea: ratio autem erat, quod ex bubone à causa manifesta, haud ascenderet ad cor putrida fuligo, quæ in loco bubonis manebat circumscripta, sed calor tantummodo, subinde omnium partibus exalfectus cordi communicabatur, eiusque spiritus inflammabat: alio autem bubone exorto, putrida fuligo disseminata, & diffusa vsque ad cor, humores ibidem attingens, & inficiens putridam creabat. Hæc doctrina ex Galeno est primo de different. februm cap. vi. addit autem Galenus, quod totam rem evidentiùs declarat, febres ex bubone illas quæ non sunt de genere ephemerarum, morbos nuntiare non facili tractabiles, quippe qui ortum ducant ex interna aliqua inflammatione, aut ulcere, aut abscessu, aut aliquo huiusmodi affectu in viscere, in quam sententiam similiter commentario ad Aphorismum lv. quarti libri, scribit, febres diarias esse ex bubonibus, quum hi ex causis manifestis consistant, alios autem bubones, qui sine causa manifesta fiunt, esse verisimile fieri ex viscerum inflammationibus, atque ideo febres, quæ vna cum

cum quibus etiam, etiam sit. Causam Galeni in quoque locum
conferre, etiam Argenterius, et talem esse que illis committitur ostende-
re docet, etiam talis argumentum. Primum bubones ex quibus sunt fe-
bres putride, non sunt, etiam in illis internis, hanc enim trahant
potius ad se, iam talem bubones, quam ut eis producant; non enim ex
altera inflammatione altera venit, nisi in admodum vicinis partibus ex
solutione alterius altera nascatur, ut antra in pleuritidem, & hanc in
peripneumonia transiit, sed ex una periclitante non pullulat alia. Ite-
rum: Glandula à natura duntaxat facta ad expurganda viscera à fluxio-
nibus, & excrementis, quae ubi continentur, non igitur in visceribus in-
flammationes sunt, cum ad glandulas magna illa defluerit: ita in pesti-
lentie casu, nemo haec, nus memoriz prodidit inflammata reperiri vis-
cera, cum emergunt bubones. Praeterea, viscerum inflammationes non
possunt esse causa aliquotum bubonum, cum saepe videantur hepatis in-
flammationes, cerebri, & pulmonis, sine bubonibus. Nec admittit Argen-
terius, cui leues causas non possit parere nisi bubones, qui diarias solum
efficiunt, quoniam ex omni bubone causam communem dari vult, ad ma-
las & putridas febres procreandas, iuxta Galeni doctrinam, est autem illa
causa putredo, quae est in omni bubone: discriminis autem rationem quam
proponit Galenus, nimirum ex bubone, qui diariarum efficitur, non effeciri ad
cor putridum fuliginem, sed totum communitari calorem, continuis par-
tibus subinde excoactis, putredine autem ipsam, & putridam fuliginem
primariam in bubone circumscriptam, in bubone verò qui alias febres
accendit, putredine emitti fuliginem putridam, quae calorem putridum,
et febrem putridam accendit, id Argenterius vanum, & commentitium
putat, ac appellat epiemiam, etiam clanciam, non enim rationem, aut experien-
tiam docere, putredinem aliquando circumscriptam manere, aliquando
perire, & ipsam in alias partes, cum eadem sit distantia, eadem vix per-
uenire, eadem etiam efficiens, id est, putredine, nec iam credendum, à bitrium
dum aliam putredinem, alteri non item, ut à loco putredinis putridam fuli-
ginem modo emittat, modo non emittat. Existimar itaque Argenterius,
bubones qui parviunt epiemias, ex externis, & lenissimis causis natos ca-
ere putredine, & solum ibi existere excoactionem, inde fieri epiemias;
et cum alii putredo, sunt putridae, cum ex putredine, aut suppuratione
in digito pedis, parte distantissima à corde, fiat etiam putrida, alios autem
bubones qui internas causas habent, vel malignitatem humorum, aut
excoactionem copiam, quae cogit naturam ad expellendum, non consi-
dere sine putredine. Putamus autem vera esse quae à Galeno scripta sunt, &
Argenterio forte contradicendi studio ductum, Galeni mentem non
esse illecebrum, quae si pateat, iam facile erit argumenta dissolvere: qua
ratione nimirum fiat, ut si bubo sit ex causa manifesta, non perue-
nit putrida fuligo ad cor, perueniat, si aliter exortus sit: scire itaque

licet, cum simul cum bubone sit putrida febris, ideo eam contrahere, quia & putredo, & fuligo putrida est diffusa, & disseminata per alia etiam viscera interna loca, unde potest uor attingere, & febrem putridam parere; cum autem sit ephemerata, retineri eam in loco bubonis, ex quo non facile pateat aditus ad cor. Igitur, dicit Argenterius, aut alius pro eo, febris isthæc putrida non est ex putredine quæ in bubone, sed ex ea quæ est diffusa extra ipsum; id verò concedimus, quamquam & hanc aliquid conferre; bubonem tamen principaliter tanquam signum accipimus, quod manifestè innuit Philotheus in commentario, qui febrem putridam præcedere vult, consequi bubones: è contrario ephemeratam sequi, bubones præcedere. Verùm obicit Philotheus, si alios bubones sequatur febris, alios anteit, cur simpliciter dicit Hippocrates, è *bubonibus febris*? soluit, habuisse Hippocratem rationem consuetudinis, quod interpretor, eius quod sæpius euenire solet, aut sicuti exponit Hollerius, locum Hippocratem more vulgi, quia igitur ex consuetudine bubones sequitur febris, potuit simpliciter dixisse, è *bubonibus febris*. At verò nobis sufficiat, eodem tempore utraque inuadere, alterum cum altera, quomodo Galenum accepisse conicio ex verbo *παρεσβάντων*, quo utitur scribens, *τὴν αὖτὴν ἀπὸ ἀρχῆς ἐν τῷ σπλάχνῳ φεγγυοντὴς, consentaneum est, ut à simul cum usum rationibus innuere*, ita enim & oratio, & res tota liquidius procedit. Igitur, affectu intus in viscere suborto, multaque seu maligna existente materia, tum cordi communicatur putredo, & fit febris putrida, tum etiam emunctoriis eadem communicata bubo fit, quod internam affectionem esse ostendit: at verò si ob externam aliquam causam, ut ictu, aut contusione, corpore intus minimè vitiatò, oritur bubo, erit quidem in eo putredo, at ob distantiam non communicabitur cordi, verùm solus calor, quomodo est dictum; est etiam id facilius, & expeditius, ac ita fiet diaria non putrida. His per hunc modum explicatis, Argenterij argumenta particulatim diluamus. Igitur sicuti ex vna perdurante inflammatione aliam non pullulare concedere licet, ita ex eisdem causis duas eodem tempore nasci, nihil puto, prohibet. Si igitur multa materia sit intus, quæ naturam prægauas, tanquam noxium & inutile onus eiciatur, quid vetat illius partem, aliquò intus abscedentem putrescere, & inflammari locum, eiusdem autem partem aliam ad cutim, & propria emunctoria mitti, ibidemque similiter putrescere? communicari enim à partibus internis humores, quicunque sint, externis non obscurum est. Ad alterum argumentum. Non perpetuò ad glandulas mittitur, quicquid ad expurganda viscera necesse esset, nimia enim aliquando redundat materia, & virtus debilis est, unde irritus conatus; quare licet

pars eius mittatur, ex qua fit bubo, pars adhuc locum inflammans retinetur. In pestilentia casu, cum emergunt bubones, si nemo scripsit inflammata esse viscera, id causæ fuit, quod nemo necesse putauit illud curiosius obseruare, aut memoriæ mandare, quod ratione faciliè comprehendi posset: manifestè tamen illud haberi potest ex Thucydidis verbis, quibus se uam illam pestilentiam describit, propositam etià à Galeno, quos enim illa percussit, eis inflàmata uehementer fuisse viscera hæc verba manifestè indicant. *Interea uerò corporis partes adeò flagrabant, ut ne subtilissima quidem stragula, & lineæ superiecta, nec aliud quidpiam nisi nudos esse ferrent*: hi uerò si non bubones habuerunt, saltem pustulas paruas, & vlcera in cute, unde sicuti materiæ parte transmissa ad cutem, alia ad inflammationem intus relictæ fuir, ita ad inguina, seu alia emunctoria pars transmitti commodè potest: hepatis autem, cerebri, & pulmonis inflammationes sicuti sæpe videntur absque bubonibus, ita easdem cum bubonibus videri aliquando nihil prohibet, & videntur aliquando, ut etiam erysipelata in facie à cerebri inflammatione communicata, quæ etiam lethales affectiones esse consueverunt; Ex omni autem bubone nullo discrimine nasci posse malas, & putridas febres, si quidem putredo in omnibus adsit, iuxta Galeni doctrinam, quod colligi vult Argenterius, non sanè consequi, declarata Galeni opinione, planum fecimus. Ex quo etiam patere potuit, non esse eandem, nec distantiam, nec vias, nec causam, seu putredinem: sed alia, atque alia, magisque apta ut putredine cor afficerent. Nec uerò etiam ex digiti pedis suppuratione quæ fit febris, illa putrida est, quod dicit Argenterius, sed ephemera, nisi si prauus aliquis affectus antea in corpore affuerit, aut interim suboritur, putrida sub eo euadat; in bubonibus autem qui pariunt diarias, adesse putredinem, licet non semper, nec ex necessitate, quod negat Argenterius, sensus testimonio vel chirurgi comprobent, qui eos dissecantes; pus sæpenumero colligunt.

Febris diaria vnde dicta, cur alia vno tantum die, alia plus vno aliquando dures: quæ ex parua est obstructione, plurimos etiam aliquando durare, & secundam habere accessionem, in eaque sanguinem nulli debere.

CAPVT XXXL



FEBRIS ephamera, aut diaria hoc nomen habet. Coniuncta est ab ephemero animali, sicuti nonnulli arbitrantur; sed & febris, & animal eadem ratione & probatur à die quod unus diei opera exstant: diaria enim talis dicitur. Sic & planta illa lethalis, ephemeron Celsus vocat, quod vno die necet, & alia non lethalis, ephemerò, quod vno die flores amittat, hoc nomen accepere: diaria igitur febris dicitur, quia vno tantum die durat, nimirum hinc viginti quatuor, comprehensa simul nocte, ut scribit Galenus nono methodi capite primo, & decimo eiusdem methodi capite secundo. Durat autem vno tantum modo die hæc febris, quod soli in corde, & arteriis, ac aliis vasculis inflantur sunt spiritus, materia subtilis admodum ac tenuis, ut calorem diutius sustinere non possit, sicuti paleæ flammam breuiter extinguere necesse est, verum ad hanc rem sunt quæ adnotemus, longiori enim tempore eam perdurare posse legimus, nam & ad secundum, & ad tertium usque diei pertrahi scribit Galenus: Nec veto de fynonibus absque putredine loquimur, quæ diaria & ipsa dicitur; de hac enim certum est, sed de aliis quæ, de quibus Galenus primo de diebus decretorum capite nono. *Certe omnes febres diarias solutionem partim in primo statu die, partim in secundo nanciscuntur: non enim quæ solui dicuntur secunda die, fynonibus sunt absque putredine, illæ enim diutius durare consueverunt: nono etiam methodi capite primo, cum vno die circumscriptionem esse diariorum accessione proposuisset, fieri aliquando per ea quæ delinquantur tradit, ut tum illæ, tum etiam quilibet alius morbus porrigatur, aut in aliud genus transferret. Auicenna etiam cum tertium diariorum vltimum diem statuit, ad tertium quoque extendi significat illis verbis: *Et sic quidem secundum plurimum recedunt in die vno, & raro pertranseunt in tertium.* Adicit, aliquos dicere eas durare totos sex dies. At verò quomodo si ultra diem vnum extenditur, dicitur diaria? Ita enim Galenus nono methodi cap. 1. *Quomodo enim dici diarsa febris potest, quæ in tertium diem**

diem exenſiſſe, ut, quando ex ipſa nominis ratione in ſecundo eam deſſere nunc erat
 quamquam eum de ſynochis diariis eam ſententiam probet Galenus,
 ad alias tamen non minus accommodati valeat. Dicitur autem, ſi-
 cuti de ſubſtantia earum febrium diarie vocabulum non eſt, quod
 eodem loco ſubiecit Galenus, ita nec de ſubſtantia aliarum diariarum,
 quarum forma, & natura in ſpirituum accenſione ſic poſita. Vtrumne
 autem plus quam vno die hunc accenſionem durate contingit? ratio-
 ne proſectò vix eſt quod colligas, niſi hoc tantum, aliam tardius, aliam
 citius exingui: quippe ſpiritus alij tenuiores, alij craſſiores ſunt; craſ-
 ſiſſimum autem flamma durabilior eſt: de termino autem niſi quod
 obſervatum eſt, proſeras penè nihil, ut enim tertianam exquisitam le-
 ptem circuitibus iudicari obſervatione collectum eſt, ita in ſpiritus
 accenſam febrem vno die, verùm ſicuti tertiana, humoris tractione
 ex quo fit, non ſemper exquisita eſt, unde ſeriatum illum ſæpe ex-
 cedit, ita ex varietate ſubſtantie ſpiritus, duratio ſus celeritate et
 ſus variat: ſpiritus enim, ſive aëris naturam referat, vnde aut aer,
 aut aërea ſubſtantia dicatur, ſicuti a Galeno primo de differentiis
 febrium primo, ſive ad ignem potius pertineat, vnde potius ignis li-
 cendus ſit, quod magis auidet Fartunio Licio, libro de his qui diu-
 tius viuunt ſine alimento, cum non ſit ſimplex corpus, ſed mixtum,
 & humore, & frigore participet, ut ex Galeno habetur libro de tremore,
 palſatione, conuulſione, & rigore, & quinto de decretis Hippocratis
 & Platoniſ capite tertio, vbi e in ſpiritu duas habere partes propoſit,
 & duo elementa, ac duas conſtitutiones, frigidum ſcilicet & calidum,
 ſeu aërem, & ignem, quæ inter ſe tota ſunt conmixta, & conſuſa, quin
 etiam duas hæc partes ſeu elementa, ex corporibus in quibus inſunt, va-
 porem quendam contrahere dicit. Igitur ſpiritus hic, tum ratione propria
 elementorum, tum vaporum quos contrahit, modò ſubtilior, & mo-
 dò craſſior eſt, & inde febris, quæ ipſo inflammato conſiſtit, modò
 breuior, & modò paulò longior fit. Atque hæc quidem vna ratio eſt,
 ex ipſa febris, aut materie, vnde febris oritur, ratione ducta, alia au-
 tem ex iis quæ febris ipſi aliquando iunguntur, nimirum ex cauſis fe-
 brem efficientibus, qualis eſt obſtructio, ex parua enim obſtructio-
 ne diariam fieri aliquando accidit; ſicuti autem ex natura febris, li-
 cêt plus quam vna die ea duret, non tamen ſecundam, aut tertianam
 excedet, ita quæ ex obſtructione eſt, non video cur multos præ-
 terea dies morari non poſſit: ſi enim dum adeſt obſtructio, non
 poteſt expiſcare calor, durare febrem omnino necellè eſt, ac ſi prio-
 res alios incenſos ſpiritus præ tenuitate ſubſtantie qua ſunt præditi,
 diſſipari dicamus, obſtructione tamen facta, alios incendi qui non
 tranſpirent necellè eſt, vnde porrigatur febris, id autem tardius

sicui posse dicendum, quandiu perseverat obstructio, quæ cum plures dies perseverare possit, ad plures etiam, & plures porrigi febrem, aliis ac aliis subinde accensis spiritibus; quomodo tamen si non unam tantum, sed plures inuicem succedentes & continuatas diarias dici quispiam velit, quamquam non puto necesse, non enim sub febris ex humore accensis, idem numero toto morbi tempore semper calefcit humor, non tamen ea de re contendam; sed illud convinci respondebo, diariam ex obstructione ad plures ac plures dies produci posse. At verò, utrumne producta hæc diaria sola persistet, an ex necessitate alia febris, aut synochus absque putredine, aut ex putridarum genere aliqua, eidem iungitur? talem profecto aliquam iungi, videtur existimare Galenus loco citato ex octavo methodi capite quarto, cum scribit, diariæ ex prava obstructione ortæ, in mali succi naturis febrem succedere ex humorum putredine ortam, in aliis autem temperamentis aliquam citra putredinem continentis febris speciem: Igitur diaria, per se & sola consistens ad tertium usque diem tantum extendetur, eo enim abeunte termino fieri non potest, ut ex inflammatis spiritibus, vicinæ & societatis ratione, non succendantur etiam humores aliqui, unde alterius generis febris exornatur. Dubitare autem rursus liceat, utrum post tres primos illos dies adveniente alterius generis febre, diaria remaneat, an sub hac, seu synocho, seu putrida, diaria extingatur? Sanè de ea re disputant aliqui. Galenum autem, qui succedere dixit, vel putridam, vel synochum, existimare liceat abiisse diariam voluisse: profecto si non abiit, quod non putem necesse, adeo à putrida, seu synocho obscuratur, ut iam à medico habeatur despectui. Clausula hæc esto: diariam sine obstructione, una die, seu horis viginti quatuor, aut paulò plus, & unica accessione terminari, uniuersis semel incensis spiritibus, semel etiam refrigeratis, aut extinctis; diariam autem ex parua obstructione ad tertium totum diem morari licere, & secundam habere accessionem, quamquam exiguam, quod manifestat Galenus octavo methodi capite quarto ad finem, cum loquens de tali diaria, quæ ex parua obstructione est, prima die non terminat, nec secundi aliqua parte, uti nimirum aliæ diariæ, licet in pulsû nullum sit putredinis signum, & urinx sint coctæ, tertio tamen die accessionem redire scribit, quamquam mediocrem, qua conditione etiam sint & urinx, & pulsus: talis autem febris inter diarias adhuc reponi potest, non tamen simpliciter, nec eo nomine simpliciter appellanda. Galenus eodem loco appellat eam similem diariis, talémque esse dixit per initia morbi, procedente autem tempore in aliud genus transire: aliqui appellant diariam extensam, aut productam: in hac autem ex Galeni præcepto eodem loco mittendus sanguis est, licet plenitudinis signa non appareant, si tamen vires & ætas ferant, cum in aliis diariis non liceat.

*Qui dicantur morbi particulares, aut in partibus seu partium, & locales, ac appropriati, & quare hoc nomine appellantur
Qui itidem vniuersales. Titulus quarti libri
Auscenna explicatus.*

CAPVT XXXII.

MORBOS particulares, minùs eleganti, sed in scholis tamen vfitato vocabulo dici, qui partem aliquam nostri copotis obfident, & alij à febre sunt, vulgò video etiam à doctis viris: appellantur idem locales, & magis adhuc ruditer appropriati. Ea de re, quia quædam adnotata habemus, ea proponere placuit. Celsus appellauit hosce morbos in partibus, quum libro tertio capite primo morbos omnes ita diuifit, vt alij in totis corporibus confiftere viderentur, alij in partibus. Fernellius ex recentioribus non inelégans medicinæ fcriptor libro quinto, morbos partium, licè in eisdem morbis enumerandis difsonet à Celfo, qui quosdam totis corporibus assignat, qui Fernelio & aliis, in partibus funt, qua de re particularim poftea loquemur. Ratio autem quare hi morbi dicantur particulares, ex fubiecto eft, cui infunt, quod fubiectum eft pars quædam certa & determinata, cui ita inefle folent, vt in alia nunquam confiftant, vt ophthalmia nō nifi in oculo fit, furditas nifi in aure, pleuritis nifi in mēbana fuccingente coftas, peripneumonia nifi in pulmone. Non ita in febre, quia fubiectum febris eft vniuerfum corpus, & fimul fingulae ipsius partes, calor enim, qui eft febris effentia, occupat in febris totum corpus, & vniuerfas partes, vt fcribit Galenus libro de morborum caufis capite fecundo, nifi tamen impediatur, ficuti fit in lypnia, in qua per vniuerfas partes extendi non potest, fed natura febris hæc eft, vt extendatur, cum quoq; tamen verum eft, aliquas partes magis, aliquas minùs incalefcere; fœcus enim putredinis in putridis magis, & cor in omnibus; Omnes tamen partes quæcunque funt incalefcunt fic, vt febrile omnes dici poffint, etiam digitus; Igitur febris eft morbus in toto, alij in partibus; non tamen folæ febres in totis corporibus confiftere dicuntur, quod à doctis viris proponi dixi, fed alij plerique à Celfo inter hos collocantur, phrenitis, & alia infaniz genera, morbus cardiacus, lethargus, aqua intercus, tabes, morbus comitialis, morbus regius, elephandia, apoplexia, & paralyfis, hos autem collocari à Celfo inter morbos, qui funt in toto, manifefte patet ex illius verbis: nam cùm diuififfet primo capite libri tertij morbos omnes in eos qui in totis corporibus confiftunt, & eos qui oriuntur in partibus, dixiffetque fe de omnibus pauca præfatum à prioribus incepturum, poft præfationem incipit

cepit a sibi ipsis, tum de illis ab alio fecerunt. *probatos de septem capitula, caput decimum octauum* hinc verbis. *Id est. Eiusdem ratio exposita est: supersunt vero alij corporis affectus, qui tunc supersunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt, proximus incipiam ab infamia; post cuius tracta nonnulla persequitur morborum genera, quae a me paulo ante numerata sunt, quae verbis morborum recensita a Celso, dicuntur certis partibus assignari non posse. Sed non desuisse, qui legemint hunc locum abque negatione in hunc addum, Ex quibus eos, qui certis partibus assignari possunt, proximus incipiam ab infamia. Sed quae scribuntur a Celso capite primo subsequenti libris quarti, ubi morbos incipit explicare, qui sunt in partibus, idem faciunt locum totum libri esse legendum cum negatione, habent interea verba ex quarto libro sic. *Halenus* reperitur ea genera morborum, quae in totis corporibus ita sunt, ut incerta sedes assignari non possint, nunc de his dicam, quae sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi, curatio nunc etiam venient, si prius eorum, quos breuiter ostendero, quos sibi postquam vili sibi est ostendisse, sibi sit in initio inlequentibus morborum librum. *Huius* verbi in consilium quendam, *matenus* scire curatio necesse est, ad illius remedia singularium librum artem prius in exequit, omnia a capite. Et a dolore capitis initium facit. Non debet morbum quare, qui morbo & phlegma, & lethargus, & epilepsia, & poplexia dicti sunt a Celso in sibi in toto corpore, qui potius in parte, id est, in capite videtur collocandi, illud enim nobis scius est, ad ostendendum poplexiam in initio diuisionem non esse accipiendam, ex enumeratione Celso, qui quod esse, qui manifeste in toto corpore consistunt, ut tubercula, & regius, aqua intercus, praesertim athenica, elephantia & similia sunt in toto corpore. Præterea vero intemperies etiam quilibet, non solum calida, ut est febris, sed frigida etiam, aut sicca, aut humidatantum corpus occupans, morbus est vniuersalis, atque in toto corpore. *Ve* ad aliquam ex his referre licet nonnullis ex in abis, quae ex Celso protulimus, sed & ad hoc ipsum morborum genus, quod in toto corpore consistit, educere licet morbum Gallicum, quamquam ad nuam particulam intemperiem velint eum pertinere: vena etiam quaedam non destinata parti in totis corporibus esse non tantum dicatur, quoniam talis pestilentialis, & pestis ipsa. Igitur ratione partis tubercula, qui morbi singulantes, dicuntur in partibus, huius ratione eiusdem parti subiecta, quod est totum corpus, in totis esse dicuntur. Porro particulares, aut partiales, aut in partibus, appellantur etiam à nonnullis locales barbaro vocabulo, quia loca dicuntur partes in totis corporis, siue sint similes, aut siue partes, siue dissimiles, aut compositae, iuxta quam significationem incipit libros de locis affectis, & libros de compositione medicamentorum localium, aut secundum locos, & medicamenta localia appellauit in eodem libris Galenus arthritica, stomachica, & hepatica, quae partibus in proprio destinatae.*

data sunt. Distinguitur idem morbi, ut antea scripsi, à Barbaris appropriati, quia certa parti proprii sunt, nec alia contingunt. Atque hæc de morbis particularibus, ut patet, ita se habeant. Quærebam cur Auicennas librum quarti Canonis, in quo primum quidem tractat de febribus, tum chirurgica, tum moris, vulneta, vlcera, & alia; tum de venenis facto sermone in decorationem desinit, inscripserit de ægritudinibus particularibus, quæ quum accidunt, non appropriantur vni membro: si enim febris est morbus in toto, quomodo particularis dicitur; ac si est particularis, quomodo non appropriatur vni membro? Occurrebat: febrem, particularem etiam morbum dici posse, si consideremus quibus illa subicitur, & quæ de ipsa dicuntur, siue, ut loquuntur, modum prædicationis: subicitur enim intemperiei calidæ, qui generalior febris morbus est; sicuti magis adhuc eiusdem febris species, tertiana, quartana, & alij morbi particulares per hunc modum appellantur; sunt autem non particulares genera prima morborum, de quibus nulli alij dicuntur. Febris igitur per hunc modum est particularis morbus, nec tamen proprius vni membro, quoniam per omnia membra diffusæ hæc de illa Auicennæ inscriptione quod pertinet ad febrem; de reliquis, quæ in eo libro, non quarto in præsentia, vnum addo, tum capiti finis erit. Qui dicuntur particulares, aut partium morbi, si actionum læsiones attendimus, vniuersales, & in totis corporibus morbos esse dicendos, præsertim vbi grauiores sunt, dolor etenim capitis, ophthalmia, pleuritis, peripneumonia, & alij, licet certis sedibus assignentur, vniuersas corporis actiones lædunt, primò quidem & maxime actio læditur propria illius partis; inde verò per consensum alius noxa communicatur, huic magis, illi minis pro ratione consensus.

*Galenici loci vulgata lectio retinetur aduersus Fuchsum,
& Leoniceni translationem. Eiusdem loci sensus explicatus.
Fallestij interpretatio reprobata, & Galeni
defensio aduersus eundem.*

CAPVT XXXIII.



GALENVS in commentario ad Aphorismum xxv. libri quarti, sicuti legitur in impieffis Aldinis codicibus, ita habet: ἐν τοῖς ὑποκειμένοις ἀπορροαῖς ὁ λειπόμενος τὸ ἐξ ὧν πλεονέχει διὰ τῶν σωματικῶν, ἢ τῶν ἰδίων ἰκκισμῶν, ὥς τι τὸ ἐκ τῆς διὰ τὸν σπλῆνός τε καὶ τοῦ σπλῆνός τε ἀπορροαῖς αὐτῶν λειπόμενος αἷμα τὸ διὰ τῶν σωματικῶν ἰκκισμῶν μόνον, ἀλλὰ τὸ πλεονάζον διὰ τῶν διὰ τοῦ σπλῆνός τε, id est, In præcedentibus Aphorismis sermo ipse fuit de iis quæ per os, & sedem excernuntur, quare & in proposito Aphorismo etiam, quando ipse dicit, supra

solum quæ sit per os excretionem intelligimus, illa quæ sit per nares omiſſa. Sed Leoniceus, ut apparet, aliter scriptum habuit hunc locum, scilicet in hunc modum: *οὐκ ἔστι τὰ μέλαινα ὑπερχαρούμενα ἐν τοῖς ἡμέτεροις ἀφορισμοῖς ὁ λόγος αὐτοῦ χύσσει, νῦν δ' οὐκ ἔστι διὰ τῶν εἰρημάτων*, &c. ita enim conuertit: *De nigris deiectionibus sermo habitus ab ipso est in precedentibus Aphorismis, nunc verò de iis, quæ vel per os, vel per sedem excernuntur verba facit*, &c. nosque etiam similiter calamo exaratum habemus in exemplari quodam Aldino ad oram libri, quibus etiam similia reponit Fuchsius, codicem Græcum emendans, sed inutilis ac damnosus mihi quidem videtur hic Fuchsi labor, cogorque à Leoniceo versione, marginibus mei libri, & Fuchsi sententia recedere, vulgatæque Aldinæ lectioni adherere: vult enim hoc statim initio proponere Galenus, voce illa, *supra*, intelligendam solummodo esse excretionem per os, quæ autem per nares, eam non comprehendit: docet autem id ea ratione, quia cùm in precedentibus Aphorismis sermo Hippocrati fuerit de iis quæ excernuntur per os & sedem, non autem de iis quæ per nares, nunc de iisdem excretionibus sermonem proseguens, iam voce illa, *supra*, quæ sit per os, excretionem intelligit, ea quæ sit per nares omiſſa; concinnum autem sensum ex Leoniceo translatione haurire ego non possum, nec illatiua illa, sicuti appellant, particula [*οὐκ ἔστι*] quem locum hic habeat videre; expositio autem Galeni duplex est. Prima huiusmodi: sanguis per os emissus colore siue niger, siue alio, substantia seu crassus, seu tenuis, malus est: si verò per inferna excernatur colore niger, melius est. Probat autem magis colore niger, quoniam emissionem, aut fluxionem paulatim factam ostendit, quippe dum inter excundum moram trahit, denigratur, si enim vniuersim, & cum impetu emittatur, non potest nigrorem acquirere; qui autem ad intestina vniuersim confluit, malum oportet existimare. Eiusmodi igitur sanguis per inferiora exiens, ei comparatu qui exit per os, bonus dicendus, ille verò malus; per inferiora enim semper magis eligendus quàm per os. Deinde verò aliter exponit Galenus secundum membrum Aphorismi, & coarctat vocem *infra*, ad sanguinem ex hæmorrhoidibus fluentem, cum antea ex intestinis quomodocunque emissum intelligeret; & ait, cùm malus sit sanguis quicunque per os emissus, fluentem ex hæmorrhoidibus esse bonum, quum hominis natura multum nigri sanguinis accumulauerit, & talis sit qui per hæmorrhoidas euacuetur sanguis, à multis enim aut sanatur, aut præseruatur passionibus.

Ex priori expositione repugnantiam dissoluit Galenus inter Hippocratis dicta. Proposuerat enim paulò antè, id est, Aphorismo xxi. deiectiones nigras, siue cum febre, siue absque febre, esse pessimas. Quomodo igitur hic dicit esse bonas? Respondet Galenus, non bonas simpliciter hic esse dicit Hippocrates, sed illis comparatas quæ per os excernuntur, quippe meliores illis & magis eligendæ; at
quomo

quomodo pessimæ dicat: aliqui si meliores illis? Id effecit, ut Vallesius non solum hanc Galeni expositionem non acciperet, sed & scriptura Aphorismi, quam Galenus sequitur improbat, alij adhæret, quam haberi scribit in antiquissimis codicibus, & quam proponit Fuchsius, licet Galenicam sequatur: habet autē sic *κατὰ δ' ἀρὰν, κ. τι μάλιστα ὑπερβαίνει, καὶ*, id est, *infra autem bonum, & nigra subeuntia malum*. Quomodo sanē ille interpretetur Aphorismum, apud ipsum videre licet, nos tantummodo Galeni interpretationem turbamus. Posse igitur deiectiones nigras dici pessimas Aphorismo xxi. atque etiam meliores non solum ex ceteris per os, sed bonas simpliciter hoc Aphorismo xxv. potest satis intelligi, si verba consideremus Aphorismi xxi. ibi enim scribit: *ὑπερβαίνει μάλιστα ἵπτα*, id est, *deiectiones nigras procedentes, voce autem ea, procedentes, significatur, ut Galenus exponit, temporis longitudo, tanquam vel per morbum totum, vel per multum ipsius tempus, tales veniāt deiectiones*. Sunt igitur pessimæ nigræ deiectiones, non simpliciter, sed quando intempestivè adveniunt, & diutius durant; si verò paulatim effluant, hæ non pessimæ dicendæ sunt, sed meliores illis quæ excernuntur per os, & crisis bona. Idem Vallesius reprehendit similiter alteram secundi membri expositionem à Galeno propositam, qua per nigra subeuntia, intelligit Galenus ex hæmorrhoidibus fluentem sanguinem, sed reprehendit ex lectione quam ipsemet Vallesius proponit, cui nihil est cum Galenica unde incallum fuisse illa a Vallesio proposita, & auras verberatas dicere possumus.

Est tamen adhuc quod aduersus Aphorismi sententiam dubitem: quomodo enim sanguis qualiscumque, si suprà feratur, malum existimari debet, cum libro de differentiis symptomatum capite ultimo, sanguinis per nares profusio, vel vomitus, vel sanguinis deiectio, vel hæmorrhoids, vel aliud eiusmodi, aliquando præter naturā non existimentur, nec symptomata, sed naturæ opera, cum scilicet repestivè fiūt, cum virtutis robore, & providentia de animalis salute? Respondemus ex Galeni interpretatione, Aphorismi sententiā accipi per cōparationem, & quod dicitur bonum de reiectis per inferiora, idem esse ac melius, ut hic sit sensus: Sanguinis nigri deiectio per inferiora, melior est quā cuiuslibet alius per os excretio; qui verò ita dicit, ille non tollit, quin per idem os bona fieri aliquando possit excretio, quod capite ultimo libri de differentiis symptomatum scripsit Galenus. Aut dicamus, hanc Aphorismi sententiam ex illis esse quæ sæpius ita contingunt, non autem ex necessitate semper, cuiusmodi alias quasdam adnotavit Galenus. Verè enim sanguis per os excretus frequentissimè malus est, tum veluti signum morborum in-
tus existentium, tum veluti causa euacuans humorem naturæ familiarissimum: aliquando autem bonus plenitudinem euacuans, ut in mulieribus menstruum suppressionem patientibus.

Quibus in febribus, quaque ratione, & consilio mittendus sit sanguis.

CAPVT XXXIV



QUARITVR, vtrum in omni febre putrida mittendus sit sanguis. Alij opinantur ita esse faciendum semper, & in omni febre putrida, modo vires ferant. Alij, in omnibus continuis, non in omnibus intermittentibus. Alij, nec in omnibus continuis, sed solum vbi sanguinis adest plenitudo, aut si mixtus est peccante humore. Quæstio examinatur ab Argenterio lib. de febrib. à Montisiano quæst. XVII. Nos omnium rationes huc afferre non intrinsecamus, sed breuiter ex natura rei quantum nobis licet, quæ de quatuor occurrunt proponere. Scopi sunt qui remedia, aut auxilia indicant, non vero ex morbo, & causa, & symptomate: symptoma omittitur in præsentia, nisi de eo se offerat postea occasio, nullum enim proponimus. Qui dicit febre putridam, duo dicit, febrem, & putredinem. Febris est morbus, putredo causa; febris indicat refrigerantia, venæ sectio refrigerat, venæ igitur sectio indicatur. In putredine duo consideramus, causam, & ipsam putredinem. Putredo rursus duplex, quæ fit, & quæ facta est, quæ facta est, id est, humor putrefactus & corruptus, indicat euersionem, vt Galenus tertio articulo artis medice, hæc fit per venæ sectionem, si sanguis sit qui corruptus, & putrefactus est, alioquin haud conuenit quæ putrescit, id est, semiputris, & semimala, debet corrigi à natura, & prohiberi à nobis, ne vltius procedat; corrigitur à natura per coctionem, quæ fit per moderatè calida, prohibetur adhibendo contrariam putredini, hæc procedit beneficio caloris externi; adhibere igitur refrigerantia, venæ sectio refrigerat, igitur hæc conuenit; ratione coctionis primo non conueniat, sed conuenit per accedens iuuans coctionem. Causa putredinis est obstructio, hæc fit à lentore, & crassitie, aliquando à multitudine: Venæ sectio tollit multitudinem, igitur si ab hac obstructio est, conuenit: si à lentore, & crassitie indicantur abstergentia, & attenuantia, talis non est venæ sectio, sed quæ tali facultate prædita sunt, adhiberi non possunt, nisi ablata multitudine, auferetur per venæ sectionem; ergo in lentore, & crassitie conuenit. Ex his colligi videtur, in omni febre putrida aliqua ratione mittendum esse sanguinem, idque videtur proponere Galenus vndecimo methodi de crasi quinto scribens: Saluberrimum est in omnibus febribus non continuis modo, sed aliis omnibus, quas putrescens hu-

mor

accendat, sanguinem nutrire, & modo atque, & vires non prohibere. Sed res non ita habet. Galenus enim idem primo ad Glauconem in curatione febris tertianæ, Julius auxilij non ineminit in quartana citra, si fortè sanguis vehementer superabundans appareat in quotidiana non ineminit, in tertiana nostra non absolute proponit; sed si videatur faciendum, statim ab initio mittendum dicit. Dicimus, venæ sectionem primò, & per se respicere humores in venis existentes, tales enim per eam educuntur, quare tum præcipuè conuenit, quum humores in venis peccant. Peccant autem in venis, quum febres sunt continuæ: igitur in continuis primò videtur conuenire. In intermittentibus humor existens extra venas non videatur eam requirere, siue extra illas putrescat, siue in illis putrefactus foras feratur. Verum ut ea quæ diximus de continuis nolumus obtinere, ut semper in continuis mittatur sanguis, ita hæc non conuincant, nunquam ut intermittentibus esse mittendum; licet enim in his concedatur non putrescere sanguinem, aut humores in venis, tamen non putridi ab his pelluntur foras, aliquando ibidem geniti, quo casu tollitur materia antecedens, quæ deinde sit materia coniuncta. Si verò materia intermittentis febris gignatur in ipsismet carnibus, quod fieri aliquando testatur Galenus libro de tremore, palpitatione, & conuulsione, tunc non putem esse proficuum venæ sectionem, sicuti etiam cum in intermittente commodè à natura per singulas accessiones expellitur, liberque à febre omninò remanet ægrotus, superfluum puto venæ sectionem adhibere, quæ possit naturam commodè operantem impedire. At si expurgari commodè per accessiones non videatur æger, unde inperueniant aliqua graua symptomata, tunc mittetur sanguis. Solent autem superuenire, & non expelli tota materia, cum illa multum abundat, quare in multitudine mittitur. Cum multitudinem dicimus, sanguinem intelligimus; si enim sit alius humor, purgante medicamento melius trahitur. Igitur aliquando in intermittente mittendus sanguis, aliquando non mittendus. In continuis similiter non mittendus semper: Galenus enim quarto de tuenda valetudine capit. v. circa medium tres proponit succorum veluti classes seu ordines citra sanguinem, & alios tres ultra sanguinem; ipsum verò sanguinem in medio constituit, tum affirmat, vbi paululum, vel citra sanguinem restitum, vel ultra processum est, audacter esse mittendum sanguinem, vbi plus [nimitum restitum, vel processum est] consideratius esse agendum, vbi plurimum, in his nullum omnino esse mittendum sanguinem; dixerat autem paulò antè, vbi citra est restitum, illos humores varios esse, sed tamen vno nomine appellari succum crudum, vel pituitam, vbi autem vterius est processum, illos humores esse supra iustum modum petcockos, sanguinem autem esse in medio. Video igitur humorem biliosum non connumerari inter crudos, neque eo nomine

signari. Si igitur contingit in febre putrida continua adesse multitudinem, siue pituitæ copiam plurimam, aut etiam biliositatem, ex hoc Galeni loco doceamur, non esse mittendum sanguinem; At negat Montisianus, & Argenterius, & quæ dicuntur in libris de tuenda valetudine nolunt referri posse ad curationem morborum: Valentinus Trincavellius, cuius opinionem veriores puto. At, inquit Argenterius, in morbis res magis periculosa, nec sicuti in affectibus, aut lassitudinibus vicerosis, de quibus agebat Galenus, ita licet in febribus continuis omittre venæ sectionem. Respondemus licere, quoniam alia sunt præsidia, quæ magis conveniunt, nimirum purgatio, quæ magis accommodata est trahendæ bili, aut pituitæ. Dicimus autem referenda esse, quæ dicuntur in libris de tuenda valetudine ad curationem morborum; cum sunt ratione coniuncta, vel aliis Galeni locis confirmantur, ut in præsentia: in abundantia enim bilis non esse mittendum sanguinem scribit ex Hippocrate idem Galenus tertio in sextum Epidemiorum textu ultimo, quod & scriptum etiam fuit ab Avicenna. Igitur non in omnibus continuis febribus semper mittendus est sanguis, etiam consentiente ætate, & viribus: sed tunc solum cum peccat sanguis, aut cum humore peccante adest saltem mediocri sanguinis quantitas, aut saltem non adest sanguinis penuria: scimus enim non semper esse necessariam plenitudinem, idque scribit Galenus octavo methodi capite quarto, admonens nos, ut etiam in diaria cum multitudine succorum, eorumque crassorum, & glutinosorum, mittamus sanguinem transacto spatio primæ accessionis, ne fiat febris putrida, licet etiam plenitudinis signa non adsint. At indicia plenitudinis nec nos requiramus, quæ sunt rubor, & tensio, & alia, quæ proponit Galenus pro signis plenitudinis; præsertim ad vasa, plenitudo enim ad vires etiam cum mediocri sanguinis copia adesse possit. At verò quid respondemus ad locum Galenicitatum ex capite undecimo methodi decimoquinto, *Saluberrimum est*, &c. & quid etiam ad indicationes propositas, & haustus ex natura rei, & natura morbi? Ad locum Galeni dicimus: Primum non citari fideliter ab omnibus qui eum citant: nonnulli enim citant illum tanquam eo dicatur, saluberrimum esse sanguinem mittere in febribus omnibus non continuis modò, sed aliis omnibus quas putrescens humor accendit. At non ita locus legitur, non enim scriptum est in continuis, sed in continentibus, Græcè enim non *συνεχὰς*, sed *συνεχας* scriptum est; opponit igitur non continuas intermittentibus, sed continentes, de quibus agebat, continuas, quas intelligit in sequenti membro. At dicat quispiam: nimirum igitur in omnibus saltem continuis mittetur. Respondemus, quod valeat & ad locum Galeni, & ad indicantes propositas, & ad argumenta, quæ ex indicationibus peti possent: si enim ex indicatione habetur, mittendum esse sanguinem tum ratione febris,

tum putredinis, tum causæ, indicationes autem habentur ex morbi forma aut essentia, seu ex illis quæ morbi essentiam constituunt, quomodo indicata ab essentia morbi, non reuocabuntur semper in usum, cùm essentia videatur eadem semper, & perpetuò id requirere? Respondemus; morborum essentiam non esse, sicuti essentiam, aut formam rerum naturalium, quæ necessaria est, & eadem semper, nec plus, aut minus recipit, sed constata esse ex multis accidentibus, quæ modò plura, modò pauciora sunt, ex quo variari illam essentiam, indeque fieri, vt eorum ratione modò vnum, modò aliud auxilium sit usurpandum: licet enim & refrigerare, & putredinem auferre non sola sanguinis missione, sed aliis etiam auxiliis; quare non indicatur necessariò est saluberrimum, licet sæpius ab multitudinem quæ adesse solet, & saluberrimum & necessarium sit.

De tribus febrium generibus ex Galeno, deque acuto, & magno morbo.

C A P V T X X X V.

TRIA esse prima febrium genera, vnum earum quæ diatriæ appellantur, alterum hecticarum, tertium earum quas acutas vocant, similes putridorum humorum primo in tertium Epidemiorum textu quinto scribit Galenus. An igitur omnes putridæ sub acutis hoc loco, & hisce verbis comprehenduntur? id est, omnes putridas esse acutas colligitur, an potius id tantum, acutas esse putridas? atqui id non est vniuersaliter verum, nam synochæ absque putredine sunt acutæ, non tamen putridæ: nisi dicamus synochas has comprehendendi potuisse sub diatriis. Acuti igitur morbi nomen latè patet aliquando, quod etiam ex illis colligitur quæ habet Hippocrates quarto acutorum. *In morbis acuti: sanguinem deirahes, si morbus videtur magnus*, &c. Ex his enim apparet non omnem acutum morbum esse magnum: febres igitur aliquæ putridæ erunt, & acutæ, quas tamen magnas esse minimè necesse sit: Vnde magnitudinem ab aliis conditionibus pendere, ab aliis acutiem dicendum est. De acuto morbo, qui Græcè *ἄκρῳ*, hæc præterea adnoto: aliū esse febrilem, aliū absque febre, vt epilepsia, apoplexia, conuulsio ac tetanus, quos memorat Galenus quinto Aphorism. trigesimo. Non igitur quilibet acutus morbus semper habet febrem coniunctam, quod alicubi scribi videtur, sed qui acutus febrilis est, ille febres habet continuas.

De Pyrexismo, & hora exhibendi cibi.

C A P V T XXXVI.

P A R O X I S M U S, seu accessio est deterius tempus, totius circums, quod est a primo initio usque ad statum inhihiunt inclusivè, ut loquuntur; quoniam quod reliquum est, ad declinationem pertinet, melius est, sicuti scribitur a Galeno primo Aphorismi. Accessionis autem principium fit calore omni ex toto corpore ad thoracemque concurrente; unde cum pervenerit corpus, & citius & citius frigus sentitur, illud nomen accessionis est initium, licet aliquando appellente, cum autem in visceribus calor percipitur, licet in exterioribus adhuc frigus adsit, accessionis initium est: Incrementum autem est, cum ad exterioras corporis partes sese expandit, status cum ex æquo corpus totum occupat; Declinatio autem contrarium principio modum habet, perspirante scilicet caliditate, atque mediis corporis exsurgente. Adnotatio utilis ad eligendam horam qua salubriter exhibetur cibis; quare nonnulli fortasse peccant. Non enim sufficere scribit Galenus, ut pedes incalescant, sed ut caliditas deferat, aut potius descendat partes internas ventris, atque thoracis, inde ad pedes descendat, fieri enim potest, ut ille scribit, ut pedes calidius manent in corporis medio caliditate, quod in vigore contingit, non hoc autem, sed illud esse tempus maxime accommodatum ad exhibendum cibum, scribitur secundo de ratione victus textu xli. hoc tamen tempore sive qui frigidam aquam exhibeant ad refrigerandum, & humectandum, quod in siolis naturis commodum, & proficuum sit, ita in aliis fortasse minus salubre.

De abcessuum secundum rectitudinem, & qui tales non sunt, utilitate. Galeni locus ex secundo Epidemiorum male ab interprete acceptus, emendatus.

C A P V T XXXVII.

C U M de abcessibus ad inferiores corporis partes secundum rectitudinem factis ageret Hippocrates libro sexto de morbis popularibus, hæc habet ex Cornarii translatione; Secundum rectitudinem, & costarum dolor, & præcordiorum convulsionem, & hæc elationes, & ex naribus emptiones, & aures secundum rectitudinem. Horum prima huiusmodi, & in oculis. Primum igitur omnium, aut quæ quidem ab inferius sursum, qualis qua

primis, hunc posteriùs fuisse scriptam, & rursus non valere in illis Hippocratis libris qui conscripti sunt ut ediderunt & inane tractatur, nec itein in illis quos sibi ad memoriam subsidium, ut præstò res quæ antiquius esset, domi habebat, quæ dicebantur *ἀπογραφα*, qualem fuisse sextum hunc dicit Galenus, quippe non ab Hippocrate editum, sed à Theodorus eius filio collectum, qui sequens ordinem aliorum, sextum interpreti. Concludit igitur Galenus ex quorundam sententia, si priùs scriptus est secundus Epidemio. um, posteriùs sextus. par est existimare quomodo post scriptum illorum, quæ secundo continentur, ubi absque dubitatione sententia proferebatur, vidisset abscessum in inferiora non secundum rectitudinem vtiliter factam, de sententia quam secundo proposuerat dubitasse, & dubitationem hinc proposuisse, si autem priùs est scriptus sextus, posteriùs secundus, dicendum cum in sexto de re dubitasset, eamque dubiè proposuisset, in sexto non tam dubitantem, sed certò reinduicantem, è directo transmissiones omnes fieri debere proposuisse. Eandem rursus questionem sequenti particula xiv. proposuit ex Hippocrate Galenus, querens utrū in abscessibus ad inferiora corporis depullis, semper rectitudo seruetur necne, quod proximo ante hunc sermonem in dubium reuocauerat, ex Graeco; verum quæ infra secus ex superioribus delabuntur, ut in testes & varices, melius sit secundum rectitudinem fieri aut etsi non secundum rectitudinem sunt, possint partibus superioribus similiter opitulari, sed neque hic questionem determinat, non enim posse in nonnullis cognosci hanc rectitudinem ait, ut quin varices insaniam soluerint, si è directo factas est abscessus, aut contra: non enim internoscere licet, utrum in dextris cerebri partibus, aut sinistris affectione oborta, insanserit, quibus similia alia exempla proponit ibidem Galenus, tandem claudit sermonem, in hisce aut vix, aut nullo modo cognosci posse rectitudinem: in illis autem abscessibus, in quibus illa cognosci potest, considerandum esse ait Hippocrates, si omnino & absolute in abscessibus illis qui fiunt ad partes inferiores, meliores super qui fiunt secundum rectitudinem. Hic igitur verbis non omnino concluditur, in abscessibus semper seruari debere rectitudinem, ex Hippocratis quidem sententia, qui ea de re dubitat; quare & utilis etià ille existimandus aliquando, qui non secundum rectum fiat, id autem tunc potissimum contingere merito existimandum est, cum ex superioribus ad inferiora abscessus sit, superiora enim inferioribus sunt nobiliora, superiorumque partium effectus periculosiores: superiora autem dicuntur iuxta Galeni doctrinam hoc eodem secundo commentario in sexto Epidemiorum particula xiv. quæ sunt supra hepar, inferiora quæ sub ipso.

De febre ardenti, & synocha, quæ certam aliquam & determinatam febris speciem non significant. Galeni locus ex secundo de differentiis febrium illustratus. Quæ ratione febris ardens fiat: de vera, & notha ardente, quæq; periculiosior, & quæ minus.

CAPVT XXXVIII.



AVVS siue febris ardens non significat speciem aliquam particularem febris ab aliis omnibus speciebus distinctam & à particulari aliquo humore progenitam, sed conditiones potius quasdam, & qualitatem quandam, gradumque caloris, quæ ubi adsunt, febris illa dicitur causus, siue ardens, atque etiam ignis, quocunque ex humore, & quocunque ex loco fiat illa febris. Igitur scire licet tertianam continuam, quæ vulgò dicitur, appellari ardentem, quod Galeni testimonio probatur libro secundo cels. cap. sexto, ubi scribebat febres continuas esse quoniam cum intermittentibus, id est, eiusdem generis, atque ita tertianam exquisitam [nimirum intermittentem, tertianæ enim nomine intermittens intelligitur] respondere exquisitæ ardenti, quotidianam illi quæ qualibet die accessionem patitur, sed nunquam definit ad infebrecitationem, quartanam similiter illi, quæ quarto quoque die redit, quibus paulò post hæc adiicit: *Quæ ob solam fluxum bilem febri accenditur, siue aliquo visceris affectu, si manente adhuc intra vasabile accendatur, exquisita febris ardens est: si verò per totum deservit, tertiana, eodem modo in libro de tremore, palpitatione, & c. scribebat: calidorum medicaminum applicationibus nonnunquā solus horror, sæpe & rigor superuenit, quemadmodum in febribus ardentibus, & in tertianis febribus: nomine autem tertianarum, quæ Græcè τριτηναι, semper intermittentes intelligit: sed & paulò post: Hæc ratione sola ardentis febres à tertianis (& hæc intermittentes necessariò intelliguntur) differunt, quia ardentis in vasis bilem habent, in tertianis extraspasmasia per sensilia corpora fertur. Ex his apparet, quæ dicitur tertiana continua, ardentem appellatam fuisse à Galeno: est quæ ex illis febribus, quæ intervallum quidem febre vacans omnino non habent, libeat tamen declinationem quandam. Verùm ea febris tertiana intermittens, quæ tertio quoque die redit, & in quietem febre vacantem desinit, dicitur etiam febris ardens, seu causus, idque ipsius Galeni testimonio, libro octavo de decret. Hipp. & Platonis, cap. sexto, ubi hunc in modum scribebat: Ita nunc fatis eris ca tantum, quæ illis in libris demonstrans.*

mus commemorare. Acutissimas scilicet, & ardentissimas febres à flava bile oriri, & tertianam ex ardentium genere esse: cur verò hac continua nunquàm sit, et ardens, sed intermittat, causam ibi explicauimus. Libro autem secundo de diff. febr. capite tertio, non causum simpliciter, sed causodem appellat, ita scribens: *Quæ ex flava bile per sensibiles corporis partes delata oritur febris, cum rigore vehemens inuadit, atque cauescens est.* Duæ igitur ex bile febres sunt, tertiana continua, siue *perpetua*, & tertiana intermittens siue *intermittens*, quando continua alternis diebus inualescit, licet nunquam in quietem febre vacantem definat, altera autem cum in quietem febre vacantem terminetur, tertio tamen quoque die redit; sed & tertia adhuc ardens est, quæ neque reditum ullum, neque inualesceniam ullam alternis diebus habet, sed ab initio ad finem vnum accessionis tempus, donec ex toto soluat, unde & synochæ tales dicuntur: hæcque non secus ac synochæ ex sanguine, in tres differentias distinguuntur; quod ex verbis Galeni notum facio libro secundo de diff. febrium cap. secundo, quæ ita leguntur: *Continuarum autem duplex est species, altera earum quæ synochæ appellantur, quando vniuersum tempus in vna consumitur accessione, quæ à principio vsque ad finem pertingit. Altera earum quæ idem cum genere nomen sursunt, & continua appellantur, atque in pluribus particularibus circuitibus continentur. Earum igitur quæ synochæ dicuntur tres sunt omnes numero differentia. Nam quædam earum à principio vsque ad finem æquales perdurant; quædam paulatim augentur: Tertia species paulatim decreuit, unde & nonnulli primas quidem homioras atque acutissimas, hoc est, in eodem statu & vigore perseverantes nominant, secundas anabapticas, atque epacticas, hoc est, assurgentes, atque inualescentes dixerunt, tertias autem paracincticas, hoc est, decrecentes appellauerunt. Igitur febris synochus, seu continens, non, quod vulgò existimatur, vnam tantum febris speciem à sanguine prouenientem significat, sed eam quæ vnicam habet accessionem toto morbi tempore ab initio ad finem perseverans, siue à sanguine, siue à bile febris sit, fortè etiam ab aliis humoribus, quæ deinde in tres propositas differentias distinguuntur, sicuti de biliosa ex loco quem modò recitauimus patet, de biliosa enim intelligi etiam necesse est, & de sanguine ex libro nono methodi medendi. Porro autem ad initium loci ex secundo de diff. febrium à me modò recitati, expunxi verba nonnulla quæ in vulgatis cum Græcis tum Latinis codicibus habentur, nam cum legatur: *Continuarum autem quæ ex flava bile proueniunt, duplex est species, illa omisimus (quæ ex flava bile proueniunt)* conturbant enim totum locum, quippe diuiduntur febres omnes continuæ in hunc modum. Continuarum alix synochæ, quarum vniuersum tempus in vna consumitur accessione, quæ à principio vsque ad finem pertingit; alix quæ nomine generis continuæ itidem dicuntur, sed in pluribus particularibus circuitibus continentur, non vt synochæ vnicæ accessione per totum morbi decursum: Synochæ tres habent differentias, alix enim à principio vsque ad finem æquales, & reliqua quæ antè recitauimus. Continuarum autem quæ*

vnica

vnica accessione non terminantur, duæ sunt primæ differentiæ, aliæ enim singulis tertiis diebus inualescunt, & hæ vulgò dicuntur tertianæ continuæ: Galen. appellas *ὑπερμαχοῦς*, aliæ die intermedio alteram faciunt accessionem, haud relinquentes alterum & secundum diem absque febre, sed quotidie eam habent, sunt autem hæ quotidianæ continuæ vulgò dictæ; sed apud Græcos nullum præcipuè obtinere nomen hoc loco Galenus testatur, quæ enim *ἀνὰ μίαν* dicitur, illa est quotidiana intermittens, cum verò de hac eadē febre quædam obseruat Galenus, & postmodum tertiam differentiam, aut genus cōtinuarū quæ circuitū habet proponit, nimirum quartanam, continuam vulgò dictam, cuius accessionē in figurā quartani circuitus procedere scribit, & ad infebrecitationem minime terminari, hancq; etiā raro euenire scribit. Igitur cōtinuæ nō ex sola bile, sed ex alijs etiā humoribus cōstant, vt ex verbis eiusdē fuit manifestū. Video autē etiam verba quæ omni in alijs transferēdis fuisse etiā suspecta Alexandro Iustiniāno, qui in codice Græco quo utebatur, illa notis quibusdā cōpūxit, fortasse etiā ex aliquo manu scripto codice; ita etiā existimauit Tuncanelius: & hæc de eo loco. Igitur febris hæc ardēs postremo proposita nullam habens accessionem, est de genere synochorum, atque synocha dicta est à Galeno loco recitato, & secundo de diff. febr. secundo: eandem verò quæ nullam habet accessionem, nec aliam declinationem sensibilem, quæ appellatur synochus, dicitur etiam ex genere ardentium siue ex caustodis secundo crit. sexto per hæc verba: *Continuam quidem nomino febrem, quæ ad infebrecitationem antequam ex toto soluiatur non desinit, etsi declinatio aliqua sensibilis appareat. Cum verò neque declinatio aliqua sensibilis fiat, semper verò a primo principio febris, & quæ ad crisin similiter perseverauerit, etiam hæc ex genere febrium causodum* [decurrentium vettit Leoniceus] *ab iisdem verò acutis differet: sed neque in primo die, neque in secundo possibile est huiusmodi febrem prænoscere, neque aliqui est utile: sufficit enim genus agnoscere, quod scilicet biliosum sit, atque deurens, & peracuta, neque enim si synochum etiam ipsam appellaueris, ut quidam medici faciunt, appellationis ratione à febribus deurentibus toto genere differet, sicuti neq; ob id quod synochi tres differentiæ cognoscunt, proprium singulis ipsarum nomen imposuerunt, hæc quidem epactastica, id est, incrementales, illas verò *ὀρθόρας* & *ἀκυσταράς*, id est, in eodem vigore, & tenore perseverantes, alias *ἑκαμυσταράς*, id est, decrescētes nominantes. Tria verò hæc caustarum aut febrium ardentium genera, & varia esse, & variam habere generationem satis constare puto; tertiana enim continua aut *ὑπερμαχοῦς* fit ex bile putrescente in valis prope iecur, synochus in valis totius corporis, præcipuèque maximis inter alas & inguina, tertiana autem intermittens quæ *ὑπερμαχοῦς* Græcè dicitur, in habitu corporis extra venas eadem bili delata, trahique illa potest è venis à carnibus, cum & carnes vim attractricem possideant; quam quæstionem de febre ardente proposuit Galen primo acut. primo: tunc autem hæc ardens dicitur, cum ob copiam materiei, aut eiusdē qualitatem magis acrem, maiorem gi-*

gum caliditatem, & non exalfacit cor: cui rei etiam poffit effe occasio locus, qui licet extra venas, fit cordi proximior, aut etiam putrefcit illis in venis non longè à corde, fed inde à natura poftea expellitur, ex quo ingentem etiam calorem cor concepiſſe neceſſe eſt, licet intermittens fit febris: quo tempore illa duo ſymptomata hæc febris obtinet quæ ardenti neceſſaria ſunt nimirum ſitis incompeſcibilis & ardor totum hominem exurentem, de quibus Galenus quarto acut. & alibi. In venis autem putrefcere poſſe humores in intermittentibus ex Galeno patere docuimus, ſic tamen vt poſtea ex ipsis pellantur: ſit autem tertiana continua immo è ardens, quum paulò à corde diſtantiùs alicubi putrefcit bilis in venis, nec ita acris, nec ea copia eſt, vt aſſiduū qui in ardente febre requiritur, ſignere poſſit calorem. At verò quum in omnibus corporis venis, aut maximis quæ ſunt inter alas & inguina, bilioſus humor putrefcit, tunc ſemper ardens ſit. Hæ autē ſunt febres ardentes per ſe, aut morbi, ſed & dantur alie ardentes ex partium inflammatione, quæ ſymptomata dici poſſunt, vt febres alie ex inflammationibus ortæ eo nomine appellantur. Galenus autem primo in primum Protheticoꝝ xviii. fieri dicebat ex inflammatione cerebri & vteri, & primo acutor. primo, ex ventriculo, ore ventriculi, ſtomacho, pulmone, & ieiuino inteſtino: ex his enim partibus licet aliquæ diſtantes ſint à corde, eidem tamen per canales facile communicare poſſunt caloris exceſſum, atque ita febrem ardentem gignere, licet hæc appellari ſoleat nomine morbi, phrenitis, pulmonia, aut alio, haud quaquam febris: quod & Galenus alicubi obſeruauit. Igitur cauſus de variis febrium generibus dicitur, & ad varios morbos ſe extendit, quæcunq; nimirum illa habent, quorum ratione hæc febris ita appellatur, quæque eiusdem pathognomonica ſigna dicuntur, ſunt autem duo propoſita ab eodem Galeno quarto acutor. quarto, & tertio in tertium Epidemior. xxxiv. ſitis aſſidua, ſeu incompeſcibilis, atque calor perpetuò totum hominem deurens: quæcunq; in febre hæc non deſiderabuntur, illa dicitur ardens, ac ſi in inflammationibus adfuerint, illis ardētem iungi, erit manifeſtum. Fiunt ſanè hæ ardentes à bile, vt docuimus, eaque materia in illis accenditur & putrefcit: dicuntur tamen ab Hippocrate primo de ratione vitæ in acutis ichores, id eſt, tenues humiditates, vt Galenus exponit, ſed nimirum humiditates bilioſæ. Atqui ſciendum fieri etiam cauſum aut ardentem febrem ex pituita ſuſa, quem expreſſè proponit Hippocrates iv. acutorum xiii. vt quidem in commentario ad eum locum exponit Galenus, ſed eundem nota vult eſſe legitimum, nec excluſum cauſum, nec ita appellari debere, ſed cauſum tantummodo. Non enim ea habere quæ legitimo cauſo ex neceſſitate requiruntur, ſcilicet incompeſcibilem, & calorem exurentem, ſunt autem hæc Galeni verba eo loco: *Cauſus qui corpus non exurit, & ſitim habet quam ſolari poſumus, cauſum quidem ſimiliter, excluſum autem ſeu legitimum non dicemus; ſed cum ex diuſio ſit talis, haud habuerit, breuioris doctrina gratia, nominare cauſum pro-*
thum,

thum, sicut sanè in tertianis febribus uti appellationibus hñce formam. ita duo
causarum genera esse intelligemus, ut tertianarum genera duo esse quispiam dixe-
rit, unum exquisitum legitimumque, alterum verò nothum spuriumque. Cur verò
ita appelletur hic caulus, & quo differat à legitimo, & exquisito, docet
subiiciens, cum esse nothum, cui ex symptomatis quæ obtinet legimus,
nonnulla quidem insunt, aliqua verò non: subdens, eundem caulum esse
diminutum, nec perfectè absolutum, posse etiam ex Hippocratis dictio-
ne colligi, in qua aliqua proposita in legitimo, in notho quem dixit, pro-
poni haud apparet, quæ etiam Galenus sigillatim obseruat, antea quidem
litum incompossibilem, & calorem totum corpus exurentem compre-
hendit, quæ à notho causo absunt, tum verò in eodem alia subiicit, quæ
apud ipsū videre est, sed & addit, sicuti materiam legitimæ causæ, est tenuis,
& feruens humor, ex quo in ipsò contingentia, & ab Hippocrate posita
symptomata fiunt, ita non legitimæ est frigida, glutinosa, & crassa pitui-
tæ substantia, quæ hisce nominibus appellatur comparatione bilis ex qua
alius fit: alioquin enim excoacta eadem pituita iam simpliciter frigida
non dicatur, licet crassa fortasse esse possit. Hic autem nothus, & illegi-
timus causus, etsi diminutus, & ex dimidio perfectus fuerit dictus, non
tamen minus periculosus est aliquando quàm legitimus, sed æquè ex illo
periculum impendet, diciturque perniciosus, & malignissimus, qualis
lypiria febris existimatur, & dicitur à Galeno quarto Aphorismorum
x l v i i i. in qua extrema refrigerantur: id autem non contingere dicit
in ratione causæ, nec in tertiana, quæ duæ febres sunt calidissimæ: hæ
autem à bile productæ sunt: scriptum ideo fuit ab Alexandro Tralliano
libro 12. capite 3. nothas esse magis periculosas legitimis, quod tamen
non ita simpliciter assumendum est, si quidem eximie ardentes ex sin-
cera flava bile ortæ, legitimæ minimè autem nothæ dicendæ sunt, has e-
nim magis periculosas, & exitiales esse, quàm ex non sincera bile, habe-
tur ex Galeno secundo in primum Epidemiorum particula l x i. cum
moderatæ fuissent, quæ non erant ex sincera bile, plurimique ex agrotis
fuissent superstites, quod scripserat Hippocrates. Quod & manifestissi-
mus verbis scribit primo in primum Epidemiorum nouo, dicens vehem-
entem, & quasi germanam febrem ardentem à flava bile oriri, &
paulò post, exquisitam dicit vehementem, non exquisitam lenem, &
discussu facilem; quæ igitur ardens non est ex flava bili sincera, illa ut
plurimum magis placida est, quæ ex sincera vehementior, sed &
lypiria, quæ non ex tali humore est, perniciosissima & maligna admo-
dum est: hæc autem an dicenda nothæ? dicamus sanè non exquisitam,
quando tale nomen dedimus ei quæ à bile fit, nec contendamus de no-
mine: & licet lypiria per vniuersum corpus exurentem non habeat calidi-
tatem, quippe quæ refrigeratas extremas partes habeat, intus tamen ea
in ipsis præcipuis visceribus exustionem illam habet: liceat & fortè illud
dicere, quod pernicies, & malignitas pertinet ad mortem morbi, non ad
magnitu-

magnitudinem: exquisitæ igitur ardentes à bile, magnæ sunt, vehementemq; obtinent calorem, & eo maiorem, quo à magis sincera bile oriuntur, non exquisitæ, sed nothæ, non aded magæ, nec aded vehementem calorem, perque vniuersum corpus apparentem obtinent, sed tamen æquè malignæ, & perniciosæ, ac exquisitæ sunt: non tamen de omnibus nothis loquor, sed de illis quibus extremorum refrigeratio ab Hippocrate & Galeno proposita accidit, qualis est lypiria eo loco nominata.

F I N I S.

